SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

# CAUSES 2019

## CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

www.gob.mx/salud/seguropopular/

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## Introducción

Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese sentido, para la actual administración, es prioridad hacer efectiva y eliminar la inequidad en el acceso a servicios de salud y avanzar en la cobertura, para que todas y todos gocen de la atención oportuna, de calidad y se garantice la gratuidad de los medicamentos.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo-efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2019, es el documento de referencia del Sistema de Protección Social en Salud, en él se describen las intervenciones y el listado de medicamentos a los que tiene derecho el beneficiario del Seguro Popular, los cuales, buscan garantizar que la población tenga acceso a los servicios integrales de salud, con lo que será posible reducir el gasto de bolsillo de las familias mexicanas. En ese sentido, para su integración se realizó un análisis exhaustivo de la cobertura de servicios, priorizando en su integración la viabilidad financiera del Sistema, promoviendo la atención integral a través del acceso a la red de servicios de salud acreditada, la cual cuenta con capacidad instalada para garantizar la calidad en la atención de los afiliados, enfatizando servicios como prevención y promoción de la salud con acciones consideradas en la Línea de Vida, así como las correspondientes al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, manejo ambulatorio en cuidados paliativos y quemaduras de tercer grado y otras intervenciones susceptibles de pago.

Asimismo, contempla las intervenciones que por su complejidad y alto costo son financiadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), así como las cubiertas por el Programa del Seguro Médico Siglo XXI.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## Marco Jurídico

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4°**

  Última reforma publicada DOF 15/09/2017

- **Ley General de Salud**
  Última reforma publicada DOF 08/12/2017

- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Artículo 9.**
  Última reforma publicada DOF 17/12/14

- **Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019**
  Publicado en el DOF 28/12/2018


- **Normas Oficiales Mexicanas** (se anexa apéndice)

- **Guías de Práctica Clínica** (se anexa apéndice)

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## Evolución histórica

La cobertura de servicios del Sistema de Protección Social en Salud ha evolucionado constantemente desde 2003, con acciones innovadoras en el acceso a insumos y medicamentos.




Actualmente el CAUSES 2019 cuenta con **5 conglomerados** que integran **5 subgrupos** de cobertura.

Garantiza el acceso a **294 intervenciones**, que contienen:

- 1,807 diagnósticos con clave CIE-10
- 618 procedimientos con claves CIE-9-MC
- 633 claves de medicamentos
- 37 insumos específicos (marcapasos, lente intraocular, material de osteosíntesis, etc.)

## Conglomerados

### *Prevención y Promoción en Salud.*

Incluye de la intervención número **1** a la **27**, en él se encuentran las acciones de prevención y promoción de la salud, a través de la aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos de edad, grupos de riesgo como las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores; la detección oportuna de enfermedades, incluidas en los principales Programas de Acción Específica.

En este conglomerado se incluye una nueva intervención, 13. VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO, como parte de las estrategias en prevención durante el embarazo.

Algunas intervenciones de este conglomerado, cubren diagnósticos específicos (CIE-10) que tienen trazabilidad en la cobertura de la red de servicios desde la comunidad en el primer nivel de atención hasta hospitales de segundo y tercer nivel, por ejemplo:

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, cuyo manejo es integral desde la detección de la causa de base, hasta el tratamiento de las complicaciones, incluido el apoyo psicológico correspondiente.

### *Consulta de Medicina General y de Especialidad*

Comprende de la intervención número **28** a la **147**, e integra servicios desde el primer nivel de atención (Medicina General), hospitales comunitarios, hospitales generales y de especialidad (Medicina de Especialidad) en los cuales se otorgan servicios de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, no infecciosas, crónico-degenerativas y tamizaje de patologías, que por su complejidad permiten el acceso a coberturas como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI para su resolución.

En este conglomerado se incluyen intervenciones como:

41. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA, considerando el panorama epidemiológico actual en nuestro país.

104. DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA, considerando la importancia del impacto de las complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas.

139. TERAPIA DE LENGUAJE y 140. NEUROHABILITACIÓN, relacionadas con el neurodesarrollo infantil.

***Urgencias.***

La atención en urgencias es una prioridad para disminuir la morbi-mortalidad de la población que de acuerdo con su naturaleza y gravedad demandan atención inmediata al poner en peligro la vida y/o la función del órgano, permitiendo el tránsito a la cobertura de servicios de hospitalización, cirugía y cuidados intensivos. Se integra a partir de la intervención **148** a la **216**.

En este conglomerado se incluyen intervenciones como:

149. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES

153. DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

155. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

174. DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO

180. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

197. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA

***Cirugía General.***

Contiene de la intervención **217** a la **270**, donde se resuelven padecimientos agudos y/o crónicos, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica: digestivos, ginecológicos, genitourinarios, proctológicos, oftalmológicos, dermatológicos, otorrinolaringológicos y ortopédicos.

En este conglomerado se incluyen insumos especializados como marcapasos, lentes intraoculares, material de osteosíntesis, prótesis de cadera y rodilla, mallas quirúrgicas y válvula de derivación ventrículo-peritoneal.)

***Obstetricia.***

Una prioridad en la Salud Pública del país es la atención de la mujer embarazada y el recién nacido para los cuales existe cobertura específica a través de las intervenciones **271** a la **294**, donde se resuelven padecimientos relacionados con el estado de gravidez, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia médico-quirúrgica.

Es importante considerar que este conglomerado tiene trazabilidad a través de los subgrupos de cobertura desde la prevención, consulta externa, urgencias, hospitalización, cirugía y cuidados intensivos y permite el acceso a coberturas como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI para su resolución.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## Estructura del Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES

### *Grupos de cobertura*

Se refieren a las principales áreas de atención en salud relacionadas con la cobertura del CAUSES vinculada al acceso generado de acuerdo a los diagnósticos acotados a la clasificación CIE-10.

- MEDICINA PREVENTIVA
- CIRUGÍA GENERAL
- GINECOLOGÍA
- MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
- NEURODESARROLLO
- ODONTOLOGÍA
- PLANIFICACIÓN FAMILIAR
- TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
- URGENCIAS MÉDICAS
- NUTRICIÓN

### *Subgrupos de cobertura*

Permiten el tránsito a través de la red de servicios de salud en sus diferentes niveles de complejidad de acuerdo con la capacidad instalada de los establecimientos de salud.

- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD
- CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
- HOSPITALIZACIÓN
- URGENCIAS
- CIRUGÍA GENERAL

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2019

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**I44.0** Bloqueo auriculoventricular de primer grado<br>**I44.1** Bloqueo auriculoventricular de segundo grado<br>**I44.2** Bloqueo auriculoventricular completo<br>**I44.3** Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados<br>**I44.4** Bloqueo fascicular anterior izquierdo<br>**I44.5** Bloqueo fascicular posterior izquierdo<br>**I44.6** Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados<br>**I44.7** Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación<br>**I45.0** Bloqueo fascicular derecho<br>**I45.1** Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados<br>**I45.2** Bloqueo bifascicular<br>**I45.3** Bloqueo trifascicular<br>**I45.4** Bloqueo intraventricular no especificado<br>**I45.5** Otros tipos especificados de bloqueo del corazón<br>**I45.6** Síndrome de preexcitación<br>**I45.8** Otros trastornos especificados de la conducción | 010.000.0624.01 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-IMSS-352-09-EyR<br>GPC-IMSS-535-12-EyR<br>GPC-SS-014-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br>Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)<br>Prueba de esfuerzo<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Tiempo de coagulación, INR<br>Tiempos y pruebas de coagulación<br>Ecocardiograma a color<br>Electrocardiograma<br>Holter<br>Telerradiografía de tórax |
| | 010.000.0624.00 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | | |
| | 010.000.5099.00 | **ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.4107.00 | **AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml. | | |
| | 010.000.4110.00 | **AMIODARONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2111.01 | **AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5731.00 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5731.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5732.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.0204.00 | **ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.4246.00 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada grageo tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.4246.01 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada grageo tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.5935.00 | **DABIGATRÁN CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 150 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |

**NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**. - Es la denominación y el alcance de la cobertura al afiliado, alineado a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) en su versión 2015.

**CIE-10.** Es una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y de administración de salud, se utilizan los códigos de tres caracteres, los cuales son el mínimo obligatorio que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS), para obtener y analizar información relacionada con morbi-mortalidad.

**CIE-9 MC.** Con el objetivo de contar con datos más específicos, se incluye la clave CIE-9 MC para las intervenciones que contienen o que son procedimientos.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## Estructura de la Clasificación Internacional de Enfermedades

**Capítulo XV Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)** — Capítulo

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) — Grupo

**O00 Embarazo ectópico** — Categoría (Raíz)

O00.0 Embarazo abdominal
O00.1 Embarazo tubárico
O00.2 Embarazo ovárico
O00.8 Otros embarazos ectópicos
O00.9 Embarazo ectópico, no especificado

Subcategorías (Subíndices)

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## Nomenclatura de la clasificación

**E78** **Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias**

| | |
|---|---|
| E78.0 | Hipercolesterolemia pura |
| E78.1 | Hipergliceridemia pura |
| E78.2 | Hiperlipidemia mixta |
| E78.3 | Hiperquilomicronemia |
| E78.4 | Otra hiperlipidemia |
| E78.5 | Hiperlipidemia no especificada |
| E78.6 | Deficiencia de lipoproteínas |
| E78.8 | Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas |
| E78.9 | Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado |

**E45X** **Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica**

**K56.4** **Otras obstrucciones del intestino**

**MEDICAMENTOS ASOCIADOS. -** Son las opciones de tratamiento para cada una de las intervenciones que se sugieren, apegadas a las Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínica, **no siendo opciones limitativas, con la posibilidad de usarse en las otras intervenciones que integran el CAUSES, quedando a criterio ético y profesional del médico tratante.**

**NORMATIVIDAD. -** Se refiere a la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a la atención. La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) está basado en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, así como en cada una de las intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna instancia tiene la facultad para hacer la edición, modificación o acoplar a necesidades particulares no contempladas en este documento, en todo momento deberán de apegarse al acuerdo de gestión celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

Es necesario tomar en cuenta que los insumos indispensables para la atención de un paciente, incluidos los materiales de curación, los requerimientos para el mantenimiento de vena permeable y el instrumental médico y/o quirúrgico desechable para la atención de cada una de las intervenciones de salud descritas en el presente documento, quedan también bajo la cobertura financiera del SPSS.

**AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO**. Son aquellos estudios de laboratorio o gabinete de los que el médico se puede servir para apoyar o descartar el diagnóstico, **no siendo limitativos para las intervenciones para las que fueron considerados, con la posibilidad de usarse en otras que integran el CAUSES, quedando a criterio ético y profesional del médico tratante.**

En cada intervención del CAUSES, se establece una serie de exámenes de laboratorio, gabinete, medicamentos u otros insumos, su utilización para determinar el alcance clínico de cada intervención y su correspondiente cobertura será definida por el médico tratante de acuerdo con la variabilidad clínica, estableciéndose en el expediente clínico los manejos terapéuticos, evolución clínica y tratamientos para justificar médicamente cada uno de los servicios o áreas de estancia intrahospitalaria, siempre y cuando los esquemas terapéuticos estén alineados a la cobertura del Catálogo de Medicamentos del CAUSES.



## Vinculación con los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud, libertad en la responsabilidad de prescribir y la participación del Gestor del Seguro Popular.

La definición y elaboración del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, está a cargo del Consejo de Salubridad General y constituye el referente esencial del Catálogo de Medicamentos e Insumos del CAUSES. La adquisición de medicamentos debe de estar plenamente ajustada a las disposiciones de los mismos, los cuales están definidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Es responsabilidad del médico tratante, prestadores de servicios y autoridades correspondientes, hacer uso racional de los medicamentos e insumos que recetan por cada intervención o patología a atender, considerando las líneas de prescripción de acuerdo con la medicina basada en evidencias y criterio de individualidad clínica del paciente, con el propósito de observar las normas de atención de cada caso clínico y evitar un posible desajuste financiero. En la aplicación de estos criterios será oportuna la participación del Gestor del Seguro Popular para verificar el uso racional y oportuno de los medicamentos y revisar el abasto de los mismos; deberá corroborar el apego de la prescripción con respecto al Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos del CAUSES, mismos que se anexan con la finalidad de que, por determinación del médico tratante, sean indicados para la atención de cualquiera de las intervenciones, independientemente de los señalamientos particulares que se hacen al respecto de cada intervención.

Por lo que respecta a los estudios de laboratorio y gabinete, su indicación es responsabilidad estricta del médico tratante, debiendo hacer las anotaciones respectivas en los expedientes clínicos, mismas que deberán estar sustentadas por el padecimiento o sospecha diagnóstica, dependiendo del nivel de atención en el que se soliciten y estén autorizados, según la reglamentación estatal para la prestación de los servicios de salud. Es importante señalar que no se especifican los días de estancia hospitalaria, ya que para su determinación es necesaria la evaluación de la situación clínica específica del paciente.

Como parte de la tutela de los derechos de los afiliados, el Gestor tiene una participación fundamental en el otorgamiento de los servicios cubiertos en la cartera de servicios del SPSS, a fin de dar seguimiento a la atención médica, vigilando su calidad y participando en la correcta aplicación del esquema de referencia y contrareferencia del afiliado. Asimismo, debe considerar el manejo adecuado del expediente clínico, tomando en cuenta sus atributos de privacidad y confidencialidad.

## Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud

En forma complementaria a las intervenciones contenidas en el CAUSES, es necesario considerar a las **66** que por su complejidad y alto costo son financiadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), así como las **151** patologías cubiertas por el Programa del Seguro Médico Siglo XXI, que no tengan vigente ningún tipo de seguridad social.

La difusión del presente catálogo en las entidades federativas estará a cargo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), quienes coordinarán su entrega a cada proveedor de servicios de salud para su conocimiento y realizarán las acciones de capacitación con la finalidad de brindar los servicios ofrecidos explícitamente y otorgar la atención alineada al CAUSES vigente.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en coordinación con los REPSS, es la instancia responsable de efectuar la supervisión de la operación del Catálogo y, por tanto, verificar que los prestadores de servicios de salud para CAUSES proporcionen la atención considerando su contenido y realicen el surtimiento de recetas al 100%, conforme al Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos vigente y prescriban la realización de los estudios de laboratorio o gabinete que se requieran según cada caso.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

# ÍNDICE


| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| | **PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD** | |
| 1 | VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.) | 26 |
| 2 | VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (H.B.) | 27 |
| 3 | VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB) | 28 |
| 4 | VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS | 29 |
| 5 | VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO | 30 |
| 6 | VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) | 31 |
| 7 | VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP) | 32 |
| 8 | VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT) | 33 |
| 9 | VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN) | 34 |
| 10 | VACUNACIÓN CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) | 35 |
| 11 | VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR) | 36 |
| 12 | VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD) | 37 |
| 13 | VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO | 38 |
| 14 | VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR | 39 |
| 15 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN EL RECIÉN NACIDO | 40 |
| 16 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MENORES DE 5 AÑOS | 41 |
| 17 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS | 42 |
| 18 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS | 43 |
| 19 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS | 45 |
| 20 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS | 46 |
| 21 | PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 47 |
| 22 | DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA | 48 |
| 23 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO | 49 |
| 24 | OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | 50 |
| 25 | PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL | 51 |
| 26 | CONSEJO Y ASESORÍA SOBRE EL USO DEL CONDÓN | 52 |
| 27 | DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA) | 53 |
| | **MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD** | |
| 28 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 | |
| 29 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA | 56 |
| 30 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR | 58 |
| 31 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO | 60 |
| 32 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN | 62 |
| 33 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA | 64 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| 34 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS | 66 |
| 35 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA | 68 |
| 36 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS) | 70 |
| 37 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO | 72 |
| 38 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS | 74 |
| 39 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS | 76 |
| 40 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS | 78 |
| 41 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA | 80 |
| 42 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA | 82 |
| 43 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA | 85 |
| 44 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA | 87 |
| 45 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA | 89 |
| 46 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA | 91 |
| 47 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA | 93 |
| 48 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA | 96 |
| 49 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS | 99 |
| 50 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS | 102 |
| 51 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES) | 105 |
| 52 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES) | 109 |
| 53 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS | 113 |
| 54 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA | 115 |
| 55 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO | 117 |
| 56 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS | 120 |
| 57 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA | 123 |
| 58 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA | 126 |
| 59 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE | 129 |
| 60 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO | 131 |
| 61 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA | 133 |
| 62 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRA | 136 |
| 63 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER | 138 |
| 64 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B | 140 |
| 65 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL | 142 |
| 66 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS) | 144 |
| 67 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS | 146 |
| 68 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS | 148 |
| 69 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS | 150 |
| 70 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS | 152 |
| 71 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS | 154 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| 72 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS | 156 |
| 73 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS | 158 |
| 74 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS | 160 |
| 75 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS | 162 |
| 76 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS | 164 |
| 77 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS | 166 |
| 78 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS | 168 |
| 79 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS | 170 |
| 80 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS | 172 |
| 81 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS | 175 |
| 82 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS | 177 |
| 83 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS | 179 |
| 84 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA | 182 |
| 85 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA | 184 |
| 86 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS | 186 |
| 87 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA | 188 |
| 88 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO | 190 |
| 89 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS | 192 |
| 90 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL | 195 |
| 91 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO | 197 |
| 92 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA | 199 |
| 93 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES | 201 |
| 94 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL | 203 |
| 95 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA | 205 |
| 96 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA | 207 |
| 97 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES | 209 |
| 98 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ | 211 |
| 99 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS | 213 |
| 100 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA | 215 |
| 101 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA | 217 |
| 102 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 | 219 |
| 103 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 | 222 |
| 104 | DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA | 225 |
| 105 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO | 227 |
| 106 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA | 229 |
| 107 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO | 231 |
| 108 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA | 234 |
| 109 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA | 236 |
| 110 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS | 240 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| 111 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA | 242 |
| 112 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE | 244 |
| 113 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA | 247 |
| 114 | REHABILITACIÓN DE FRACTURAS | 249 |
| 115 | MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO | 252 |
| 116 | MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES | 254 |
| 117 | MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO | 256 |
| 118 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO | 258 |
| 119 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER | 260 |
| 120 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN | 263 |
| 121 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES) | 266 |
| 122 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO]) | 269 |
| 123 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO) | 272 |
| 124 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA | 275 |
| 125 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA | 277 |
| 126 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA | 279 |
| 127 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL | 281 |
| 128 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA | 283 |
| 129 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS | 285 |
| 130 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS | 287 |
| 131 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL | 289 |
| 132 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO | 291 |
| 133 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO | 293 |
| 134 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL | 296 |
| 135 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR | 299 |
| 136 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS | 302 |
| 137 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON | 304 |
| 138 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL | 306 |
| 139 | TERAPIA DE LENGUAJE | 308 |
| 140 | NEUROHABILITACIÓN | 310 |
| 141 | APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES | 312 |
| 142 | RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES | 314 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| 143 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL | 317 |
| 144 | EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES | 320 |
| 145 | TERAPIA PULPAR | 323 |
| 146 | EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR | 326 |
| 147 | ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | 331 |
| | **URGENCIAS MÉDICAS** | |
| 148 | ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS | 336 |
| 149 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES | 341 |
| 150 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA | 343 |
| 151 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO | 346 |
| 152 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO | 349 |
| 153 | DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO | 352 |
| 154 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS | 354 |
| 155 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO | 363 |
| 156 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS | 367 |
| 157 | MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | 371 |
| 158 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | 374 |
| 159 | ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS | 377 |
| 160 | ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES | 379 |
| 161 | ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS | 381 |
| 162 | ENVENENAMIENTO POR METANOL | 383 |
| 163 | ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS | 385 |
| 164 | ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO | 387 |
| 165 | ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE | 389 |
| 166 | PICADURA DE ALACRÁN | 392 |
| 167 | PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS | 395 |
| 168 | INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA | 398 |
| 169 | MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS | 400 |
| 170 | EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS | 404 |
| 171 | CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS | 411 |
| 172 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE | 416 |
| 173 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO | 418 |
| 174 | DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO | 420 |
| 175 | MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO | 422 |
| 176 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO | 424 |
| 177 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS) | 428 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| 178 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA | 430 |
| 179 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA | 433 |
| 180 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE | 436 |
| 181 | ESGUINCE CERVICAL | 439 |
| 182 | ESGUINCE DE HOMBRO | 441 |
| 183 | ESGUINCE DE CODO | 443 |
| 184 | ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO | 445 |
| 185 | ESGUINCE DE RODILLA | 447 |
| 186 | ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE | 449 |
| 187 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES | 451 |
| 188 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA | 454 |
| 189 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO | 456 |
| 190 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO | 458 |
| 191 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO | 460 |
| 192 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA | 463 |
| 193 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR | 466 |
| 194 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ | 469 |
| 195 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE | 472 |
| 196 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA | 475 |
| 197 | DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA | 478 |
| 198 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS | 480 |
| 199 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS | 483 |
| 200 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA | 485 |
| 201 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS | 489 |
| 202 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS | 493 |
| 203 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS | 496 |
| 204 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS | 499 |
| 205 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS | 503 |
| 206 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO | 507 |
| 207 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA | 510 |
| 208 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS | 513 |
| 209 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL | 516 |
| 210 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES | 519 |
| 211 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO | 522 |
| 212 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA | 525 |
| 213 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA | 527 |
| 214 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 529 |
| 215 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES | 532 |
| 216 | TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS | 534 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| | **CIRUGÍA GENERAL** | |
| **217** | LAPAROTOMÍA EXPLORADORA | 537 |
| **218** | ESPLENECTOMÍA | 541 |
| **219** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR | 545 |
| **220** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL | 549 |
| **221** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO | 553 |
| **222** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL | 557 |
| **223** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO | 561 |
| **224** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL | 564 |
| **225** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL | 567 |
| **226** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL | 571 |
| **227** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL | 574 |
| **228** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO | 577 |
| **229** | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL | 579 |
| **230** | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL | 581 |
| **231** | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL | 584 |
| **232** | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL | 586 |
| **233** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS | 588 |
| **234** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS | 592 |
| **235** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO | 594 |
| **236** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS | 597 |
| **237** | MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL) | 600 |
| **238** | MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA) | 602 |
| **239** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA | 604 |
| **240** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO | 607 |
| **241** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO | 610 |
| **242** | REPARACIÓN UTERINA | 614 |
| **243** | ABLACIÓN ENDOMETRIAL | 616 |
| **244** | TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS | 618 |
| **245** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA | 620 |
| **246** | HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL | 623 |
| **247** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA) | 625 |
| **248** | CIRCUNCISIÓN | 627 |
| **249** | ORQUIDOPEXIA | 629 |
| **250** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 631 |
| **251** | EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA) | 634 |
| **252** | EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS | 636 |
| **253** | AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA | 640 |
| **254** | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO) | 643 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| 255 | REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO | 645 |
| 256 | CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO | 648 |
| 257 | CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO | 651 |
| 258 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA | 654 |
| 259 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN | 656 |
| 260 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA | 658 |
| 261 | COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES | 661 |
| 262 | DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO | 663 |
| 263 | TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX | 666 |
| 264 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA | 668 |
| 265 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS | 670 |
| 266 | SAFENECTOMÍA | 672 |
| 267 | ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA | 675 |
| 268 | AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO | 678 |
| 269 | TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN | 682 |
| 270 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS | 685 |
| | **OBSTETRICIA** | |
| 271 | DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL | 687 |
| 272 | ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO | 691 |
| 273 | ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO | 693 |
| 274 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO | 696 |
| 275 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO | 698 |
| 276 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL | 700 |
| 277 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL | 703 |
| 278 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO | 707 |
| 279 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA | 709 |
| 280 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA | 711 |
| 281 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA | 713 |
| 282 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP | 716 |
| 283 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO) | 719 |
| 284 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA | 722 |
| 285 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA | 724 |
| 286 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS | 727 |
| 287 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA | 730 |
| 288 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL | 733 |

| No | INTERVENCIÓN | Página |
|---|---|---|
| **289** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO | 735 |
| **290** | ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO | 737 |
| **291** | DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL | 739 |
| **292** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES | 741 |
| **293** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA | 743 |
| **294** | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER | 745 |
| | CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES | 747 |
| | INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS | 804 |
| | INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 | 810 |

1

## VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>Z23.2 Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]<br><br>**CIE-9-MC**<br>99.33 Vacunación contra tuberculosis | 020.000.3801.00 | **VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC, o Montreal 200 000 3 200 000 UFC, o Moscow 200 000-1 000 000 UFC. Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml. | NOM-036-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-006-SSA2-2013<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br><br>Manual de vacunación 2008-2009<br><br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br><br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3801.01 | **VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC. Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. * Semilla Mérieux. | | |

1

## VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>Z23.2 Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]<br><br>**CIE-9-MC**<br>99.33 Vacunación contra tuberculosis | 020.000.3801.00 | **VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC, o Montreal 200 000 3 200 000 UFC, o Moscow 200 000-1 000 000 UFC. Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml. | NOM-036-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-006-SSA2-2013<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br><br>Manual de vacunación 2008-2009<br><br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br><br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3801.01 | **VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC. Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. * Semilla Mérieux. | | |

2

# VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (H.B.)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral<br><br>**CIE-9-MC**<br>99.4C Vacunación contra hepatitis B (HB) | 020.000.2511.00 | **VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 1 ml contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada con 1 ml. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-007-SSA2-1993<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.2526.00 | **VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 1 ml. contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. (10 dosis). | | |
| | 020.000.2527.00 | **VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ámpula con 0.5 ml. | | |

3

# VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas<br><br>**CIE-9-MC**<br>99.3A Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib) | 020.000.2522.00 | **VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica). *= Unidades de antígeno D. Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 1 dosis en frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.2522.01 | **VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B** | Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg (conjugado a la proteína tetánica). *= Unidades de antígeno D. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa. | | |

4

# VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>Z25.8<br>Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas específicas<br><br>**CIE-9-MC**<br>99.4A<br>Vacunación contra rotavirus | 020.000.0150.00 | **VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL** | Cada dosis de 1.5 ml contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50. Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.0151.00 | **VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN** | Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI, serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI, serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI, serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI, serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con un tubo de plástico con 2 ml. | | |
| | 020.000.0152.00 | **VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN** | Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI. Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI. Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI. Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI. Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con 10 tubos de plástico con 2 ml cada uno. | | |

5

# VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z23.8** Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.3D** Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente) | 020.000.0148.00 | **VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg, proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml (1 dosis) y aguja. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>GPC-SS-204-09-EyR<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.0148.01 | **VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 ml (1 dosis) y agujas. | | |

6

# VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z25.1** Necesidad de inmunización contra la influenza (gripe)<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.52** Vacunación profiláctica contra la gripe (influenza) | 020.000.3822.00 | **VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo preinvernal e invernal de los años correspondientes del hemisferio norte. Envase con frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>GPC-SS-203-09-EyR<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3822.01 | **VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo preinvernal e invernal de los años correspondientes del hemisferio norte. Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis). | | |
| | 020.000.3822.02 | **VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo preinvernal e invernal de los años correspondientes del hemisferio norte. Envase con 10 frascos ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis). | | |

7

# VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z27.4** Necesidad de Inmunización contra sarampión-parotiditis rubéola (SRP) (MMR)<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.48** Administración de vacuna contra sarampión parotiditis-rubéola. | 020.000.3820.00 | **VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Virus atenuados de rubeola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o >1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50(> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn). Envase con frasco ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>GPC-IMSS-469-11-EyR<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3821.00 | **VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de rubeola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn). Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente. | | |

8

## VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z27.1** Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis tétanos combinados (DPT)<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.39** Administración de vacuna combinada de difteria tétanos-tosferina | 020.000.3805.00 | **VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *** | Cada dosis de 0.5 ml contiene*: Bordetella pertussis no más de 16 UO. Toxoide diftérico no más de 30 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Cada dosis de 0.5 ml contiene**: Bordetella pertussis no menos de 4 UI. Toxoides: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 30 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoides: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula de 5 ml (10 dosis). *Formulación de proceso. **Potencia de producto terminado. | NOM-036-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br><br>Manual de vacunación 2008-2009<br><br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br><br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3813.00 | **VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 UO. Toxoide diftérico No más de 30 Lf. Toxoide tetánico No más de 25 Lf. o Cada dosis de 0.5 ml contiene. Bordetella pertussis No menos de 4 UI. Toxoides Método de Reto Método de Seroneutralización Toxoide diftérico Mínimo 30 UI Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero Toxoide tetánico Mínimo 40 UI en cobayos Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero o Mínimo 60 UI en ratones Envase con frasco ámpula de 10 ml (20 dosis). *Formulación de proceso. **Potencia de producto terminado. | | |

9

# VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z24.0** Necesidad de inmunización contra la poliomielitis<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.41** Administración de vacuna poliomielitis (SABIN) | 020.000.3802.00 | **VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS** | Cada dosis de 0.1 ml (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo 1 no menos de 1 000 000 DICC50. Tipo 3 no menos de 600 000 DICC50. Envase gotero de plástico depresible con 2 ml (20 dosis). | NOM-036-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br><br>Manual de vacunación 2008-2009<br><br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br><br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3802.01 | **VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS** | Cada dosis de 0.1 ml (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo 1 no menos de 1 000 000 DICC50. Tipo 3 no menos de 600 000 DICC50. Tubo de plástico depresible con 25 dosis, cada una de 0.1 ml. | | |

10

# VACUNACIÓN CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z25.8** Necesidad de Inmunización contra otras enfermedades virales únicas específicas<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.4G** Vacunación contra el virus del papiloma humano | 020.000.4173.00 | **VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml. | NOM-036-SSA2-2012<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br><br>Manual de vacunación 2008-2009<br><br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br><br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br><br>GPC-SS-749-15-EyR<br><br>GPC-S-146-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.4173.01 | **VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml. | | |
| | 020.000.4173.02 | **VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 100 frascos ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml. | | |

11

# VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| CIE-10<br>**Z24.4** Necesidad de inmunización solo contra el sarampión<br><br>**Z24.5** Necesidad de inmunización solo contra la rubéola<br><br>**Z27.8** Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas<br><br>CIE-9-MC<br>**99.4F** Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral) | 020.000.3800.00 | **VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>GPC-IMSS-469-11-EyR<br>GPC-IMSS-419-10-EyR<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3804.00 | **VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para una dosis y diluyente. | | |

12

## VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z23.5** Necesidad de Inmunización solo contra tétanos<br>**Z23.6** Necesidad de inmunización contra la diftéria<br>**Z27.8** Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.3B** Vacunación contra difteria y tétanos (Td) | 020.000.3810.00 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis). | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>GPC-IMSS-580-12-EyR<br>GPC-IMSS-469-11-EyR<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3810.01 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml). | | |

13

# VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z27.1** Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis tétanos combinados (DPT)<br>**Z34.0** Supervisión de primer embarazo normal<br>**Z34.8** Supervisión de otros embarazos Normales<br>**Z34.9** Supervisión de embarazo normal no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.39**<br>Administración de vacuna combinada de difteria tétanos-tosferina | 020.000.3808.00 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>GPC-IMSS-580-12-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.3808.01 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml. | | |
| | 020.000.3808.02 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 ml. | | |
| | 020.000.3808.03 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 5 frascos ámpula con una dosis de 0.5 ml | | |

14

# VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z23.8** Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.3C** Vacunación contra neumococo 23 valente.<br>**99.3D** Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente) | 020.000.0146.00 | **VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. | NOM-036-SSA2-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Manual de vacunación 2008-2009<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más<br>GPC-SS-204-09-EyR<br>GPC-SS-203-09-EyR | Sin auxiliar |
| | 020.000.0146.01 | **VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. | | |
| | 020.000.0146.02 | **VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml. | | |

15

# PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN EL RECIÉN NACIDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z00.1** Control de salud de rutina del niño<br><br>**CIE-9-MC**<br>**00I.0** Tamiz metabólico (neonatal)<br>**00I.1** Tamiz auditivo (neonatal)<br>**89.7X** Reconocimiento médico general | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | NOM-034-SSA2-2013<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-007-SSA2-1993<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>GPC-SSA-226-09-EyR<br>GPC-SS-055-08-EyR<br>GPC-ISSSTE-699-13-EyR<br>GPC-ISSSTE-135-08-EyR<br>GPC-IMSS-246-12-EyR<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Tamiz auditivo neonatal<br>Tamiz neonatal básico |

16

## PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MENORES DE 5 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z00.1** Control de salud de rutina del niño<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.7X** Reconocimiento médico general | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Sin auxiliar |
| | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1704.00 | **SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml. | | |

17

# PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z00.1** Control de salud de rutina del niño<br>**Z01.0** Examen de ojos y de la visión<br>**Z01.1** Examen de oídos y de la audición<br>**Z01.2** Examen odontológico<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.7X** Reconocimiento médico general<br>**89.31** Examen dental<br>**95.41** Audiometría<br>**95.42** Prueba clínica de audición<br>**95.43** Evaluación audiológica<br>**95.44** Examen clínico de la función vestibular<br>**95.46** Otras pruebas auditivas y vestibulares<br>**95.47** Examen de la audición no especificada de otra manera | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-009-SSA2-2013<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años | Sin auxiliar |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.4376.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA** | Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.0 a 5.0 mg. Nicotinamida (niacinamida) 10.0 a 100.0 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.0 a 5.0 µg. Acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3.0 a 20.0 mg. Retinol (vitamina A) 2000.0 a 10000.0 UI. Colecalciferol (vitamina D3) 200.0 a 1000.0 UI. Acido pantoténico 2.0 a 7.0 mg. Sulfato ferroso 15.0 a 60.0 mg. Sulfato de cobre 1.0 a 4.0 mg. Yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4.0 mg. Glicerofosfato, sulfato o hiposulfito de magnesio 1.0 a 8.00 mg. Fosfato de magnesio 5.0 a 133.0 mg. Cloruro, fosfato o sulfato de zinc 3.0 a 25.0 mg. Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.1704.00 | **SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml. | | |
| | 010.000.1703.00 | **SULFATO FERROSO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas. | | |

18

## PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z00.0** Examen médico general<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**Z00.3** Examen del estado de desarrollo del adolescente<br>**Z70.0** Consulta relacionada con la actitud sexual<br>**Z70.1** Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente<br>**Z70.2** Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona<br>**Z70.3** Consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la orientación sexuales<br>**Z70.8** Otras consultas sexuales específicas<br>**Z70.9** Consulta sexual, no especificada<br>**Z71.7** Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]<br>**Z30.0** Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción<br>**Z01.0** Examen de ojos y de la visión<br>**Z01.1** Examen de oídos y de la audición<br>**Z01.4** Examen ginecológico (general) (de rutina)<br><br>**CIE-9-MC**<br>**95.47** Examen de la audición no | 010.000.1711.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas. | NOM-039-SSA2-2002<br>NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-030-SSA2-2009<br>NOM-028-SSA2-2009<br>NOM-010-SSA2-2010<br>NOM-009-SSA2-2013<br>NOM-005-SSA2-1993<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>GPC-SS-756-15-EyR<br>GPC-SS-639-13-EyR<br>GPC-SS-093-08-EyR<br>GPC-SS-023-08-EyR | Citología exfoliativa (Papanicolaou)<br>Colposcopía<br>ELISA para VIH<br>Prueba confirmatoria Western blot VIH-1<br>Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)<br>Prueba rápida de VIH |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.1703.00 | **SULFATO FERROSO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas. | | |

18

## PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| especificada de otra manera<br>**95.09** Examen oftalmológico, no especificado de otra manera<br><br>**89.31** Examen dental<br>**89.26** Examen ginecológico<br>**89.7X** Reconocimiento médico general | | | | | |

19

## PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z00.0** Examen médico general<br>**Z01.0** Examen de ojos y de la visión<br>**Z01.1** Examen de oídos y de la audición<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**Z01.3** Examen de la presión sanguínea<br>**Z01.4** Examen ginecológico (general) (de rutina)<br>**Z12.3** Examen de pesquisa especial para tumor de la mama<br>**Z12.4** Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino<br>**Z13.1** Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus<br>**Z30.0** Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción<br>**Z71.7** Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]<br>**R41.8** Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.26** Examen ginecológico<br>**89.31** Examen dental<br>**89.36** Examen manual de mama<br>**89.7X** Reconocimiento médico general<br>**95.09** Examen oftalmológico, no especificado de otra manera<br>**95.47** Examen de la audición no especificada de otra manera<br>**95.42** Prueba clínica de audición | 010.000.1711.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas. | NOM-041-SSA2-2011<br>NOM-030-SSA2-2009<br>NOM-015-SSA2-2010<br>NOM-014-SSA2-1994<br>NOM-010-SSA2-2010<br>NOM-004-SSA3-2012<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>GPC-SS-756-15-EyR<br>GPC-SS-093-08-EyR<br>GPC-SS-067-08-EyR<br>GPC-S-146-08-EyR<br>GPC-S-001-08-EyR<br>GPC-IMSS-246-12-EyR<br>GPC-IMSS-076-08-EyR | Biometría hemática completa<br>Citología exfoliativa (Papanicolaou)<br>Colposcopía<br>Densitometría ósea cadera y columna<br>ELISA para VIH<br>Mastografía Bilateral<br>Prueba confirmatoria Western blot VIH-1<br>Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)<br>Prueba rápida de VIH<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Sangre oculta en heces<br>Ultrasonido mamario bilateral |
| | 010.000.1703.00 | **SULFATO FERROSO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas. | | |

20

# PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z00.0** Examen médico general<br>**Z01.0** Examen de ojos y de la visión<br>**Z01.1** Examen de oídos y de la audición<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**Z01.3** Examen de la presión sanguínea<br>**Z12.3** Examen de pesquisa especial para tumor de la mama<br>**Z12.5** Examen de pesquisa especial para tumor de próstata<br>**Z13.1** Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus<br>**Z30.0** Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción<br>**Z71.7** Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]<br>**R41.8** Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.31** Examen dental<br>**89.36** Examen manual de mama<br>**89.7X** Reconocimiento médico general<br>**95.09** Examen oftalmológico, no especificado de otra manera<br>**95.47** Examen de la audición no especificada de otra manera | 010.000.1711.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas. | GPC-IMSS-076-08-EyR<br>GPC-SS-067-08-EyR<br>GPC-SS-093-08-EyR<br>GPC-SS-756-15-EyR<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-010-SSA2-2010<br>NOM-015-SSA2-2010<br>NOM-030-SSA2-2009<br>NOM-041-SSA2-2011 | Antígeno prostático libre (APL)<br>Biometría hemática completa<br>ELISA para VIH<br>Prueba confirmatoria Western blot VIH-1<br>Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)<br>Prueba rápida de VIH<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Sangre oculta en heces |
| | 010.000.1703.00 | **SULFATO FERROSO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas. | | |

21

# PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z01.0** Examen de ojos y de la visión<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**Z01.3** Examen de la presión sanguínea<br>**Z01.8** Otros exámenes especiales especificados<br>**Z11.1** Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria<br>**Z13.1** Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus<br>**Z12.3** Examen de pesquisa especial para tumor de la mama<br>**Z12.4** Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino<br>**R41.8** Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados<br>**Z01.1** Examen de oídos y de la audición<br>**Z12.5** Examen de pesquisa especial para tumor de próstata<br>**Z13.6** Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.31** Examen dental<br>**89.36** Examen manual de mama<br>**89.26** Examen ginecológico<br>**89.7X** Reconocimiento médico general<br>**95.47** Examen de la audición no especificada de otra manera<br>**95.09** Examen oftalmológico, no especificado de otra manera<br>**88.98** Estudios de la densidad mineral del hueso | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>GPC-IMSS-076-08-EyR<br>NOM-043-SSA2-2005<br>NOM-030-SSA2-2009<br>NOM-015-SSA2-2010<br>NOM-041-SSA2-2011<br>NOM-004-SSA3-2012<br>GPC-S-001-08-EyR<br>GPC-SS-017-08-EyR<br>GPC-SSA-021-08-EyR | Antígeno prostático libre (APL)<br>Biometría hemática completa<br>Citología exfoliativa (Papanicolaou)<br>Densitometría ósea cadera y columna<br>Mastografía Bilateral<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Sangre oculta en heces<br>Ultrasonido mamario bilateral |

21

## PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |

22

## DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F50.0** Anorexia nerviosa<br>**F50.1** Anorexia nerviosa atípica<br>**F50.2** Bulimia nerviosa<br>**F50.3** Bulimia nerviosa atípica<br>**Z00.3** Examen del estado de desarrollo del adolescente<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.39** Evaluación de estado nutricional<br>**94.37** Psicoterapia verbal exploratoria<br>**94.38** Psicoterapia verbal de apoyo<br>**94.42** Terapia familiar | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>GPC-SSA-113-08-EyR<br>NOM-039-SSA2-2002<br>NOM-043-SSA2-2005<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-009-SSA2-2013 | Sin auxiliar |

23

# PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T74.0** Negligencia o abandono<br>**T74.1** Abuso físico<br>**T74.2** Abuso sexual<br>**T74.3** Abuso psicológico<br>**T74.8** Otros síndromes del maltrato<br>**T74.9** Síndrome del maltrato, no especificado<br>**Z04.4** Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.<br><br>**CIE-9-MC**<br>**94.33** Terapia de comportamiento<br>**94.35** Intervención en crisis<br>**94.37** Psicoterapia verbal exploratoria<br>**94.38** Psicoterapia verbal de apoyo<br>**94.39** Otra psicoterapia individual<br>**94.42** Terapia familiar<br>**94.49** Otro asesoramiento | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | GPC-SS-294-10-EyR<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-009-SSA2-2013<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-046-SSA2-2005 | Sin auxiliar |

24

# OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z04.0** Prueba de alcohol o drogas en la sangre<br>**Z04.1** Examen y observación consecutivos a accidente de transporte<br>**Z04.2** Examen y observación consecutivos a accidente de trabajo<br>**Z04.3** Examen y observación consecutivos a otro accidente<br>**Z04.4** Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.<br>**Z04.5** Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida<br>**Z04.6** Examen psiquiátrico general, solicitado por una autoridad<br>**Z04.8** Examen y observación por otras razones especificadas<br>**Z04.9** Examen y observación por razones no especificadas<br><br>**CIE-9-MC**<br>**89.02** Entrevista y evaluación, descritas como limitadas<br>**89.03** Entrevista y evaluación, descritas como globales | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años<br>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años<br>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud<br>NOM-004-SSA3-20125 | Sin auxiliar |

25

## PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**89.31** Examen dental<br>**96.54** Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes<br><br>**CIE-9-MC**<br>**00.F3** Aplicación tópica de flúor<br>**00.F8** Control de placa dentobacteriana | 060.066.0500 | **FLUORURO DE SODIO** | Para prevención de caries, acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml. | GPC-SS-024-08-EyR<br>GPC-SS-519-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-013-SSA2-2006 | Sin auxiliar |

26

## CONSEJO Y ASESORÍA SOBRE EL USO DEL CONDÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z30.0** Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción | 060.308.0177 | **CONDÓN MASCULINO** | De hule látex. Envase con 100 piezas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-005-SSA2-1993 | Sin auxiliar |
| | 060.308.0227 | **CONDÓN FEMENINO** | De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual. | | |

27

# DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z13.3** Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento<br>**Z71.4** Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol<br>**Z71.5** Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas<br>**Z71.6** Consulta para asesoría por abuso de tabaco<br>**Z72.0** Problemas relacionados con el uso del tabaco<br>**Z72.1** Problemas relacionados con el uso del alcohol<br>**Z72.2** Problemas relacionados con el uso de drogas<br><br>**CIE-9-MC**<br>**94.45** Asesoramiento sobre toxicomanía<br>**94.46** Asesoramiento sobre alcoholismo | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | GPC-SS-023-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-028-SSA2-2009 | Sin auxiliar |

28

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**D50.0** Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica)<br>**D50.1** Disfagia sideropénica<br>**D50.8** Otras anemias por deficiencia de hierro<br>**D50.9** Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación<br>**D51.0** Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia del factor intrínseco<br>**D51.1** Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria<br>**D51.2** Deficiencia de trascobalamina II<br>**D51.3** Otras anemias por deficiencia dietética de vitamina B12<br>**D51.8** Otras anemias por deficiencia de vitamina B12<br>**D51.9** Anemia por deficiencia de vitamina B12, sin otra especificación<br>**O99.0** Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio<br><br>**CIE-9-MC**<br>**00.F0** Administración de infusión de hierro | 010.000.1706.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-415-10-EyR<br>GPC-SSA-221-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-043-SSA2-2005 | Biometría hemática completa<br>Frotis de sangre periférica |
| | 010.000.1706.01 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas. | | |
| | 010.000.1702.00 | **FUMARATO FERROSO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental. Envase con 120 ml. | | |
| | 010.000.1701.00 | **FUMARATO FERROSO TABLETA** | Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.1708.00 | **HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml o frasco ámpula y diluyente. | | |
| | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.4376.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA** | Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.0 a 5.0 mg. Nicotinamida (niacinamida) 10.0 a 100.0 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.0 a 5.0 µg. Acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3.0 a 20.0 mg. Retinol (vitamina A) 2000.0 a 10000.0 UI. Colecalciferol (vitamina D3) 200.0 a 1000.0 UI. Acido pantoténico 2.0 a 7.0 mg. Sulfato ferroso 15.0 a 60.0 mg. Sulfato de cobre 1.0 a 4.0 mg. Yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4.0 mg. Glicerofosfato, sulfato o hiposulfito de magnesio 1.0 a 8.00 mg. Fosfato de magnesio 5.0 a 133.0 mg. Cloruro, fosfato o sulfato de zinc 3.0 a 25.0 mg. Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.1704.00 | **SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml. | | |
| | 010.000.1703.00 | **SULFATO FERROSO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas. | | |

28

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **28.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 | | | | |

29

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E43X** Desnutrición proteico - calórica severa, no especificada<br>**E44.0** Desnutrición proteicocalórica moderada<br>**E44.1** Desnutrición proteicocalórica leve<br>**E46X** Desnutrición proteicocalórica, no especificada | 010.000.2707.00 | **ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas. | NOM-031-SSA2-1999<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>GPC-IMSS-029-08-EyR | Biometría hemática completa<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 5 elementos |
| | 010.000.2739.00 | **DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO** | Envase con 400-454 g con o sin sabor. | | |
| | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2191.00 | **VITAMINA A CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas. | | |
| | 020.000.3835.00 | **VITAMINA A SOLUCIÓN** | Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis. | | |
| | 020.000.3835.01 | **VITAMINA A SOLUCIÓN** | Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 50 dosis. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

29

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **29.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA |

30

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E40X** Kwashiorkor<br>**E42X** Kwashiorkor marasmático | 010.000.2739.00 | **DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO** | Envase con 400-454 g con o sin sabor. | GPC-IMSS-029-08-EyR<br>GPC-SSA-119-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Proteínas totales (albúmina y globulina)<br>Química sanguínea de 12 elementos |
| | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 030.000.0011.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

30

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **30.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR | | | **30.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR |

31

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E41X** Marasmo nutricional | 010.000.2739.00 | **DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO** | Envase con 400-454 g con o sin sabor. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Proteínas totales (albúmina y globulina)<br>Química sanguínea de 12 elementos |
| | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 030.000.0011.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

31

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **31.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO | | | **31.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO |

32

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E45X** Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico-calórica<br>**E64.0** Secuelas de la desnutrición proteicocalórica<br>**E64.1** Secuelas de la deficiencia de vitamina A<br>**E64.2** Secuelas de la deficiencia de vitamina C<br>**E64.3** Secuelas del raquitismo<br>**E64.8** Secuelas de otras deficiencias nutricionales<br>**E64.9** Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada | 010.000.5383.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin Auxiliar |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

32

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **32.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN |

33

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A38X** Escarlatina | 010.000.1938.00 | **BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | GPC-IMSS-466-11-EyR<br>GPC-IMSS-588-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Cultivo de exudado faríngeo<br>Velocidad de sedimentación globular |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

33

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **33.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA |

34

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B05.9** Sarampión sin complicaciones<br>**B06.9** Rubéola sin complicaciones<br>**B26.9** Parotiditis, sin complicaciones | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | GPC-IMSS-466-11-EyR<br>GPC-IMSS-588-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Cultivo de exudado faríngeo<br>Velocidad de sedimentación globular |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

34

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **34.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS |

35

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B01.9** Varicela sin complicaciones | 010.000.2126.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas. | GPC-IMSS-588-12-EyR<br>GPC-ISSSTE-129-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.4263.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas. | | |
| | 010.000.4264.00 | **ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula. | | |
| | 010.000.0801.00 | **BAÑO COLOIDE POLVO** | Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g. | | |
| | 010.000.0801.01 | **BAÑO COLOIDE POLVO** | Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

35

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **35.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA |

## 36 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A97.0** Dengue sin datos de alarma<br>**A92.0** Enfermedad por virus Chikungunya<br>**U06.9** Enfermedad del virus Zika | 010.000.3623.00 | **ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN** | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g. | GPC-IMSS-588-12-EyR<br>GPC-ISSSTE-129-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Anticuerpos IgM contra Dengue<br>Biometría hemática completa |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

36

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **36.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS) |

37

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B50.0** Paludismo debido a *Plasmodium falciparum* con complicaciones cerebrales<br>**B50.8** Otro paludismo grave y complicado debido a *Plasmodium falciparum*<br>**B50.9** Paludismo debido a *Plasmodium falciparum*, sin otra especificación<br>**B51.0** Paludismo debido a *Plasmodium vivax* con ruptura esplénica<br>**B51.8** Paludismo debido a *Plasmodium vivax* con otras complicaciones<br>**B51.9** Paludismo debido a *Plasmodium vivax,* sin complicaciones<br>**B52.0** Paludismo debido a *Plasmodium malariae* con nefropatía<br>**B52.8** Paludismo debido a *Plasmodium malariae* con otras complicaciones<br>**B52.9** Paludismo debido a *Plasmodium malariae,* sin complicaciones<br>**B53.0** Paludismo debido a Plasmodium ovale<br>**B53.1** Paludismo debido a plasmodios de los simios<br>**B53.8** Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte<br>**B54X** Paludismo (Malaria) no especificado | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-027-SSA2-2007<br>NOM-032-SSA2-2014 | Biometría hemática completa |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.2030.00 | **CLOROQUINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Envase con 1000 tabletas. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

37

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **37.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PALUDISMO | | | **37.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO |

38

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A75.0** Tifus epidémico debido a *Rickettsia prowazekii* transmitido por piojos<br>**A75.1** Tifus recrudescente [enfermedad de Brill]<br>**A75.2** Tifus debido a *Rickettsia typhi*<br>**A75.3** Tifus debido a *Rickettsia tsutsugamushi*<br>**A75.9** Tifus, no especificado<br>**A77.0** Fiebre maculosa debida a *Rickettsia rickettsii*<br>**A77.1** Fiebre maculosa debida a *Rickettsia conorii*<br>**A77.2** Fiebre maculosa debida a *Rickettsia siberica*<br>**A77.3** Fiebre maculosa debida a *Rickettsia australis*<br>**A77.8** Otras fiebres maculosas<br>**A77.9** Fiebre maculosa, no especificada<br>**A78X** Fiebre Q<br>**A79.0** Fiebre de las trincheras<br>**A79.1** Rickettsiosis pustulosa debida a *Rickettsia akari*<br>**A79.8** Otras rickettsiosis especificadas<br>**A79.9** Rickettsiosis, no especificada<br>**B73X** Oncocercosis | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-032-SSA2-2014 | Anticuerpo anti Rickettsia<br>Biometría hemática completa<br>Gota gruesa (Plasmodium) |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1981.00 | **TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas. | | |

38

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **38.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS | | | **38.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS |

39

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B57.0** Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón<br>**B57.1** Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón<br>**B57.2** Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón<br>**B57.3** Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo<br>**B57.4** Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso<br>**B57.5** Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-032-SSA2-2014 | Baciloscopía serie de 3<br>Biometría hemática completa<br>Gota gruesa (Plasmodium) |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2040.00 | **PRAZICUANTEL TABLETA** | Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas. | | |
| | 010.000.2031.00 | **PRIMAQUINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas. | | |

39

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **39.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS | | | **39.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS |

40

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B55.0** Leishmaniasis visceral<br>**B55.1** Leishmaniasis cutánea<br>**B55.2** Leishmaniasis mucocutánea<br>**B55.9** Leishmaniasis, no especificada | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-032-SSA2-2014 | Biometría hemática completa |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0906.00 | **DAPSONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

40

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **40.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LEISHMANIASIS | | | **40.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS |

41

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>J09X Influenza debida a ciertos virus de la influenza identificados<br>J10.0 Influenza con neumonía, debida a otro virus de la influenza estacional identificado<br>J10.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a otro virus de la influenza estacional identificado<br>J10.8 Influenza, con otras manifestaciones, debida a otro virus de la influenza estacional identificado<br>J11.0 Influenza con neumonía, virus no identificado<br>J11.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado<br>J11.8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | GPC SSA-203-09 EyR<br>GPC-SS-384-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Proteína C Reactiva |
| | 010.000.4582.00 | **OSELTAMIVIR CAPSULA** | Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75.0 mg. Envase con 10 cápsulas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

41

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **41.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA |

42

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**J02.0** Faringitis estreptocócica<br>**J02.8** Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados<br>**J02.9** Faringitis aguda, no especificada<br>**J03.0** Amigdalitis estreptocócica<br>**J03.8** Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados<br>**J03.9** Amigdalitis aguda, no especificada<br>**J06.0** Laringofaringitis aguda<br>**J06.8** Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores<br>**J06.9** Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada<br>**J36X** Absceso periamigdalino | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | GPC-IMSS-062-08-EyR<br>GPC-IMSS-073-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br>Cultivo de exudado faríngeo |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.1930.00 | **AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1938.00 | **BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | | |
| | 010.000.1923.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | | |
| | 010.000.1924.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

42

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

42

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **42.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA |

43

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**A37.0** Tos ferina debida a Bordetella pertussis<br>**A37.1** Tos ferina debida a Bordetella parapertussis<br>**A37.8** Tos ferina debida a otras especies de Bordetella<br>**A37.9** Tos ferina, no especificada | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Cultivo de exudado faríngeo |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

43

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **43.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA |

44

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**H65.0** Otitis media aguda serosa<br>**H65.1** Otra otitis media aguda, no supurativa<br>**H65.2** Otitis media crónica serosa<br>**H65.3** Otitis media crónica mucoide<br>H65.4 Otras otitis medias crónicas no supurativas<br>**H65.9** Otitis media no supurativa, sin otra especificación | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | GPC-IMSS-496-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

44

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

44

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **44.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA |

45

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**J00X** Rinofaringitis aguda (resfriado común) | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-IMSS-062-08-EyR<br>GPC-IMSS-073-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br>Cultivo de exudado faríngeo |
| | 010.000.0402.00 | **CLORFENAMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

45

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **45.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA |

46

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**J04.0** Laringitis aguda<br>**J04.1** Traqueítis aguda<br>**J04.2** Laringotraqueítis aguda | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-IMSS-258-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |

46

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **46.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA |

47

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**H66.0** Otitis media supurativa aguda<br>**H66.1** Otitis media tubotimpánica supurativa crónica<br>**H66.2** Otitis media supurativa crónica aticoantral<br>**H66.3** Otras otitis medias crónicas supurativas<br>**H66.4** Otitis media supurativa, sin otra especificación<br>**H66.9** Otitis media, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**20.1X** Extracción de tubo de miringotomía<br>20.09 Otras miringotomías<br>20.01 Miringotomía con inserción de tubo | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | GPC-IMSS-258-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Sin Auxiliar |
| | 010.000.2230.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

47

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

47

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **47.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA |

48

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**J01.0** Sinusitis maxilar aguda<br>**J01.1** Sinusitis frontal aguda<br>**J01.2** Sinusitis etmoidal aguda<br>**J01.3** Sinusitis esfenoidal aguda<br>**J01.4** Pansinusitis aguda<br>**J01.8** Otras sinusitis agudas<br>**J01.9** Sinusitis aguda, no especificada | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | GPC-IMSS-258-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br><br>Radiografía de senos paranasales |
| | 010.000.2230.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |

48

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

48

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **48.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA |

49

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**J45.0** Asma predominantemente alérgica<br>**J45.1** Asma no alérgica<br>**J45.8** Asma mixta<br>**J45.9** Asma, no especificado<br>**J46X** Estado asmático | 010.000.0426.00 | **AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>GPC-IMSS-806-17 EyR | Biometría hemática completa<br><br>Inmunoglobulina E<br><br>Espirometría<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.4334.00 | **BUDESONIDA POLVO** | Cada dosis contiene: Budesonida (micronizada) 100 µg. Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador. | | |
| | 010.000.0464.00 | **CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg. | | |
| | 010.000.0477.00 | **DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg. | | |
| | 010.000.2508.00 | **DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg. | | |
| | 010.000.2187.00 | **IPRATROPIO SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.2162.00 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2162.01 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2188.00 | **IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml. | | |
| | 010.000.2190.01 | **IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN** | Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis). | | |
| | 010.000.4329.00 | **MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE** | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | | |

49

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4330.00 | **MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.4335.02 | **MONTELUKAST GRANULADO** | Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres. | | |
| | 010.000.0431.00 | **SALBUTAMOL JARABE** | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0429.00 | **SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | | |
| | 010.000.0443.00 | **SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 µg de salmeterol. Propionato de fluticasona 50 µg. Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis. | | |
| | 010.000.0437.00 | **TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada. | | |

49

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **49.2** ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS | | | | **49.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS |

50

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**J45.0** Asma predominantemente alérgica<br>**J45.1** Asma no alérgica<br>**J45.8** Asma mixta<br>**J45.9** Asma, no especificado<br>**J46X** Estado asmático | 010.000.0426.00 | **AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | GPC-SS-009-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Espirometría<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.0464.00 | **CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg. | | |
| | 010.000.0477.00 | **DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg. | | |
| | 010.000.2508.00 | **DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg. | | |
| | 010.000.2187.00 | **IPRATROPIO SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.2162.00 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2162.01 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2188.00 | **IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml. | | |
| | 010.000.2190.01 | **IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN** | Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis). | | |
| | 010.000.4329.00 | **MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE** | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | | |

50

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4335.02 | **MONTELUKAST GRANULADO** | Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres. | | |
| | 010.000.0431.00 | **SALBUTAMOL JARABE** | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0429.00 | **SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | | |
| | 010.000.0443.00 | **SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 µg de salmeterol. Propionato de fluticasona 50 µg. Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis. | | |
| | 010.000.5075.00 | **TEOFILINA ELÍXIR** | Cada 100 ml contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml y dosificador. | | |

50

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **50.2** ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS | | | | **50.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS |

51

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A15.0** Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo<br>**A15.1** Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo<br>**A15.2** Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente<br>**A15.3** Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados<br>A15.4 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.5** Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.6** Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.7** Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.8** Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente<br>**A15.9** Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A16.0** Tuberculosis del pulmón, | 010.000.2403.00 | **ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml. | GPC-DIF-386-12-EyR<br>GPC-IMSS-070-08-EyR<br>GPC-SS-107-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-006-SSA2-2013<br>NOM-010-SSA2-2010 | Baciloscopía serie de 3<br>Biometría hemática completa<br>Cultivo de expectoración<br>ELISA para VIH<br>Estudio de drogoresistencia para fármacos de tuberculosis<br>Pruebas de función renal<br>Pruebas de función hepática<br>Prueba confirmatoria Western blot VIH-1<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2405.00 | **ETAMBUTOL TABLETA.** | Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.2404.00 | **ISONIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas. | | |
| | 010.000.2417.00 | **ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA** | Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas. | | |
| | 010.000.2418.00 | **ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2413.00 | **PIRAZINAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas. | | |

51

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| con examen bacteriológico e histológico negativos<br>**A16.1** Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico<br>**A16.2** Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.3** Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.4** Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.5** Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.7** Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.8** Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación<br>**A16.9** Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A17.0** Meningitis tuberculosa<br>**A17.1** Tuberculoma meníngeo<br>**A17.8** Otras tuberculosis del sistema nervioso<br>**A17.9** Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada<br>**A18.0** Tuberculosis de huesos y articulaciones<br>**A18.1** Tuberculosis del aparato genitourinario | 010.000.2409.00 | **RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.** | Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas. | | |

51

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **A18.2** Linfadenopatía periférica tuberculosa<br>**A18.3** Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos<br>**A18.4** Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo<br>**A18.5** Tuberculosis del ojo<br>**A18.6** Tuberculosis del oído<br>**A18.7** Tuberculosis de glándulas suprarrenales<br>**A18.8** Tuberculosis de otros órganos especificados<br>**A19.0** Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado<br>**A19.1** Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples<br>**A19.2** Tuberculosis miliar aguda, no especificada<br>**A19.8** Otras tuberculosis miliares<br>**A19.9** Tuberculosis miliar, sin otra especificación | | | | | |

51

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **51.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES) |

52

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A15.0** Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo<br>**A15.1** Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo<br>**A15.2** Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente<br>**A15.3** Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados<br>**A15.4** Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.5** Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.6** Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.7** Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A15.8** Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente<br>A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente<br>**A16.0** Tuberculosis del | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-DIF-386-12-EyR<br>GPC-IMSS-070-08-EyR<br>GPC-SS-107-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-006-SSA2-2013<br>NOM-010-SSA2-2010 | Baciloscopía serie de 3<br>Biometría hemática completa<br>Cultivo de expectoración<br>Depuración de creatinina<br>ELISA para VIH<br>Electrolitos séricos completos<br>Estudio de drogoresistencia para fármacos de tuberculosis<br>Perfil tiroideo<br>Pruebas de función renal<br>Pruebas de función hepática<br>Prueba confirmatoria Western blot VIH-1<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Química sanguínea de 6 elementos |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2403.00 | **ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml. | | |
| | 010.000.2405.00 | **ETAMBUTOL TABLETA.** | Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.2404.00 | **ISONIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas. | | |
| | 010.000.1951.00 | **KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.1007.00 | **LEVOTIROXINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.4261.02 | **OFLOXACINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |

52

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos<br><br>**A16.1** Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico<br>**A16.2** Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.3** Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.4** Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.5** Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.7** Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A16.8** Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación<br>**A16.9** Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica<br>**A17.0** Meningitis tuberculosa<br>**A17.1** Tuberculoma meníngeo<br>**A17.8** Otras tuberculosis del sistema nervioso<br>**A17.9** Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada<br>**A18.0** Tuberculosis de huesos y articulaciones | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | Audiometría<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada de tórax |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2413.00 | **PIRAZINAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.5232.00 | **PIRIDOXINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2409.00 | **RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.** | Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas. | | |

52

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **A18.1** Tuberculosis del aparato genitourinario<br>**A18.2** Linfadenopatía periférica tuberculosa<br>**A18.3** Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos<br>**A18.4** Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo<br>**A18.5** Tuberculosis del ojo<br>**A18.6** Tuberculosis del oído<br>**A18.7** Tuberculosis de glándulas suprarrenales<br>**A18.8** Tuberculosis de otros órganos especificados<br>**A19.0** Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado<br>**A19.1** Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples<br>**A19.2** Tuberculosis miliar aguda, no especificada<br>**A19.8** Otras tuberculosis miliares<br>**A19.9** Tuberculosis miliar, sin otra especificación<br>**U84.3** Resistencia a drogas antituberculosas | | | | | |

52

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **52.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES) |

53

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**H10.0** Conjuntivitis mucopurulenta<br>**H10.1** Conjuntivitis atópica aguda<br>**H10.2** Otras conjuntivitis agudas<br>**H10.3** Conjuntivitis aguda, no especificada<br>**H10.4** Conjuntivitis crónica<br>**H10.5** Blefaroconjuntivitis<br>**H10.8** Otras conjuntivitis<br>**H10.9** Conjuntivitis, no especificada<br>**B30.0** Queratoconjuntivitis debida a adenovirus<br>**B30.1** Conjuntivitis debida a adenovirus<br>**B30.2** Faringoconjuntivitis viral<br>**B30.3** Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica (enterovírica)<br>**B30.8** Otras conjuntivitis virales<br>**B30.9** Conjuntivitis viral, sin otra especificación<br><br>**CIE-9_MC**<br>**96.51** Irrigación del ojo | 010.000.2830.00 | **ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada 100 g contienen: Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g. | GPC-IMSS-035-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2175.00 | **CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA** | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2899.00 | **CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada g o ml contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2804.00 | **NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2823.00 | **NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2841.00 | **PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2185.00 | **PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g. | | |
| | 010.000.2186.00 | **PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml. | | |
| | 010.000.2829.00 | **SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.4407.00 | **TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2189.00 | **TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |

53

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **53.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS |

54

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**J30.0** Rinitis vasomotora<br>**J30.1** Rinitis alérgica debida al polen<br>**J30.2** Otra rinitis alérgica estacional<br>**J30.3** Otras rinitis alérgicas<br>**J30.4** Rinitis alérgica, no especificada | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-IMSS-041-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Citología nasal |
| | 010.000.0402.00 | **CLORFENAMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0405.00 | **DIFENHIDRAMINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0406.00 | **DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 010.000.5646.00 | **FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL NASAL** | Cada disparo proporciona: Furoato de fluticasona 27.5 µg. Envase con 120 disparos. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.4141.00 | **MOMETASONA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN** | Cada 100 ml contiene: Furoato de mometasona monohidratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidra. Envase nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una). | | |
| | 010.000.4329.00 | **MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE** | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.4330.00 | **MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.4335.02 | **MONTELUKAST GRANULADO** | Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres. | | |

54

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **54.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA |

55

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A09.0** Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso<br>**A09.9** Gastroenteritis y colitis de origen no especificado<br>**A04.0** Infección debida a Escherichia coli enteropatógena<br>**A04.1** Infección debida a Escherichia coli enterotoxígena<br>**A04.2** Infección debida a Escherichia coli enteroinvasiva<br>**A04.3** Infección debida a Escherichia coli enterohemorrágica<br>**A04.4** Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli<br>**A04.5** Enteritis debida a Campylobacter<br>**A04.6** Enteritis debida a Yersinia enterocolitica<br>**A04.7** Enterocolitis debida a Clostridium difficile<br>**A04.8** Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas<br>**A04.9** Infección intestinal bacteriana, no especificada<br>**A07.8** Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios<br>**A07.9** Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SS-009-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Espirometría<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.3622.00 | **ELECTROLITOS ORALES POLVO (Fórmula de Osmolaridad Baja)** | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 2.6 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g. | | |
| | 010.000.3623.00 | **ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN** | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3617.00 | **FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq) (Fosfato 20 mEq). Envase con 50 ampolletas con 10 ml | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

55

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **A08.4** Infección intestinal viral, sin otra especificación | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2524.00 | **NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml. | | |
| | 010.000.2519.00 | **NITAZOXANIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1981.00 | **TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

55

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **55.2** DIAGNÓSTICO Y ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO | **55.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO | | | **55.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO |

56

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A01.1** Fiebre paratifoidea A<br>**A01.2** Fiebre paratifoide B<br>**A01.3** Fiebre paratifoidea C<br>**A01.4** Fiebre paratifoidea, no especificada<br>**A02.0** Enteritis debida a salmonella<br>**A02.1** Sepsis debida a salmonella<br>**A02.2** Infecciones localizadas debidas a salmonella<br>**A02.8** Otras infecciones especificadas como debidas a salmonella<br>**A02.9** Infección debida a salmonella no especificada | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | GPC-ISSSTE-253-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Coprocultivo<br>Reacciones febriles<br>Velocidad de sedimentación globular |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.3623.00 | **ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN** | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |

56

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

56

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **56.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS |

57

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A01.0** Fiebre tifoidea | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | GPC-IMSS-259-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Coprocultivo<br>Reacciones febriles<br>Velocidad de sedimentación globular |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

57

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

57

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **57.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA |

58

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K29.1** Otras gastritis agudas<br>**K29.8** Duodenitis<br>K29.9 Gastroduodenitis, no especificada<br>**K30X** Dispepsia | 010.000.1224.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml y dosificador. | GPC-IMSS-071-08-EyR<br>GPC-ISSSTE-516-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Endoscopía con toma de biopsia<br>Endoscopía sin toma de biopsia<br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1223.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE** | Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1263.00 | **BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.2132.00 | **CLARITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |

58

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5186.00 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5186.01 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5186.02 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.5176.00 | **SUCRALFATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas. | | |

58

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **58.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA |

59

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F45.3** Disfunción autonómica somatomorfa<br>**K52.0** Colitis y gastroenteritis debidas a radiación<br>**K52.1** Colitis y gastroenteritis tóxicas<br>**K52.2** Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas<br>**K52.3** Colitis de etiología indeterminada<br>**K52.8** Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas<br>**K52.9** Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas<br>**K58.0** Síndrome del colon irritable con diarrea<br>**K58.9** Síndrome del colon irritable sin diarrea | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-042-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.4184.00 | **LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA** | Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1271.00 | **PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO** | Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g. | | |
| | 010.000.1270.00 | **SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 ml. | | |
| | 010.000.1272.00 | **SENÓSIDOS A Y B TABLETA** | Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas. | | |

59

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **59.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE |

60

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K21.0** Enfermedad de reflujo gastroesofágico con esofagitis | 010.000.2247.00 | **CINITAPRIDA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos. | GPC-ISSSTE-254-12-EyR<br><br>GPC-SS-013-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Endoscopía con toma de biopsia<br><br>Endoscopía sin toma de biopsia<br><br>Manometría esofágica (Endoscopía)<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.2248.00 | **CINITAPRIDA GRANULADO** | Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 30 sobres. | | |
| | 010.000.2249.00 | **CINITAPRIDA SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg de ORAL. cinitaprida. Envase con 120 ml (1 mg/5 ml) y cucharita dosificadora. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5186.02 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

60

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **60.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO |

61

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K25.7** Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación<br>**K27.7** Úlcera péptica crónica sin hemorragia ni perforación | 010.000.1224.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml y dosificador. | GPC-SSA-150-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Cultivo para H. Pylori<br>Endoscopía con toma de biopsia<br>Endoscopía sin toma de biopsia<br>Serie esofagogastroduodenal (SEGD)<br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1223.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE** | Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1263.00 | **BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml. | | |
| | 010.000.2132.00 | **CLARITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

61

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5186.02 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.5176.00 | **SUCRALFATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas. | | |

61

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **61.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA |

62

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A30.0** Lepra indeterminada<br>**A30.1** Lepra tuberculoide<br>**A30.2** Lepra tuberculoide limítrofe<br>**A30.3** Lepra limítrofe<br>**A30.4** Lepra lepromatosa limítrofe<br>**A30.5** Lepra lepromatosa<br>**A30.8** Otras formas de lepra<br>**A30.9** Lepra, no especificada | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-027-SSA2-2007<br>NOM-032-SSA2-2014 | Biometría hemática completa |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.1991.00 | **CLORANFENICOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0906.00 | **DAPSONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

62

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **62.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LEPRA | | | **62.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRA |

63

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B02.9** Herpes zoster sin complicaciones | 010.000.2126.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas. | GPC-SSA-217-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.4263.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas. | | |
| | 010.000.4264.00 | **ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula. | | |
| | 010.000.2714.00 | **COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA** | Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas. | | |
| | 010.000.4359.00 | **GABAPENTINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4356.01 | **PREGABALINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4372.00 | **VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 10 comprimidos recubiertos. | | |
| | 010.000.4372.01 | **VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir. Envase con 42 comprimidos recubiertos. | | |

63

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **63.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER |

64

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B15.9** Hepatitis aguda tipo A sin coma hepático<br>**B16.9** Hepatitis aguda tipo B con agente delta (coinfección), sin coma hepático | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS.** | | | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-039-SSA2-2002 | Biometría hemática completa<br>Perfil Hepatitis A, B, C<br>Pruebas de función hepática |

64

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **64.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B |

65

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B37.0** Estomatitis candidiásica | 010.000.2018.00 | **ITRACONAZOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2016.00 | **KETOCONAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4260.00 | **NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. Envase para 24 ml. | | |

65

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **65.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL |

66

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B35.0** Tiña de la barba y del cuero cabelludo<br>**B35.2** Tiña de la mano<br>**B35.3** Tiña del pie<br>**B35.4** Tiña del cuerpo<br>**B35.5** Tiña imbricada<br>**B35.6** Tiña inguinal<br>**B35.8** Otras dermatofitosis<br>**B35.9** Dermatofitosis no especificada<br>**B36.0** Pitiriasis versicolor<br>**B36.1** Tiña negra<br>**B36.2** Piedra blanca<br>**B36.3** Piedra negra<br>**B36.8** Otras micosis superficiales especificadas<br>**B36.9** Micosis superficial, sin otra especificación | 010.000.2024.00 | **ISOCONAZOL CREMA** | Cada 100 g contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g. | GPC-IMSS-086-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin Auxiliar |
| | 010.000.2018.00 | **ITRACONAZOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2016.00 | **KETOCONAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0891.00 | **MICONAZOL CREMA** | Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g. | | |

66

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **66.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS) |

67

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B35.1** Tiña de las uñas | 010.000.2018.00 | **ITRACONAZOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | GPC-IMSS-086-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2016.00 | **KETOCONAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

67

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **67.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS |

68

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A06.0** Disentería amebiana aguda<br>**A06.1** Amebiasis intestinal crónica<br>**A06.2** Colitis amebiana no disentérica<br>**A06.3** Ameboma intestinal | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Amiba en fresco<br>Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2524.00 | **NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml. | | |

68

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **68.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS |

69

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B76.0** Anquilostomiasis<br>**B76.1** Necatoriasis<br>**B76.8** Otras enfermedades debidas a anquilostomas<br>**B76.9** Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

69

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **69.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS |

70

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B77.0** Ascariasis con complicaciones intestinales<br>**B77.8** Ascariasis con otras complicaciones<br>**B77.9** Ascariasis, no especificada | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.2138.00 | **PIRANTEL TABLETA** | Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

70

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **70.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS |

71

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B80X** Enterobiasis | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

71

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **71.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS |

72

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B67.0** Infección del hígado debida a Echinococcus granulosus<br>**B67.1** Infección del pulmón debida a Echinococcus granulosus<br>**B67.2** Infección de hueso debida a Echinococcus granulosus<br>**B67.3** Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a Echinococcus granulosus<br>**B67.4** Infección debida a Echinococcus granulosus, sin otra especificación<br>**B67.5** Infección del hígado debida a Echinococcus multilocularis<br>**B67.6** Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a Echinococcus multilocularis<br>**B67.7** Infección debida a Echinococcus multilocularis, sin otra especificación<br>**B67.8** Equinococosis del hígado, no especificada<br>**B67.9** Equinococosis, otra y la no especificada | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

72

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **72.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS |

73

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B65.0** Esquistosomiasis debida a Schistosoma haematobium (esquistosomiasis urinaria)<br>**B65.1** Esquistosomiasis debida a Schistosoma mansoni [esquistosomiasis intestinal]<br>**B65.2** Esquistosomiasis debida a Schistosoma japonicum<br>**B65.3** Dermatitis por cercarias<br>**B65.8** Otras esquistosomiasis<br>**B65.9** Esquistosomiasis, no especificada | 010.000.2040.00 | **PRAZICUANTEL TABLETA** | Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

73

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **73.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS |

74

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B78.0** Estrongiloidiasis intestinal<br>**B78.1** Estrongiloidiasis cutánea<br>**B78.7** Estrongiloidiasis diseminada<br>**B78.9** Estrongiloidiasis, no especificada | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |

74

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **74.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS |

75

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B74.0** Filariasis debida a Wuchereria bancrofti<br>**B74.1** Filariasis debida a Brugia malayi<br>**B74.2** Filariasis debida a Brugia timori<br>**B74.3** Loaiasis<br>**B74.4** Mansoneliasis<br>**B74.8** Otras filariasis<br>**B74.9** Filariasis, no especificada | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |

75

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **75.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS |

76

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A07.1** Giardiasis (lambliasis) | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-ISSSTE-252-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2519.00 | **NITAZOXANIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.2524.00 | **NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml. | | |

76

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **76.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS |

77

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B68.0** Teniasis debida a Taenia solium<br>**B68.1** Infección debida a Taenia saginata<br>**B68.9** Teniasis, no especificada | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.2040.00 | **PRAZICUANTEL TABLETA** | Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas. | | |

77

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **77.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS |

78

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B79X** Tricuriasis | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

78

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **78.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS |

79

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B75X** Triquinosis | 010.000.1344.00 | **ALBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Coproparasitoscópicos de 3 muestras |
| | 010.000.1345.00 | **ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | | |
| | 010.000.2136.00 | **MEBENDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | | |

79

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **79.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS |

80

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A23.0** Brucelosis debida a Brucella melitensis<br>**A23.1** Brucelosis debida a Brucella abortus<br>**A23.2** Brucelosis debida a Brucella suis<br>**A23.3** Brucelosis debida a Brucella canis<br>A23.8 Otras brucelosis<br>**A23.9** Brucelosis, no especificada | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | GPC-ISSSTE-254-12-EyR<br>GPC-SS-013-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Antígeno con P-2 mercaptoetanol en microplaca<br>Anticuerpo anti Brucela (Rosa de Bengala) |
| | 010.000.4258.00 | **CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2403.00 | **ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.4300.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5186.00 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

80

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.2151.00 | **RANITIDINA JARABE** | Cada 10 ml contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml. | | |
| | 010.000.2409.00 | **RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.** | Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas. | | |
| | 010.000.2410.00 | **RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1981.00 | **TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

80

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **80.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS |

81

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>B86X Escabiosis | 010.000.0861.00 | **BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA** | Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml. | GPC-IMSS-543-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-039-SSA2-2002 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0865.00 | **PERMETRINA SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml. | | |

81

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **81.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS |

82

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>B85.0 Pediculosis debida a Pediculus humanus capitis<br>B85.1 Pediculosis debida a Pediculus humanus corporis<br>B85.2 Pediculosis, sin otra especificación<br>B85.3 Phthiriasis<br>B85.4 Pediculosis y phthiriasis mixtas | 010.000.0861.00 | **BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA** | Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml. | GPC-IMSS-602-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | | |
| | 060.782.0016 | **DIMETICONA** | Cada 100 ml contiene: Dimeticona 99.4 + 0.4%, Aceite de tocoferol 0.2 + 0.05%, Aceite de chabacano 0.2 + 0.05%, Aceite de almendra 0.2 + 0.05%. Botella con aplicador de 100 ml, peine de dientes finos de acero inoxidable. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0865.00 | **PERMETRINA SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml. | | |

82

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **82.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS |

83

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>A46X Erisipela<br><br>L03.0 Celulitis de los dedos de la mano y del pie<br><br>L03.1 Celulitis de otras partes de los miembros<br><br>L03.2 Celulitis de la cara<br><br>L03.3 Celulitis del tronco<br><br>L03.8 Celulitis de otros sitios<br><br>L03.9 Celulitis de sitio no especificado | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Velocidad de sedimentación globular |
| | 010.000.1923.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1921.00 | **BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1933.00 | **BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5284.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

83

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

83

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **83.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS |

84

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>A54.0 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral y de glándula accesoria<br><br>A54.1 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias<br><br>A54.2 Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias<br><br>A54.3 Infección gonocócica del ojo<br><br>A54.4 Infección gonocócica del sistema osteomuscular<br><br>A54.5 Faringitis gonocócica<br><br>A54.6 Infección gonocócica del ano y del recto<br><br>A54.8 Otras infecciones gonocócicas<br><br>A54.9 Infección gonocócica, no especificada | 010.000.1969.01 | **AZITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | GPC-SS-729-14-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-039-SSA2-2002 | Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal<br><br>Cultivo de exudado uretral |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |

84

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **84.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA |

85

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>A55X Linfogranuloma venéreo por clamidias<br>A56.0 Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias<br>A56.1 Infección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias<br>A56.2 Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación<br>A56.3 Infección del ano y del recto debida a clamidias<br>A56.4 Infección de faringe debida a clamidias<br>A56.8 Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias<br>A71.0 Estado inicial de tracoma<br>A71.1 Estado activo de tracoma<br>A71.9 Tracoma, no especificado<br>B94.0 Secuelas de tracoma | 010.000.1969.01 | **AZITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | GPC-IMSS-072-08-EyR<br>GPC-IMSS-081-08-EyR<br>GPC-IMSS-094-08-EyR<br>GPC-IMSS-402-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-006-SSA2-2013<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-039-SSA2-2002<br>GPC-SS-006-08-EyR | Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal<br>Cultivo de exudado uretral |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.4261.02 | **OFLOXACINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas. | | |

85

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **85.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA) |

86

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>A59.0 Tricomoniasis urogenital<br>A59.8 Tricomoniasis de otros sitos<br>A59.9 Tricomoniasis, no especificada | 010.000.1561.00 | **METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas. | GPC-IMSS-081-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-039-SSA2-2002 | Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

86

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **86.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS |

87

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>A51.0 Sífilis genital primaria<br>A51.1 Sífilis primaria anal<br>A51.2 Sífilis primaria en otros sitios<br>A51.3 Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas<br>A51.4 Otras sífilis secundarias<br>A51.5 Sífilis precoz, latente<br>A51.9 Sífilis precoz, sin otra especificación<br>A52.0 Sífilis cardiovascular<br>A52.1 Neurosífilis sintomática<br>A52.2 Neurosífilis asintomática<br>A52.3 Neurosífilis no especificada<br>A52.7 Otras sífilis tardías sintomáticas<br>A52.8 Sífilis tardía, latente<br>A52.9 Sífilis tardía, no especificada<br>A53.0 Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía<br>A53.9 Sífilis, no especificada | 010.000.1969.01 | **AZITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | GPC-IMSS-094-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-039-SSA2-2002 | Examen de campo oscuro para sífilis<br>Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)<br>VDRL |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |

87

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **87.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA |

88

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>A57X Chancro blando | 010.000.1969.01 | **AZITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | GPC-IMSS-094-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-039-SSA2-2002 | Cultivo de secreción de herida |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |

88

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **88.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO |

89

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>N30.0 Cistitis aguda<br>N30.1 Cistitis intersticial (crónica)<br>N30.2 Otras cistitis crónicas<br>N30.3 Trigonitis<br>N30.4 Cistitis por irradiación<br>N30.8 Otras cistitis<br>N30.9 Cistitis, no especificada<br>N39.0 Infección de vías urinarias, sitio no especificado<br>O23.0 Infección del riñón en el embarazo<br>O23.1 Infección de la vejiga urinaria en el embarazo<br>O23.2 Infección de la uretra en el embarazo<br>O23.3 Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo<br>O23.4 Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo<br>O23.9 Otras Infección y las no especificadas de las vías genitourinarias en el embarazo<br>O23.5 Infección genital en el embarazo | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | GPC-IMSS-077-08-EyR<br>GPC-SS-027-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Examen general de orina<br>Urocultivo |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.1911.00 | **NITROFURANTOÍNA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |

89

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

89

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **89.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS |

90

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>A60.0 Infección de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes [herpes simple]<br><br>A60.1 Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes simple<br><br>A60.9 Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificación | 010.000.2126.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas. | GPC-IMSS-094-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-039-SSA2-2002 | Inmunofluorescencia<br><br>Prueba de Tzanck |
| | 010.000.4263.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas. | | |
| | 010.000.4372.00 | **VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 10 comprimidos recubiertos. | | |
| | 010.000.4372.01 | **VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir. Envase con 42 comprimidos recubiertos. | | |

90

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **90.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL |

91

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L23.0 Dermatitis alérgica de contacto debida a metales<br>L23.1 Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos<br>L23.2 Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos<br>L23.3 Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en contacto con la piel<br>L23.4 Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes<br>L23.5 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos químicos<br>L23.6 Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel<br>L23.7 Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias<br>L23.8 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes<br>L23.9 Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-IMSS-560-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0813.00 | **HIDROCORTISONA CREMA** | Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0804.00 | **ÓXIDO DE ZINC PASTA** | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

91

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **91.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO |

92

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**L20.0** Prurigo de Besnier<br>**L20.8** Otras dermatitis atópicas<br>**L20.9** Dermatitis atópica, no especificada | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-IMSS-033-08-EyR<br>GPC-IMSS-706-14-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0813.00 | **HIDROCORTISONA CREMA** | Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0804.00 | **ÓXIDO DE ZINC PASTA** | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

92

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **92.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA |

93

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L24.0 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes<br>L24.1 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas<br>L24.2 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes<br>L24.3 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos<br>L24.4 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel<br>L24.5 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos químicos<br>L24.6 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel<br>L24.7 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias<br>L24.8 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes<br>L24.9 Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-IMSS-560-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0813.00 | **HIDROCORTISONA CREMA** | Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0804.00 | **ÓXIDO DE ZINC PASTA** | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

93

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **93.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES |

94

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L22X Dermatitis del pañal | 010.000.0804.00 | **ÓXIDO DE ZINC PASTA** | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |

94

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **94.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL |

95

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L26X Dermatitis exfoliativa | 010.000.0871.00 | **ALIBOUR POLVO** | Cada g contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0804.00 | **ÓXIDO DE ZINC PASTA** | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

95

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **95.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA |

96

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L21.0 Seborrea capitis<br>L21.1 Dermatitis seborreica infantil<br>L21.8 Otras dermatitis seborreicas<br>L21.9 Dermatitis seborreica, no especificada | 010.000.0831.00 | **ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA** | Cada ml contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml. | GPC-SSA-159-09-EyR<br>GPC-SSA-205-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.2018.00 | **ITRACONAZOL CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0891.00 | **MICONAZOL CREMA** | Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g. | | |

96

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **96.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA |

97

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B07X** Verrugas víricas | 010.000.0901.00 | **PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA** | Cada ml contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml. | GPC-ISSSTE-250-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |

97

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **97.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES |

98

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**L70.0** Acné vulgar<br>**L70.1** Acné conglobado<br>**L70.2** Acné varioliforme<br>**L70.3** Acné tropical<br>**L70.4** Acné infantil<br>**L70.5** Acné excoriado de la mujer joven<br>**L70.8** Otros acnés<br>**L70.9** Acné, no especificado | 010.000.0904.00 | **ÁCIDO RETINOICO CREMA** | Cada 100 g contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g. | GPC-SSA-224-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0822.00 | **BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO** | Cada 100 ml o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 ml. | | |
| | 010.000.0822.01 | **BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO** | Cada 100 ml o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 Ml. | | |
| | 010.000.0822.02 | **BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO** | Cada 100 ml o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g. | | |
| | 010.000.4136.00 | **CLINDAMICINA GEL** | Cada 100 g contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4139.01 | **MINOCICLINA GRAGEA** | Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina. Envase con 48 grageas. | | |

98

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **98.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ |

99

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**L40.0** Psoriasis vulgar<br>**L40.1** Psoriasis pustulosa generalizada<br>**L40.2** Acrodermatitis continua<br>**L40.3** Pustulosis palmar y plantar<br>**L40.4** Psoriasis guttata<br>**L40.8** Otras psoriasis<br>**L40.9** Psoriasis, no especificada | 010.000.1700.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas. | GPC-IMSS-696-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Creatinina en sangre<br>Pruebas de función hepática |
| | 010.000.0831.00 | **ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA** | Cada ml contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml. | | |
| | 010.000.2119.00 | **BETAMETASONA UNGÜENTO** | Cada 100 g contienen: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.0813.00 | **HIDROCORTISONA CREMA** | Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g. | | |
| | 010.000.1759.00 | **METOTREXATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas | | |

99

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **99.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS |

100

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E78.0** Hipercolesterolemia pura<br>**E78.1** Hipergliceridemia pura<br>**E78.2** Hiperlipidemia mixta<br>**E78.3** Hiperquilomicronemia<br>**E78.4** Otra hiperlipidemia<br>**E78.5** Hiperlipidemia no especificada<br>**E78.6** Deficiencia de lipoproteínas<br>**E78.8** Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas<br>**E78.9** Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado | 010.000.5106.00 | **ATORVASTATINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina. Envase con 10 tabletas. | GPC-IMSS-233-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-037-SSA2-2012 | Perfil de lípidos |
| | 010.000.0655.00 | **BEZAFIBRATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4024.05 | **EZETIMIBA TABLETA** | Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0657.00 | **PRAVASTATINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4124.00 | **SIMVASTATINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.4124.01 | **SIMVASTATINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

100

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **100.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA |

101

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**E66.0** Obesidad debida a exceso de calorías<br><br>**E66.8** Otros tipos de obesidad | 010.000.5165.00 | **METFORMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-IMSS-046-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-690-13-EyR<br><br>GPC-SS-025-08-EyR<br><br>GPC-SS-742-15-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-008-SSA3-2010<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Perfil de lípidos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |

101

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **101.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA |

102

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**E10.9** Diabetes Mellitus tipo 1 sin mención de complicación | 010.000.6117.00 | **INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml). | GPC-SSA-302-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-015-SSA2-2010 | Curva de tolerancia a la glucosa<br><br>Examen general de orina<br><br>Glucosa sérica<br><br>Glucosa capilar<br><br>Hemoglobina glucosilada<br><br>Microalbuminuria<br><br>Perfil de lípidos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 010.000.4156.00 | **INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina aspártica (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4165.00 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4165.01 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4158.00 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4158.01 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo desechable | | |
| | 010.000.1051.00 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1051.01 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10ml. | | |
| | 010.000.4157.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA** | Cada ml contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1050.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1050.01 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |

102

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4162.00 | **INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4148.00 | **INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml. | | |
| | | | | | |

102

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **102.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 |

103

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**E11.9** Diabetes mellitus tipo 2 sin mención de complicación<br><br>**R73.0** Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa | 010.000.1042.00 | **GLIBENCLAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-015-SSA2-2010 | Curva de tolerancia a la glucosa<br><br>Examen general de orina<br><br>Glucosa sérica<br><br>Glucosa capilar<br><br>Hemoglobina glucosilada<br><br>Microalbuminuria<br><br>Perfil de lípidos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 010.000.6117.00 | **INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4156.00 | **INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina aspártica (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4165.00 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4165.01 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4158.00 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4158.01 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo desechable | | |
| | 010.000.1051.00 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.4157.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA** | Cada ml contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1050.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1050.01 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4162.00 | **INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |

103

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4148.00 | **INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml. | | |
| | 010.000.5621.00 | **LINAGLIPTINA TABLETAS** | Cada tableta contiene: Linagliptina de 5 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5165.00 | **METFORMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4152.00 | **SITAGLIPTINA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Fosfato de Sitagliptina monohidratada equivalente a 100 mg de Sitagliptina. Envase con 14 comprimidos. | | |
| | 010.000.4152.01 | **SITAGLIPTINA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Fosfato de Sitagliptina monohidratada equivalente a 100 mg de Sitagliptina. Envase con 28 comprimidos. | | |
| | 010.000.5620.00 | **VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. Envase con 28 comprimidos. | | |

103

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **103.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 |

104

## DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E10.3** Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)<br>**E11.3** Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)<br>**E12.3** Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)<br>**E13.3** Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)<br>**E14.3** Otras diabetes mellitus no especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética) | SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS | | | GPC-IMSS-171-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Química sanguínea de 3 elementos |

104

## DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **104.1** DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA |

105

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E05.0** Tirotoxicosis con bocio difuso<br>**E05.1** Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico<br>**E05.2** Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico<br>**E05.3** Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico<br>**E05.4** Tirotoxicosis facticia<br>**E05.8** Otras tirotoxicosis<br>**E05.9** Tirotoxicosis, no especificada | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-SSA-292-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Examen general de orina<br>Perfil tiroideo<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Gammagrama tiroideo con tecnecio o yodo |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0539.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1022.00 | **TIAMAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

105

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **105.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO |

106

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E05.5** Crisis o tormenta tirotóxica<br>**O90.5** Tiroiditis postparto | 010.000.0474.00 | **HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | GPC-IMSS-514-11-EyR<br>GPC-SSA-292-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Anticuerpos Anti peroxidasa<br>Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Perfil tiroideo<br>Química sanguínea de 12 elementos<br>Electrocardiograma |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1022.00 | **TIAMAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

106

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **106.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE CRISIS TIROTÓXICA | **106.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE CRISIS TIROTÓXICA | | | **106.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA |

107

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E00.0** Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico<br>**E00.1** Síndrome de deficiencia congénita de yodo, tipo mixedematoso<br>**E00.2** Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo mixto<br>**E00.9** Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado<br>**E01.0** Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo<br>**E01.1** Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo<br>**E01.2** Bocio (endémico) relacionado con deficiencia de yodo, no especificado<br>**E01.8** Otros trastornos de la tiroides relacionados con deficiencia de yodo y afecciones similares<br>**E02X** Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo<br>**E03.0** Hipotiroidismo congénito con bocio difuso<br>**E03.1** Hipotiroidismo congénito sin bocio<br>**E03.2** Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas<br>**E03.3** Hipotiroidismo postinfeccioso<br>**E03.4** Atrofia de tiroides (adquirida) | 010.000.1007.00 | **LEVOTIROXINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas. | GPC-IMSS-265-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-034-SSA2-2013 | Anticuerpos Anti peroxidasa<br>Anticuerpos Anti tiroglobulina<br>Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Perfil de lípidos<br>Perfil tiroideo<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Gammagrama tiroideo con tecnecio o yodo<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Telerradiografía de tórax<br>Ultrasonido tiroideo |

107

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **E03.5** Coma mixedematoso<br>**E03.8** Otros hipotiroidismos especificados<br>**E03.9** Hipotiroidismo, no especificado<br>**E04.0** Bocio difuso no tóxico<br>**E04.1** Nódulo tiroideo solitario no tóxico<br>**E04.2** Bocio multinodular no tóxico<br>**E04.8** Otros bocios no tóxicos especificados<br>**E04.9** Bocio no tóxico, no especificado | | | | | |

107

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **107.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO |

108

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**M15.4** (Osteo) artrosis erosiva<br>**M15.9** Poliartrosis, no especificada | 010.000.0101.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-329-10-EyR<br>GPC-ISSSTE-199-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5505.00 | **CELECOXIB CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.3413.00 | **INDOMETACINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.4202.00 | **INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |

108

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **108.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA |

109

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**M54.3** Ciática<br>**M54.4** Lumbago con ciática<br>**M54.5** Lumbago no especificado | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | NOM-004-SSA3-2012 | Electromiografía<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | | |
| | 040.000.2098.00 | **BUPRENORFINA PARCHE** | Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 040.000.2608.00 | **CARBAMAZEPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5505.00 | **CELECOXIB CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

109

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2714.00 | **COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA** | Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3413.00 | **INDOMETACINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.4249.00 | **LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3444.00 | **METOCARBAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

109

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |

109

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **109.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LUMBALGIA | **109.1** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LUMBALGIA | | | **109.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA |

110

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**M80.0** Osteoporosis postmenopáusica, con fractura patológica<br>**M80.1** Osteoporosis postooforectomía, con fractura patológica<br>**M80.2** Osteoporosis por desuso, con fractura patológica<br>**M80.3** Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, con fractura patológica<br>**M80.4** Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patológica<br>**M80.5** Osteoporosis idiopática, con fractura patológica<br>M80.8 Otras osteoporosis, con fractura patológica<br>**M80.9** Osteoporosis no especificada, con fractura patológica<br>**M81.0** Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica<br>**M81.1** Osteoporosis postooforectomía, sin fractura patológica<br>**M81.2** Osteoporosis por desuso, sin fractura patológica<br>**M81.3** Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, sin fractura patológica<br>**M81.4** Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patológica<br>**M81.5** Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica<br>**M81.6** Osteoporosis localizada [Lequesne], sin fractura patológica<br>**M81.8** Otras osteoporosis, sin fractura patológica<br>**M81.9** Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica | 010.000.4161.00 | **ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO** | Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos. | GPC-IMSS-083-08-EyR<br>GPC-IMSS-673-13-EyR<br>GPC-IMSS-677-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Paratohormona (PTH)<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Densitometría |
| | 010.000.4164.00 | **ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO** | Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos. | | |
| | 010.000.4167.00 | **ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.5468.00 | **ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con 5 ml contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1006.00 | **CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE** | Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | | |
| | 010.000.1095.00 | **CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. Envase con 50 cápsulas. | | |
| | 010.000.6000.00 | **CARBONATO DE CALCIO / VITAMINA D3 TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbonato de calcio 1666.670 mg equivalente a 600 mg de calcio Colecalciferol 6.2 mg equivalente a 400 UI de Vitamina D3. Envase con 30 tabletas | | |
| | 010.000.4163.00 | **RALOXIFENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas. | | |

110

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **110.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS |

111

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E79.0** Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofácea<br>**M10.0** Gota idiopática<br>**M10.1** Gota saturnina<br>**M10.2** Gota inducida por drogas<br>**M10.3** Gota debida a alteración de la función renal<br>**M10.4** Otras gotas secundarias<br>**M10.9** Gota, no especificada | 010.000.2503.00 | **ALOPURINOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-SSA-216-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Examen general de orina<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2503.01 | **ALOPURINOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.3451.00 | **ALOPURINOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5505.00 | **CELECOXIB CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.3409.00 | **COLCHICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3413.00 | **INDOMETACINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.4202.00 | **INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

111

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **111.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA |

112

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**M05.9** Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificación<br>**M05.8** Otras artritis reumatoideas seropositivas<br>**M06.0** Artritis reumatoide seronegativa<br>**M06.1** Enfermedad de Still de comienzo en el adulto<br>**M06.2** Bursitis reumatoide<br>**M06.3** Nódulo reumatoide<br>**M06.4** Poliartropatía inflamatoria<br>**M06.8** Otras artritis reumatoides especificadas<br>**M06.9** Artritis reumatoide, no especificada<br>**M08.0** Artritis reumatoide juvenil<br>**M08.2** Artritis juvenil de comienzo generalizado<br>**M08.3** Poliartritis juvenil (seronegativa)<br>**M08.9** Artritis juvenil, no especificada | 010.000.3461.00 | **AZATIOPRINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas. | GPC-IMSS-195-10-EyR<br><br>GPC-IMSS-369-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Factor reumatoide (FR)<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Proteína C Reactiva<br><br>Velocidad de sedimentación globular<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5505.00 | **CELECOXIB CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.2030.00 | **CLOROQUINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Envase con 1000 tabletas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3413.00 | **INDOMETACINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.4514.00 | **LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.4515.00 | **LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos. | | |
| | 010.000.1760.00 | **METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1759.00 | **METOTREXATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

112

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0473.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4504.00 | **SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA** | Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica. | | |

112

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **112.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE |

113

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Q65.0** Luxación congénita de la cadera, unilateral<br>**Q65.1** Luxación congénita de la cadera, bilateral<br>**Q65.2** Luxación congénita de la cadera, no especificada<br>**Q65.3** Subluxación congénita de la cadera, unilateral<br>**Q65.4** Subluxación congénita de la cadera, bilateral<br>**Q65.5** Subluxación congénita de la cadera, no especificada<br>**Q65.6** Cadera inestable<br>**Q65.8** Otras deformidades congénitas de la cadera<br>**Q65.9** Deformidad congénita de la cadera, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**00.C0** Ejercicio isocinético<br>**00.C6** Terapia ocupacional en paciente pediátrico<br>**93.11** Ejercicio asistido<br>**93.12** Otro ejercicio activo musculoesquelético<br>**93.13** Ejercicios resistidos<br>**93.14** Entrenamiento en movimientos de articulaciones<br>**93.16** Movilización de otras articulaciones<br>**93.17** Otro ejercicio pasivo musculoesquelético<br>**93.19** Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | GPC-S-091-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-034-SSA2-2013 | Radiografía 2 proyecciones |

113

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **113.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA |

114

## REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z50.1** Otras terapias físicas<br>**Z50.8** Atención por otros procedimientos de rehabilitación<br>**Z50.9** Atención por procedimiento de rehabilitación no especificada<br>**00.C5** Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior<br>**00.C7** Terapia ocupacional en paciente neurológico<br>**00.C8** Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de órtesis en pacientes amputados<br>**00.C9** Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en pacientes amputados<br><br>**CIE-9-MC**<br>**93.01** Evaluación funcional<br>**93.04** Pruebas manuales de función muscular: (Balance muscular)<br>**93.05** Pruebas de amplitud de movimiento: (Balance articular)<br>**93.11** Ejercicio asistido<br>**93.12** Otro ejercicio activo musculoesquelético<br>**93.13** Ejercicios resistidos<br>**93.14** Entrenamiento en movimientos de articulaciones<br>**93.16** Movilización de otras articulaciones<br>**93.17** Otro ejercicio pasivo musculoesquelético<br>**93.19** Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-IMSS-115-08-EyR<br>GPC-IMSS-139-08-EyR<br>GPC-IMSS-193-08-EyR<br>GPC-IMSS-266-10-EyR<br>GPC-IMSS-267-10-EyR<br>GPC-IMSS-437-12-EyR<br>GPC-IMSS-493-11-EyR<br>GPC-IMSS-501-11-EyR<br>GPC-IMSS-534-11-EyR<br>GPC-IMSS-555-12-EyR<br>GPC-IMSS-573-12-EyR<br>GPC-IMSS-575-12-EyR<br>GPC-IMSS-576-12-EyR<br>GPC-IMSS-577-12-EyR<br>GPC-IMSS-578-12-EyR<br>GPC-IMSS-584-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

114

## REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **93.21** Tracción manual y mecánica<br>**93.22** Marcha y entrenamiento de la marcha<br>**93.23** Adaptación de dispositivo ortésico<br>**93.24** Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico<br>**93.25** Extensión forzada de miembro<br>**93.26** Liberación manual de adherencias articulares<br>**93.27** Estiramiento de músculo o tendón<br>**93.28** Estiramiento de fascia<br>**93.29** Otra corrección forzada de extremidad<br>**93.31** Ejercicio asistido en piscina<br>**93.32** Tratamiento en baño de remolino<br>**93.33** Otra hidroterapia<br>**93.34** Diatermia<br>**93.35** Otra terapia térmica<br>**93.38** Fisioterapia combinada sin mención de los componentes | | | | | |

114

## REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **114.1** REHABILITACIÓN DE FRACTURAS |

115

## MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**R52.0** Dolor agudo<br>**R52.1** Dolor crónico intratable<br>**R52.2** Otro dolor crónico<br>**R52.9** Dolor, no especificado<br>**Z51.5** Atención paliativa | 040.000.2097.00 | **BUPRENORFINA PARCHE** | Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches. | GPC-IMSS-440-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-006-SSA3-2011<br>NOM-011-SSA3-2014 | Sin auxiliar |
| | 040.000.2098.00 | **BUPRENORFINA PARCHE** | Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches. | | |
| | 040.000.4026.00 | **BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml. | | |
| | 040.000.2100.00 | **BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2100.01 | **BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.5915.00 | **CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 50 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.5916.00 | **CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 100 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 040.000.4029.00 | **MORFINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato de morfina pentahidratado equivalente a 30 mg de sulfato de morfina. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.4032.00 | **OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxicodona 20 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4033.00 | **OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxicodona 10 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

115

## MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **115.1** MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO |

116

## MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z30.0** Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción<br>**Z30.4** Supervisión del uso de drogas anticonceptivas | 010.000.3505.00 | **DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas. | GPC-SS-202-09-EyR<br>GPC-SS-505-11-EyR<br>GPC-SS-756-15-EyR<br>GPC-SS-756-15-EyR | Sin auxiliar |
| | 010.000.3508.00 | **DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales). | | |
| | 010.000.3510.00 | **ETONOGESTREL IMPLANTE** | El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador. | | |
| | 010.000.2210.00 | **LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas. | | |
| | 010.000.4526.00 | **LEVONORGESTREL GRAGEA** | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas. | | |
| | 010.000.6075.00 | **LEVONORGESTREL IMPLANTE** | Cada implante contiene: Levonorgestrel 75.0 mg. Envase con 2 implantes. | | |
| | 010.000.3504.00 | **LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA** | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas. | | |
| | 010.000.3507.00 | **LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA** | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales). | | |
| | 010.000.3509.00 | **MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg. Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml. | | |
| | 010.000.3511.00 | **NORELGESTROMINA ETINILESTRADIOL PARCHE** | Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches. | | |
| | 010.000.3503.00 | **NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA** | Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml. | | |
| | 010.000.3515.00 | **NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | |
| | 010.000.3506.00 | **NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales). | | |

116

## MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **116.1** MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES |

117

## MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z30.0** Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción<br>**Z30.1** Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)<br>**Z30.5** Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)<br>**69.7X** Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino<br>**97.71** Extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 060.308.0029 | **DISPOSITIVOS** | Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-005-SSA2-1993<br>NOM-005-SSA2-1993 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 060.308.0151 | **DISPOSITIVOS** | Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza. | | |
| | 060.308.0169 | **DISPOSITIVOS** | Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza. | | |
| | 060.308.0193 | **DISPOSITIVOS** | Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza. | | |
| | 010.000.2208.00 | **LEVONORGESTREL POLVO** | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo. | | |

117

# MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **117.1** MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO |

118

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F90.0** Perturbación de la actividad y de la atención<br>**R46.3** Hiperactividad<br><br>**CIE-9-MC**<br>**94.42** Terapia familiar | 010.000.3308.00 | **ATOMOXETINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas. | GPC-SS-158-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Perfil toxicológico<br><br>Perfil tiroideo<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras<br><br>Potenciales evocados auditivos<br><br>Resonancia magnética de cráneo |
| | 010.000.3309.00 | **ATOMOXETINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas. | | |
| | 010.000.3307.00 | **ATOMOXETINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas. | | |
| | 040.000.4470.00 | **METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4470.01 | **METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4471.01 | **METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4472.00 | **METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4472.01 | **METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.5351.00 | **METILFENIDATO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |

118

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **118.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO |

119

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F84.0** Autismo en la niñez<br>**F84.1** Autismo atípico<br>**F84.5** Síndrome de Asperger | 010.000.4490.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-528-12-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Coproparasitoscópicos de 3 muestras<br><br>Examen general de orina<br><br>Niveles séricos de drogas terapéuticas<br><br>Perfil tiroideo<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras<br><br>Resonancia magnética de cráneo<br><br>Resonancia magnética en regiones |
| | 010.000.4491.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4492.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2652.00 | **BIPERIDENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 040.000.2609.00 | **CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. | | |
| | 040.000.2608.00 | **CARBAMAZEPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2613.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral. | | |
| | 010.000.4483.00 | **FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4483.01 | **FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 040.000.3253.00 | **HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg/ml). | | |
| | 040.000.4481.00 | **HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 1 ampolleta con 1 ml. | | |
| | 040.000.4481.01 | **HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 5 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 040.000.3251.00 | **HALOPERIDOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

119

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 040.000.5478.00 | **LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 040.000.3262.00 | **RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml y gotero dosificador. | | |
| | 040.000.3268.00 | **RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada frasco ámpula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ámpula y jeringa prellenada con 2 ml de diluyente. | | |
| | 040.000.3258.00 | **RISPERIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 040.000.4484.00 | **SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2622.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA** | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valpróico. Envase con 40 tabletas. | | |

119

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **119.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER |

120

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F32.0** Episodio depresivo leve<br>**F32.1** Episodio depresivo moderado<br>**F32.2** Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos<br>**F32.3** Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos<br>**F32.8** Otros episodios depresivos<br>**F32.9** Episodio depresivo, no especificado<br>**F33.0** Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente<br>**F33.1** Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente<br>**F33.2** Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos<br>**F33.3** Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos<br>**F33.4** Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión<br>**F33.8** Otros trastornos depresivos recurrentes<br>**F33.9** Trastorno depresivo recurrente, no especificado | 040.000.2499.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-IMSS-161-09-EyR<br>GPC-IMSS-170-09-EyR<br>GPC-ISSSTE-131-08-EyR<br>GPC-SSA-666-14-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Niveles séricos de drogas terapéuticas<br>Perfil tiroideo<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 5 elementos |
| | 040.000.2500.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.3305.00 | **AMITRIPTILINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5487.00 | **CITALOPRAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5487.01 | **CITALOPRAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.4485.00 | **DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA** | Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada. | | |
| | 010.000.4483.00 | **FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4483.01 | **FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 040.000.3302.00 | **IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.5490.00 | **MIRTAZAPINA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE.** | Cada tableta o tableta dispersable contiene: Mirtazapina 30 mg. Envase con 30 tabletas o tabletas dispersables. | | |
| | 010.000.5485.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5485.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas. | | |

120

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.5486.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5494.00 | **QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4484.00 | **SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4488.00 | **VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada. | | |

120

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **120.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN |

121

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F31.0** Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaníaco presente<br>**F31.1** Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente sin síntomas psicóticos<br>**F31.2** Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente con síntomas psicóticos<br>**F31.3** Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado<br>**F31.4** Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos<br>**F31.5** Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos<br>**F31.6** Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente<br>**F31.7** Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión<br>**F31.8** Otros trastornos afectivos bipolares<br>**F31.9** Trastorno afectivo bipolar, no especificado<br>**F34.0** Ciclotimia<br>**F34.1** Distimia<br>**F34.8** Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes<br>**F34.9** Trastorno persistente | 010.000.5487.01 | **CITALOPRAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 28 tabletas. | GPC-IMSS-161-09-EyR<br>GPC-IMSS-170-09-EyR<br>GPC-ISSSTE-131-08-EyR<br>GPC-SSA-666-14-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Perfil toxicológico<br>Perfil tiroideo<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 5 elementos |
| | 040.000.2613.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral. | | |
| | 040.000.2612.00 | **CLONAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.3253.00 | **HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg/ml). | | |
| | 040.000.3251.00 | **HALOPERIDOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5356.00 | **LAMOTRIGINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Lamotrigina 100 mg., caja con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5358.00 | **LAMOTRIGINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Lamotrigina 25 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 040.000.3255.00 | **LITIO TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.5490.00 | **MIRTAZAPINA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE.** | Cada tableta o tableta dispersable contiene: Mirtazapina 30 mg. Envase con 30 tabletas o tabletas dispersables. | | |
| | 010.000.5486.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5494.00 | **QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |

121

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| del humor [afectivo], no especificado<br><br>**F38.8** Otros trastornos del humor [afectivos] especificados<br>**F39X** Trastorno del humor [afectivo], no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br>**94.37** Psicoterapia verbal exploratoria<br>**94.38** Psicoterapia verbal de apoyo | 010.000.2623.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | | |
| | 010.000.2622.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA** | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valpróico. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 010.000.5359.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2630.00 | **VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valpróico. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |

121

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **121.2** MANEJO EN URGENCIAS DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES) | **121.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES) | | | **121.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES) |

122

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F41.0** Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]<br>**F41.1** Trastorno de ansiedad generalizada<br>**F43.0** Reacción al estrés agudo<br>**F43.1** Trastorno de estrés postraumático<br>**F43.2** Trastornos de adaptación<br>**F43.8** Otras reacciones al estrés grave<br>**F43.9** Reacción al estrés grave, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**94.37** Psicoterapia verbal exploratoria<br>**94.38** Psicoterapia verbal de apoyo | 040.000.2499.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-IMSS-392-10-EyR<br><br>GPC-IMSS-515-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Perfil toxicológico<br><br>Perfil tiroideo<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Electrocardiograma |
| | 040.000.2500.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.3305.00 | **AMITRIPTILINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2613.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral. | | |
| | 040.000.2612.00 | **CLONAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4485.00 | **DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA** | Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada. | | |
| | 010.000.4483.00 | **FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4483.01 | **FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 040.000.3302.00 | **IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 040.000.5478.00 | **LORAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 010.000.5490.00 | **MIRTAZAPINA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE.** | Cada tableta o tableta dispersable contiene: Mirtazapina 30 mg. Envase con 30 tabletas o tabletas dispersables. | | |
| | 010.000.5481.00 | **PAROXETINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

122

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])**

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.5494.00 | **QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |
| | 040.000.4484.00 | **SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4488.00 | **VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada. | | |

122

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **122.2** MANEJO EN URGENCIAS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO]) | **122.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO]) | | | **122.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO]) |

123

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F05.0** Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, así descrito<br>**F05.1** Delirio superpuesto a un cuadro de demencia<br>**F05.8** Otros delirios<br>**F05.9** Delirio, no especificado<br>**F20.0** Esquizofrenia paranoide<br>**F20.1** Esquizofrenia hebefrénica<br>**F20.2** Esquizofrenia catatónica<br>**F20.3** Esquizofrenia indiferenciada<br>**F20.4** Depresión postesquizofrénica<br>**F20.5** Esquizofrenia residual<br>**F20.6** Esquizofrenia simple<br>**F20.8** Otras esquizofrenias<br>**F20.9** Esquizofrenia, no especificada<br>**F21X** Trastorno esquizotípico<br>**F29X** Psicosis de origen no orgánico, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**94.37** Psicoterapia verbal exploratoria<br>**94.38** Psicoterapia verbal de apoyo | 010.000.4490.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-465-11-EyR<br>GPC-SSA-222-09-EyR<br>GPC-SSA-299-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Examen general de orina<br>Perfil toxicológico<br>Perfil de lípidos<br>Perfil tiroideo<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras<br>Tomografía axial computarizada de cráneo |
| | 010.000.4491.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4492.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2653.00 | **BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 040.000.2652.00 | **BIPERIDENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 040.000.2612.00 | **CLONAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.3259.00 | **CLOZAPINA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 040.000.3259.01 | **CLOZAPINA COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos. | | |
| | 040.000.3253.00 | **HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg/ml). | | |
| | 040.000.3251.00 | **HALOPERIDOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.5476.00 | **LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 040.000.3204.00 | **LEVOMEPROMAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5485.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas. | | |

123

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.5485.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 040.000.3247.00 | **PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5489.00 | **QUETIAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg de quetiapina. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 040.000.3258.00 | **RISPERIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 040.000.3241.00 | **TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 040.000.3241.01 | **TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 30 grageas o tabletas. | | |

123

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **123.2** MANEJO EN URGENCIAS DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO) | **123.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO) | | | **123.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO) |

124

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N94.4** Dismenorrea primaria | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-183-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Perfil hormonal<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

124

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **124.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA |

125

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N95.1** Estados menopáusicos y climatéricos femeninos.<br>**N95.3** Estados asociados con menopausia artificial | 010.000.1006.00 | **CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE** | Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | GPC-IMSS-568-12-EyR<br>GPC-SS-019-08-EyR<br>GPC-SS-741-15-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Perfil de lípidos<br>Perfil hormonal<br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1506.00 | **ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL** | Cada 100 g contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg. Envase con 43 g y aplicador. | | |
| | 010.000.1489.00 | **ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1508.00 | **ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA** | Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas. | | |
| | 010.000.3045.00 | **MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml. | | |
| | 010.000.3044.00 | **MEDROXIPROGESTERONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

125

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **125.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA |

126

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**D24X** Tumor benigno de la mama<br>**N60.0** Quiste solitario de la mama<br>**N60.1** Mastopatía quística difusa<br>**N60.2** Fibroadenosis de mama<br>**N60.3** Fibroesclerosis de mama<br>**N60.4** Ectasia de conducto mamario<br>**N60.8** Otras displasias mamarias benignas<br>**N60.9** Displasia mamaria benigna, sin otra especificación<br>**N61X** Trastornos inflamatorios de la mama<br>**N62X** Hipertrofia de la mama<br>**N63X** Masa no especificada en la mama<br>**N64.0** Fisura y fístula del pezón<br>**N64.1** Necrosis grasa de la mama<br>**N64.2** Atrofia de la mama<br>**N64.3** Galactorrea no asociada con el parto<br>**N64.4** Mastodinia<br>**N64.5** Otros signos y síntomas relativos a la mama<br>**N64.8** Otros trastornos especificados de la mama<br>**N64.9** Trastorno de la mama, no especificado | 010.000.1096.00 | **BROMOCRIPTINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas. | GPC-IMSS-240-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Mastografía Bilateral<br><br>Ultrasonido mamario bilateral<br><br>Biopsia de mama y ganglios en región mamaria<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1093.00 | **DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

126

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **126.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA | | **126.2** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA | **126.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA |

127

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N85.0** Hiperplasia de glándula del endometrio<br>**N85.1** Hiperplasia adenomatosa del endometrio | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-568-12-EyR<br>GPC-SS-223-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biopsia y estudio histopatológico<br>Perfil hormonal<br>Ultrasonido abdomino - pélvico<br>Ultrasonido transvaginal |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3044.00 | **MEDROXIPROGESTERONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

127

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **127.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL |

128

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N76.1** Vaginitis subaguda y crónica | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | GPC-IMSS-081-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-609-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal<br><br>Citología exfoliativa (Papanicolaou) |
| | 010.000.1561.00 | **METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1566.00 | **NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas. | | |
| | 010.000.1981.00 | **TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas. | | |

128

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **128.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA |

129

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**B37.3** Candidiasis de la vulva y de la vagina<br>**N76.0** Vaginitis aguda<br>**N76.2** Vulvitis aguda<br>**O23.5** Infección genital en el embarazo | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-081-08-EyR<br>GPC-IMSS-609-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1561.00 | **METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas. | | |
| | 010.000.1566.00 | **NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas. | | |

129

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **129.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS |

130

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N80.0** Endometriosis del útero<br>**N80.1** Endometriosis del ovario<br>**N80.2** Endometriosis de la trompa de Falopio<br>**N80.3** Endometriosis del peritoneo pélvico<br>**N80.4** Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina<br>**N80.5** Endometriosis del intestino<br>**N80.6** Endometriosis en cicatriz cutánea<br>**N80.8** Otras endometriosis<br>**N80.9** Endometriosis, no especificada | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SS-207-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido abdomino - pélvico<br><br>Ultrasonido transvaginal |
| | 010.000.1093.00 | **DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.3508.00 | **DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales). | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.6001.00 | **DIENOGEST TABLETA** | Cada tableta contiene: Dienogest 2 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.2208.00 | **LEVONORGESTREL POLVO** | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo. | | |
| | 010.000.3507.00 | **LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA** | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales). | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3515.00 | **NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | |
| | 010.000.3506.00 | **NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales). | | |

130

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **130.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS |

131

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N34.0** Absceso uretral<br>**N34.1** Uretritis no específica<br>**N34.2** Otras uretritis<br>**N34.3** Síndrome uretral, no especificado | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | GPC-IMSS-077-08-EyR<br>GPC-IMSS-078-08-EyR<br>GPC-SS-027-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-039-SSA2-2002 | Examen general de orina<br>Urocultivo |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1911.00 | **NITROFURANTOÍNA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas. | | |
| | 010.000.5302.00 | **NITROFURANTOÍNA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Nitrofurantoína 500 mg. Envase con 120 ml (25 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

131

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **131.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL |

132

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N87.0** Displasia cervical leve<br>**N87.1** Displasia cervical moderada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**67.11** Biopsia endocervical<br>**67.12** Otra biopsia cervical<br>**67.19** Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino<br>**67.2X** Conización<br>**67.32** Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización<br>**67.33** Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía<br>**67.39** Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | GPC-IMSS-333-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-014-SSA2-1994<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Citología exfoliativa (Papanicolaou)<br><br>Colposcopía<br><br>Conización cervical |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1561.00 | **METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1562.00 | **NITROFURAL ÓVULO** | Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. Envase con 6 óvulos. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

132

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **132.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO |

133

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**N87.2** Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte<br><br>**CIE-9-MC**<br>**67.11** Biopsia endocervical<br>**67.12** Otra biopsia cervical<br>**67.19** Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino<br>**67.2X** Conización<br>**67.32** Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización<br>**67.33** Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía<br>**67.39** Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-014-SSA2-1994<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Citología exfoliativa (Papanicolaou)<br><br>Colposcopía<br><br>Conización cervical |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1561.00 | **METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL** | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1562.00 | **NITROFURAL ÓVULO** | Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. Envase con 6 óvulos. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

133

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **133.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO |

134

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**I10X** Hipertensión esencial (primaria)<br>**I15.0** Hipertensión renovascular<br>**I15.1** Hipertensión secundaria a otros trastornos renales<br>**I15.2** Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos<br>**I15.8** Otros tipos de hipertensión secundaria<br>**I15.9** Hipertensión secundaria, no especificada | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-IMSS-076-08-EyR<br>GPC-IMSS-238-09-EyR<br>GPC-IMSS-333-09-EyR<br>GPC-IMSS-739-15-EyR<br>GPC-SS-155-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-030-SSA2-2009 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Microalbuminuria<br>Perfil de lípidos<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Electrocardiograma<br>Telerradiografía de tórax |
| | 010.000.2111.01 | **AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.2530.00 | **CANDESARTÁN CILEXETILO HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.0574.00 | **CAPTOPRIL TABLETA** | Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0561.00 | **CLORTALIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2501.00 | **ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg o lisinopril 10 mg o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.5104.00 | **ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 mg/ ml). | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2307.00 | **FUROSEMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2301.00 | **HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4095.00 | **IRBESARTÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.4096.00 | **IRBESARTÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.0593.00 | **ISOSORBIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0592.00 | **ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales. | | |

134

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2520.00 | **LOSARTÁN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO** | Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.0569.00 | **NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | | |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0539.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2542.00 | **TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas ó cápsulas. | | |
| | 010.000.2540.00 | **TELMISARTÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4111.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE** | Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches. | | |
| | 010.000.0596.00 | **VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA** | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas. | | |
| | 010.000.0598.00 | **VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml). | | |

134

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **134.2** ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA | **134.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL | **134.4** CUIDADOS INTENSIVOS POR CRISIS HIPERTENSIVA | | **134.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL |

135

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**I50.0** Insuficiencia cardíaca congestiva<br>**I50.1** Insuficiencia ventricular izquierda<br>**I50.9** Insuficiencia cardíaca, no especificada<br>**J81X** Edema pulmonar | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-ISSSTE-722-15-EyR<br>GPC-S-186-15-EyR<br>GPC-SSA-219-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Alanina amino transferasa (ALT o TGP)<br>Aspartato aminotransferasa (AST o TGO)<br>Biometría hemática completa<br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br>Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)<br>Deshidrogenasa láctica (DHL)<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Tiempos y pruebas de coagulación |
| | 010.000.0574.00 | **CAPTOPRIL TABLETA** | Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4246.00 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.4246.01 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.0561.00 | **CLORTALIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5551.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.0503.00 | **DIGOXINA ELÍXIR** | Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0504.00 | **DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0502.00 | **DIGOXINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 010.000.2156.00 | **ESPIRONOLACTONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

135

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2304.00 | **ESPIRONOLACTONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | Ecocardiograma a color<br><br>Electrocardiograma<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Perfil de lípidos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 010.000.2304.01 | **ESPIRONOLACTONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2307.00 | **FUROSEMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0592.00 | **ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales. | | |
| | 010.000.0569.00 | **NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | | |
| | 010.000.2542.00 | **TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas ó cápsulas. | | |
| | 010.000.0591.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE** | Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables. | | |

135

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **135.2** ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA AGUDO PULMONAR | **135.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA AGUDO PULMONAR | **135.4** CUIDADOS INTENSIVOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA AGUDO PULMONAR | | **135.1** DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR |

136

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**G40.0** Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado<br>**G40.1** Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples<br>**G40.2** Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos<br>**G40.3** Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados<br>**G40.4** Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados<br>**G40.5** Síndromes epilépticos especiales<br>**G40.6** Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)<br>**G40.7** Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)<br>**G40.8** Otras epilepsias<br>**G40.9** Epilepsia, tipo no especificado<br>**G41.0** Estado de gran mal epiléptico | 010.000.2620.00 | **ÁCIDO VALPRÓICO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ácido valpróico 250 mg. Envase con 60 cápsulas. | GPC-IMSS-244-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Niveles séricos de drogas terapéuticas<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras<br><br>Resonancia magnética de cráneo<br><br>Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo |
| | 040.000.2609.00 | **CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. | | |
| | 040.000.2608.00 | **CARBAMAZEPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2614.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.3215.00 | **DIAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2624.00 | **FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.2611.00 | **FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml. | | |
| | 010.000.2610.00 | **FENITOÍNA TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 010.000.0525.00 | **FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas. | | |
| | 040.000.2619.00 | **FENOBARBITAL ELÍXIR** | Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml y vasito dosificador de 5 ml. | | |
| | 040.000.2601.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4359.00 | **GABAPENTINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |

136

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **G41.1** Estado de pequeño mal epiléptico<br>**G41.2** Estado de mal epiléptico parcial complejo<br>**G41.8** Otros estados epilépticos<br>**G41.9** Estado de mal epiléptico de tipo no especificado<br>**R56.0** Convulsiones febriles<br>**R56.8** Otras convulsiones y las no especificadas | 010.000.5664.00 | **LACOSAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ámpula con 20 ml. (10 mg/ml). | | |
| | 010.000.5660.00 | **LACOSAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5661.00 | **LACOSAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5662.00 | **LACOSAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5363.00 | **TOPIRAMATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5365.00 | **TOPIRAMATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.2623.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | | |
| | 010.000.2622.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA** | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valpróico. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 010.000.5359.00 | **VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2630.00 | **VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valpróico. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | | |

136

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **136.2** MANEJO EN URGENCIAS DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL | **136.3** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL | | | **136.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS |

137

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**G20X** Enfermedad de Parkinson | 040.000.2652.00 | **BIPERIDENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas. | GPC-SSA-153-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo |
| | 010.000.1096.00 | **BROMOCRIPTINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 040.000.2654.00 | **LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas. | | |
| | 040.000.2657.00 | **LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 50 tabletas. | | |
| | 040.000.2657.01 | **LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 100 tabletas. | | |
| | 010.000.2641.01 | **ROTIGOTINA PARCHE** | Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/20 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 4 mg/24 h. | | |
| | 010.000.2642.00 | **ROTIGOTINA PARCHE** | Cada parche contiene: Rotigotina 13.5 mg/30 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 6 mg/24 h. | | |
| | 010.000.2643.00 | **ROTIGOTINA PARCHE** | Cada parche contiene: Rotigotina 18 mg/40 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 8 mg/24 h. | | |
| | 040.000.2651.00 | **TRIHEXIFENIDILO TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas. | | |

137

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **137.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON |

138

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**G51.0** Parálisis de Bell<br>**93.13** Ejercicios resistidos<br>**93.17** Otro ejercicio pasivo musculoesquelético | 010.000.2126.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas. | GPC-IMSS-066-08-EyR<br>GPC-ISSSTE-249-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.4263.00 | **ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas. | | |
| | 010.000.2714.00 | **COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA** | Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0473.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

138

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **138.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL |

139

## TERAPIA DE LENGUAJE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z50.5** Terapia del lenguaje<br><br>**CIE-9-MC**<br>**93.74** Adiestramiento para corregir defectos del habla | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-015 SSA3-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999 | Sin auxiliar |

139

TERAPIA DE LENGUAJE

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **139.1** TERAPIA DE LENGUAJE |

140

## NEUROHABILITACIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**R62.0** Retardo del desarrollo<br>**R62.8** Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado<br>**R62.9** Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación<br><br>**CIE-9-MC**<br>**93.81** Terapia recreativa<br>**93.82** Terapia educativa | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | NOM-031-SSA2-1999<br><br>NOM-015 SSA3-2012<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin Auxiliar |

140

**NEUROHABILITACIÓN**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **140.1** NEUROHABILITACIÓN |

141

## APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**00.F8** Control de placa dentobacteriana<br>**CIE-9-MC**<br>**89.31** Examen dental<br>**96.54** Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 060.066.0500 | **FLUORURO DE SODIO** | Para prevención de caries, acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-015 SSA3-2012<br>NOM-031-SSA2-1999 | Sin auxiliar |

141

## APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **141.1** APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES |

142

## RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K02.0** Caries limitada al esmalte<br>**K02.1** Caries de la dentina<br>**K02.2** Caries del cemento<br>**K02.3** Caries dentaria detenida<br>**K02.4** Odontoclasia<br>**K02.5** Caries con exposición pulpar<br>**K02.8** Otras caries dentales<br>**K02.9** Caries dental, no especificada<br>**S02.5** Fractura de los dientes<br>**Z01.2** Examen odontológico<br>**CIE-9-MC**<br>**00.F8** Control de placa dentobacteriana<br>**23.2X** Restauración de diente mediante obturaciones<br>89.31 Examen dental | 010.000.0260.02 | **LIDOCAÍNA GEL** | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml. | GPC-SS-024-08-EyR<br>GPC-SS-519-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-013-SSA2-2006 | Radiografía Periapical |
| | 010.000.0267.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml. | | |

142

# RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **142.1** RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES |

143

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K04.7** Absceso periapical sin fístula<br>**K05.0** Gingivitis aguda<br>**K05.2** Periodontitis aguda<br><br>**CIE-9-MC**<br>**24.31** Excisión de lesión o de tejido de encía<br>**24.4X** Excisión de lesión maxilar de origen dentario | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | GPC-ISSSTE-517-11-EyR<br>GPC-SS-504-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-013-SSA2-2006<br>NOM-015-SSA2-2010<br>NOM-017-SSA2-2012 | Ortopantografía<br>Radiografía Periapical |
| | 010.000.2230.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1941.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |

143

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0260.02 | **LIDOCAÍNA GEL** | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml. | | |
| | 010.000.0267.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

143

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **143.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL |

144

## EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K04.1** Necrosis de la pulpa<br>**K05.3** Periodontitis crónica<br>**K08.1** Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local<br>**K08.3** Raíz dental retenida<br>**S02.5** Fractura de los dientes<br>**CIE-9-MC**<br>**23.01** Extracción de diente caduco<br>**23.09** Extracción de otro diente<br>**23.11** Extracción de raíz residual | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-ISSSTE-517-11-EyR<br>GPC-SS-504-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-013-SSA2-2006 | Radiografía Periapical |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0260.02 | **LIDOCAÍNA GEL** | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml. | | |
| | 010.000.0267.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

144

## EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | | | | | |

144

# EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **144.1** EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES |

145

## TERAPIA PULPAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K04.0** Pulpitis<br>**K04.2** Degeneración de la pulpa<br>**K04.3** Formación anormal de tejido duro en la pulpa<br>**K04.4** Periodontitis apical aguda originada en la pulpa<br>**K04.5** Periodontitis apical crónica<br>**K04.6** Absceso periapical con fístula<br>**K04.8** Quiste radicular<br>**K04.9** Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical<br>**CIE-9-MC**<br>**00.G1** Drenaje de absceso dentario<br>**23.71** Tratamiento de conducto radicular con irrigación | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | GPC-IMSS-692-13-EyR<br>GPC-ISSSTE-517-11-EyR<br>GPC-SS-504-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-013-SSA2-2006 | Radiografía Periapical |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0260.02 | **LIDOCAÍNA GEL** | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml. | | |
| | 010.000.0267.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |

145

## TERAPIA PULPAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

145

**TERAPIA PULPAR**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **145.1** TERAPIA PULPAR |

146

## EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K01.0** Dientes incluidos<br>**K01.1** Dientes impactados<br><br>**CIE-9-MC**<br>**23.11** Extracción de raíz residual<br>**23.19** Otra extracción quirúrgica de diente | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | GPC-ISSSTE-517-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-013-SSA2-2006 | Ortopantografía |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0260.02 | **LIDOCAÍNA GEL** | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml. | | |
| | 010.000.0267.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |

146

## EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

146

**EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR**

# COBERTURA

## MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **146.1** EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR |

147

## ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>R00.2 Palpitaciones<br>R04.0 Epistaxis<br>R05X Tos<br>R06.0 Disnea<br>R06.4 Hiperventilación<br>R07.0 Dolor de garganta<br>R07.1 Dolor en el pecho al respirar<br>R07.2 Dolor precordial<br>R07.3 Otros dolores en el pecho<br>R07.4 Dolor en el pecho, no especificado<br>R10.0 Abdomen agudo<br>R10.1 Dolor abdominal localizado en parte superior<br>R10.2 Dolor pélvico y perineal<br>R10.3 Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen<br>R10.4 Otros dolores abdominales y los no especificados<br>R11X Náusea y vómito<br>R12X Acidez<br>R14X Flatulencia y afecciones afines<br>R20.0 Anestesia de la piel<br>R20.1 Hipoestesia de la piel<br>R20.2 Parestesia de la piel<br>R20.3 Hiperestesia<br>R20.8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas<br>R23.0 Cianosis<br>R23.1 Palidez<br>R23.2 Rubor<br>R23.3 Equimosis espontánea<br>R23.4 Cambios en la textura de | 010.000.0101.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | | |
| | 010.000.1224.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1223.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE** | Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables. | | |
| | 010.000.1263.00 | **BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5505.00 | **CELECOXIB CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.5451.00 | **CINARIZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |

147

## ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| la piel<br>R23.8 Otros cambios de la piel y los no especificados<br>R25.0 Movimientos anormales de la cabeza<br>R25.1 Temblor no especificado<br>R25.2 Calambres y espasmos<br>R25.3 Fasciculación<br>R25.8 Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados<br>R26.0 Marcha atáxica<br>R26.1 Marcha paralítica<br>R26.2 Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte<br>R26.3 Inmovilidad<br>R26.8 Otras anormalidades de la marcha y de la movilidad y las no especificadas<br>R30.0 Disuria<br>R30.1 Tenesmo vesical<br>R30.9 Micción dolorosa, no especificada<br>R42X Mareo y desvanecimiento<br>R45.0 Nerviosismo<br>R45.1 Inquietud y agitación<br>R45.2 Infelicidad<br>R45.3 Desmoralización y apatía<br>R45.4 Irritabilidad y enojo<br>R45.5 Hostilidad<br>R45.6 Violencia física<br>R45.7 Tensión y estado de choque emocional, no especificado<br>R45.8 Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional<br>R49.0 Disfonía<br>R49.1 Afonía | 010.000.3112.00 | **DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Envase con 2 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3111.00 | **DIFENIDOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2196.00 | **DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.3413.00 | **INDOMETACINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.3412.00 | **INDOMETACINA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios. | | |
| | 010.000.3412.01 | **INDOMETACINA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1243.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

**147**

## ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| R49.2 Hipernasalidad e hiponasalidad<br>R49.8 Otras alteraciones de la voz y las no especificadas<br>R50.9 Fiebre, no especificada<br>R51X Cefalea<br>R52.0 Dolor agudo<br>R52.1 Dolor crónico intratable<br>R52.2 Otro dolor crónico<br>R52.9 Dolor, no especificado<br>R53X Malestar y fatiga<br>R55X Síncope y colapso<br>R59.0 Adenomegalia localizada<br>R59.1 Adenomegalia generalizada<br>R59.9 Adenomegalia, no especificada<br>R60.9 Edema, no especificado<br>R62.0 Retardo del desarrollo<br>R62.8 Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado<br>R62.9 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación<br>R68.1 Síntomas no específicos propios de la infancia<br>Z43.0 Atención de traqueostomía<br>Z43.1 Atención de gastrostomía<br>Z43.2 Atención de ileostomía<br>Z43.3 Atención de colostomía<br>Z43.4 Atención de otros orificios artificiales de las vías digestivas<br>Z43.5 Atención de cistostomía<br>Z43.6 Atención de otros orificios artificiales de las vías urinarias | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.2151.00 | **RANITIDINA JARABE** | Cada 10 ml contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

**147**

## ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| Z43.7 Atención de vagina artificial<br>Z43.8 Atención de otros orificios artificiales<br>Z43.9 Atención de orificio artificial no especificado<br>Z46.7 Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico<br>Z47.0 Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna en fractura<br>Z47.8 Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia<br>Z47.9 Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado<br>Z48.0 Atención de los apósitos y suturas<br>Z48.8 Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía<br>Z48.9 Cuidado posterior a la cirugía, no especificado | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

147

# ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

## COBERTURA

### MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **147.1** ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD |

148

## ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Z51.8 Otras atenciones médicas especificadas | 010.000.2303.00 | **ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Calcio sérico<br><br>Creatinina en sangre<br><br>Cloro sérico (Cl)<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Fosfatasa alcalina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Hormona estimulante de la tiroides (TSH)<br><br>Magnesio sérico<br><br>Perfil tiroideo<br><br>Potasio sérico<br><br>Pruebas de función renal<br><br>Pruebas de función hepática |
| | 010.000.5099.00 | **ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.0426.00 | **AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.4107.00 | **AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml. | | |
| | 010.000.0204.00 | **ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 040.000.2653.00 | **BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1006.00 | **CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE** | Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | | |
| | 010.000.2242.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |
| | 040.000.2613.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral. | | |
| | 010.000.2142.00 | **CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml. | | |

148

## ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | Proteínas totales (albúmina y globulina)<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Sodio sérico<br><br>Tiroxina (T4 Total)<br><br>Tiroxina (T4 Libre)<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Resonancia magnética en regiones<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.0464.00 | **CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.0406.00 | **DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 010.000.0504.00 | **DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.2624.00 | **FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | | |
| | 040.000.4054.00 | **FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml). | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0474.00 | **HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | | |

148

## ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1051.00 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0522.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml. | | |
| | 010.000.0265.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 040.000.0302.00 | **LORAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0476.00 | **METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. De diluyente. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2155.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml. | | |
| | 010.000.0291.00 | **NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.0569.00 | **NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | | |

148

## ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0432.00 | **TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas. | | |
| | 010.000.0433.00 | **TERBUTALINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4114.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 010.000.0598.00 | **VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml). | | |


148

**ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS**

# COBERTURA

## URGENCIAS

URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD



**148.1**

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

149

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E16.1** Otras hipoglicemias<br>**E16.2** Hipoglicemia, no especificada<br>**T38.3** Envenenamiento por insulina y drogas hipoglucemiantes orales [antidiabéticas]<br>**Y42.3** Efectos adversos de drogas hipoglucemiantes orales e insulina [antidiabéticas] | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | GPC-SS-093-08-EyR<br><br>GPC-SSA-302-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Glucosa capilar<br><br>Química sanguínea de 12 elementos<br><br>Electrocardiograma |

149

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **149.1** ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES | **149.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES | | | |

150

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E10.1** Diabetes mellitus tipo 1, con cetoacidosis<br>**E11.1** Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis<br>**E12.1** Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con cetoacidosis<br>**E13.1** Otras diabetes mellitus especificadas, con cetoacidosis<br>**E14.1** Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis<br>**E12.1** Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con cetoacidosis<br>**E13.1** Otras diabetes mellitus especificadas, con cetoacidosis<br>**E14.1** Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | GPC-IMSS-718-14-EyR<br>GPC-SS-227-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-015-SSA2-2010<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Glucosa capilar<br>Química sanguínea de 12 elementos<br>Electrocardiograma |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 010.000.3617.00 | **FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq) (Fosfato 20 mEq). Envase con 50 ampolletas con 10 ml | | |
| | 010.000.6117.00 | **INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4156.00 | **INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina aspártica (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4165.00 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4165.01 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4158.00 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4158.01 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo desechable | | |
| | 010.000.1051.00 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1051.01 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana | | |

150

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | | | humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10ml. | | |
| | 010.000.1050.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1050.01 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4162.00 | **INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4148.00 | **INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml. | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |

150

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **150.1** MANEJO EN URGENCIAS DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA | **150.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA | **150.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA | | |

151

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**E87.0** Hiperosmolaridad e hipernatremia<br>**E10.0** Diabetes mellitus tipo 1, con coma<br>**E11.0** Diabetes mellitus tipo 2, con coma<br>**E12.0** Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con coma<br>**E13.0** Otras diabetes mellitus especificadas, con coma<br>**E14.0** Diabetes mellitus no especificada, con coma<br>**R73.9** Hiperglicemia, no especificadaa | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | GPC-SS-160-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-015-SSA2-2010 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Glucosa capilar<br>Química sanguínea de 12 elementos<br>Electrocardiograma<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 010.000.6117.00 | **INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4156.00 | **INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina aspártica (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4165.00 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4165.01 | **INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml (100 U/ml). | | |
| | 010.000.4158.00 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4158.01 | **INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo desechable | | |
| | 010.000.1051.00 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1051.01 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10ml. | | |
| | 010.000.1050.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc | | |

151

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | | | isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1050.01 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4162.00 | **INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.4148.00 | **INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml. | | |

151

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **151.1** MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO | **151.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO | **151.3** CUIDADOS INTENSIVOS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO | | |

152

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**I20.0** Angina inestable<br>**I20.1** Angina de pecho con espasmo documentado<br>**I20.8** Otras formas especificadas de angina de pecho<br>**I20.9** Angina de pecho, no especificada | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-IMSS-191-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-030-SSA2-2009 | Biometría hemática completa<br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br>Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Electrocardiograma<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 040.000.4026.00 | **BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml. | | |
| | 010.000.4246.00 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.4246.01 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.5104.00 | **ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 mg/ ml). | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0622.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0592.00 | **ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0591.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE** | Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables. | | |
| | 010.000.4111.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE** | Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches. | | |

152

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4114.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 010.000.0598.00 | **VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml). | | |

152

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **152.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ANGINA DE PECHO | **152.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ANGINA DE PECHO | **152.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE ANGINA DE PECHO | | |

153

## DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**I24.9** Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**00.G7** Interpretación de electrocardiograma<br>**89.50** Monitorización cardiaca ambulatoria<br>**89.51** Electrocardiograma de ritmo<br>**89.52** Electrocardiograma<br>**89.53** Vectocardiograma (con ECG)<br>**89.54** Monitorización electrográfica<br>**89.55** Fonocardiograma con derivación de ECG<br>**89.56** Carotidograma con derivación de ECG<br>**89.57** Apexcardiograma (con electrodo ECG)<br>**89.58** Pletismograma<br>**89.59** Otras mediciones cardiacas y vasculares no operatorias | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | GPC-IMSS-191-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Creatinfosfoquinasa (CPK)<br><br>Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Electrocardiograma |

153

## DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **153.1** DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO | | | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**I44.0** Bloqueo auriculoventricular de primer grado<br>**I44.1** Bloqueo auriculoventricular de segundo grado<br>**I44.2** Bloqueo auriculoventricular completo<br>**I44.3** Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados<br>**I44.4** Bloqueo fascicular anterior izquierdo<br>**I44.5** Bloqueo fascicular posterior izquierdo<br>**I44.6** Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados<br>**I44.7** Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación<br>**I45.0** Bloqueo fascicular derecho<br>**I45.1** Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados<br>**I45.2** Bloqueo bifascicular<br>**I45.3** Bloqueo trifascicular<br>**I45.4** Bloqueo intraventricular no especificado<br>**I45.5** Otros tipos especificados de bloqueo del corazón<br>**I45.6** Síndrome de preexcitación<br>**I45.8** Otros trastornos especificados de la conducción | 010.000.0624.01 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-IMSS-352-09-EyR<br>GPC-IMSS-535-12-EyR<br>GPC-SS-014-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br>Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)<br>Prueba de esfuerzo<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Tiempo de coagulación, INR<br>Tiempos y pruebas de coagulación<br>Ecocardiograma a color<br>Electrocardiograma<br>Holter<br>Telerradiografía de tórax |
| | 010.000.0624.00 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | | |
| | 010.000.5099.00 | **ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.4107.00 | **AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml. | | |
| | 010.000.4110.00 | **AMIODARONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2111.01 | **AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5731.00 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5731.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5732.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.0204.00 | **ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.4246.00 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.4246.01 | **CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.5935.00 | **DABIGATRÁN CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 150 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **I45.9** Trastorno de la conducción, no especificado<br>**I47.0** Arritmia por reentrada ventricular<br>**I47.1** Taquicardia supraventricular<br>**I47.2** Taquicardia ventricular<br>**I47.9** Taquicardia paroxística, no especificada<br>**I48X** Fibrilación y aleteo auricular<br>**I48.1** Fibrilación auricular persistente<br>**I48.2** Fibrilación auricular crónica<br>**I48.3** Aleteo auricular típico<br>**I48.4** Aleteo auricular atípico<br>**I48.9** Fibrilación y aleteo auricular, no especificado<br>**I49.0** Fibrilación y aleteo ventricular<br>**I49.1** Despolarización auricular prematura<br>**I49.2** Despolarización prematura nodal<br>**I49.3** Despolarización ventricular prematura<br>**I49.4** Otros tipos de despolarización prematura y los no especificados<br>**I49.5** Síndrome del seno enfermo<br>**I49.8** Otras arritmias cardíacas especificadas<br>**I49.9** Arritmia cardíaca, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**00.50** Implantación de marcapasos de resincronización cardiaca sin mención de desfibrilación, | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.0503.00 | **DIGOXINA ELÍXIR** | Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0504.00 | **DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0502.00 | **DIGOXINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.5104.00 | **ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 mg/ ml). | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0622.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| sistema total [IMRC] [CRT-P]<br>**00.53** Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [IMRC] [CRT-P]<br>**00.54** Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [DRC] [CRT-D]<br>**37.78** Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal<br>**37.80** Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato<br>**37.81** Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado como respuesta en frecuencia<br>**37.82** Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia<br>**37.83** Inserción inicial de dispositivo de doble cámara<br>**37.85** Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia<br>**37.86** Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia<br>**37.87** Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de cámara doble | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0593.00 | **ISOSORBIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0592.00 | **ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0522.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml. | | |
| | 010.000.0262.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.0265.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 060.604.0418 | **MARCAPASO BICAMERAL C/A DE FRECUENCIA** | Marcapaso Cardiaco; tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de sensado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en "J". | | |
| | 060.604.0442 | **MARCAPASO BIPOLAR** | Marcapaso cardiaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **37.89** Revisión o extracción de marcapasos cardiaco | | | o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. | | |
| | 060.604.0434 | **MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE** | Marcapaso cardiaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables: 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación: VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Histéresis unicameral. | | |
| | 060.604.0475 | **MARCAPASO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO** | Marcapaso cardiaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación. | | |
| | 060.604.0483 | **MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA** | Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 gr y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | | | Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Pell Off". | | |
| | 060.604.0491 | **MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA** | Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". | | |
| | 531.609.0041 | **MARCAPASO EXTERNO** | Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. | | |
| | 060.604.0145 | **MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 32 MM** | Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar ; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. | | |
| | 060.604.0160 | **MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA** | Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodos en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. | | |
| | 060.604.0467 | **MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V)** | Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad: más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. | | |
| | 060.604.0459 | **MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA** | Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de batería: 3.0 volts | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | | | o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: autoactualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. | | |
| | 060.604.0087 | **MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR** | Cardiaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería: 2.8 V. | | |
| | 060.604.0426 | **MARCAPASO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA** | Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en "J" para la aurícula. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4222.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4223.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml. | | |
| | 010.000.2155.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml. | | |
| | 010.000.4221.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0539.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5735.01 | **RIVAROXABAN COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 15 mg. Envase con 28 comprimidos. | | |
| | 010.000.5736.01 | **RIVAROXABAN COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 20 mg. Envase con 28 comprimidos. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0591.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE** | Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables. | | |
| | 010.000.4111.00 | **TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE** | Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches. | | |
| | 010.000.0596.00 | **VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA** | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas. | | |

154

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0598.00 | **VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml). | | |
| | 010.000.0623.00 | **WARFARINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas. | | |

154

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **154.1** ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DE ARRITMIAS CARDIACAS | **154.2** TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ARRITMIAS CARDIACAS | **154.5** CUIDADOS INTENSIVOS DE ARRITMIAS CARDIACAS | **154.3** MANEJO INVASIVO DE ARRITMIAS CARDIACAS | **154.4** TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ARRITMIAS CARDIACAS |

**INCLUYE VALORACIÓN PRE-QUIRÚRGICA**

155

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**R10.0** Abdomen agudo | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-509-11 EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdominal completo |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |

155

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

155

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

155

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **155.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL ABDOMEN AGUDO NO QUIRÚRGICO | **155.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ABDOMEN AGUDO | **155.4** CUIDADOS INTENSIVOS DEL ABDOMEN AGUDO | **155.2** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABDOMEN AGUDO | |

**INCLUYE VALORACIÓN PRE-QUIRÚRGICA**

156

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**K35.0** Apendicitis aguda con peritonitis generalizada<br>**K35.1** Apendicitis aguda con absceso peritoneal<br>**K35.2** Apendicitis aguda con peritonitis generalizada<br>**K35.3** Apendicitis aguda con peritonitis localizada<br>**K35.8** Otras apendicitis agudas, y las no especificadas<br>**K35.9** Apendicitis aguda, no especificada<br>**K37X** Apendicitis, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>**47.01** Apendicectomía laparoscópica<br>**47.09** Otra apendicectomía<br>**47.11** Apendicectomía incidental laparoscópica<br>**47.19** Otra apendicectomía incidental | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-049-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdominal completo |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |

156

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

156

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

156

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **156.1** DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS | **156.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A APENDICECTOMÍA | **156.5** CUIDADOS INTENSIVOS POST-APENDICECTOMÍA | **156.2** APENDICECTOMÍA | **156.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A APENDICECTOMÍA |

**INCLUYE VALORACIÓN PRE-QUIRÚRGICA**

157

## MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**F10.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, intoxicación aguda<br>**F10.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, uso nocivo<br>**F11.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, intoxicación aguda<br>**F11.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, uso nocivo<br>**F12.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, intoxicación aguda<br>**F12.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, uso nocivo<br>**F13.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, intoxicación aguda<br>**F13.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, uso nocivo<br>**F14.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, intoxicación aguda<br>**F14.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, uso nocivo<br>**F15.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, intoxicación aguda<br>**F15.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso | 010.000.2707.00 | **ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-ISSSTE-256-13-EyR<br>GPC-SS-097-08-EyR<br>GPC-SS-664-13-EyR<br>GPC-SS-667-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-028-SSA2-2009 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Perfil toxicológico<br>Pruebas de función renal<br>Pruebas de función hepática<br>Electrocardiograma<br>Telerradiografía de tórax |
| | 040.000.2499.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2500.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4490.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4491.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4492.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1096.00 | **BROMOCRIPTINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.2242.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.3215.00 | **DIAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2611.00 | **FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml. | | |
| | 010.000.0525.00 | **FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas. | | |
| | 040.000.3251.00 | **FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml). | | |
| | 040.000.4054.00 | **FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml). | | |
| | 040.000.3251.00 | **HALOPERIDOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.3302.00 | **IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |

157

## MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de otros estimulantes, incluida la cafeína, uso nocivo<br>**F16.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, intoxicación aguda<br>**F16.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, uso nocivo<br>**F17.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, intoxicación aguda<br>**F17.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, uso nocivo<br>**F18.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, intoxicación aguda<br>**F18.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, uso nocivo<br>**F19.0** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Intoxicación aguda<br>**F19.1** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Uso nocivo | 040.000.5476.00 | **LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 040.000.5478.00 | **LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 040.000.0302.00 | **LORAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas | | |
| | 040.000.0302.00 | **NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.0291.00 | **NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5485.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5485.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 040.000.3258.00 | **RISPERIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 010.000.5395.00 | **TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula. | | |
| | 010.000.5483.00 | **ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta. | | |
| | 010.000.5484.00 | **ZUCLOPENTIXOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5484.01 | **ZUCLOPENTIXOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas. | | |

157

# MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **157.1** MANEJO EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | **157.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | **157.3** CUIDADOS INTENSIVOS POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | | |

158

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**F10.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia<br>**F10.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia con delirio<br>**F11.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia<br>**F11.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia con delirio<br>**F12.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia<br>**F12.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia con delirio<br>**F13.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia<br>**F13.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia con delirio<br>**F14.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia<br>**F14.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia con delirio<br>**F15.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia<br>**F15.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia con delirio | 040.000.2499.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-ISSSTE-256-13-EyR<br><br>GPC-SS-097-08-EyR<br><br>GPC-SS-664-13-EyR<br><br>GPC-SS-667-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-028-SSA2-2009 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Glucosa capilar<br><br>Pruebas de función renal<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Electrocardiograma<br><br>Telerradiografía de tórax |
| | 040.000.2500.00 | **ALPRAZOLAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4490.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4491.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4492.00 | **ARIPIPRAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.4026.00 | **BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml. | | |
| | 040.000.2100.00 | **BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2100.01 | **BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2101.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.3215.00 | **DIAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2611.00 | **FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml. | | |
| | 010.000.0525.00 | **FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas. | | |
| | 040.000.3251.00 | **FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml). | | |
| | 040.000.3302.00 | **IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 040.000.5478.00 | **LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de | | |

158

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **F16.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, estado de abstinencia<br>**F16.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, estado de abstinencia con delirio<br>**F17.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado de abstinencia<br>**F17.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado de abstinencia con delirio<br>**F18.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia<br>**F18.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia con delirio<br>**F19.3** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia<br>**F19.4** Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia con delirio | | | levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0291.00 | **NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5485.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5485.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.00 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas. | | |
| | 010.000.5486.01 | **OLANZAPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | | |
| | 040.000.3258.00 | **RISPERIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 010.000.5395.00 | **TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula. | | |
| | 010.000.5483.00 | **ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta. | | |
| | 010.000.5484.00 | **ZUCLOPENTIXOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5484.01 | **ZUCLOPENTIXOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas. | | |

158

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS**

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **158.1** MANEJO EN URGENCIAS DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | **158.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS | | | |

159

## ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T43.3** Envenenamiento por Antipsicóticos y neurolépticos fenotiacínicos<br>**T60.2** efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas], otros insecticidas | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | GPC-SS-110-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Electrocardiograma<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2242.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |
| | 010.000.0405.00 | **DIFENHIDRAMINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0406.00 | **DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0291.00 | **NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml. | | |

159

## ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **159.1** ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS | | | | |

160

## ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T54.3** Efecto tóxico álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | GPC-SS-110-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Electrocardiograma<br><br>Endoscopia / Panendoscopía<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1929.00 | **AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.0476.00 | **METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. De diluyente. | | |
| | 010.000.3433.00 | **METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.5187.00 | **OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

160

# ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **160.1** MANEJO EN URGENCIAS DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES | **160.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES | **160.3** CUIDADOS INTENSIVOS POR ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES | | |

161

## ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>T39.0 Envenenamiento por Salicilatos | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | GPC-SS-110-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.2242.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |

161

## ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **161.1** ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS | | | | |

162

## ENVENENAMIENTO POR METANOL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T51.1** Efecto tóxico por metanol | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | GPC-SS-110-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.2242.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |
| | 010.000.0476.00 | **METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. De diluyente. | | |
| | 010.000.3433.00 | **METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml. | | |

162

## ENVENENAMIENTO POR METANOL

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **162.1** ENVENENAMIENTO POR METANOL | | | | |

163

## ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T60.0** Efecto tóxico por Insecticidas organofosforados y carbamatos | 010.000.0204.00 | **ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | GPC-SS-100-08-EyR<br>GPC-SS-110-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Electrocardiograma |
| | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.2242.00 | **CARBÓN ACTIVADO POLVO** | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | | |
| | 010.000.0406.00 | **DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | |

163

# ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **163.1** ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS | **163.2** HOSPITALIZACIÓN POR ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS | **163.3** CUIDADOS INTENSIVOS POR ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS | | |

164

## ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T58X** Efecto tóxico del monóxido de carbono | SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS | | | GPC-SS-487-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Creatinfosfoquinasa (CPK)<br><br>Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Electrocardiograma |

164

# ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **164.1** ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO | **164.2** HOSPITALIZACIÓN POR ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO | | | |

165

## ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T63.0** Veneno de serpiente<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.16** Inyección de antídoto | 010.000.0405.00 | **DIFENHIDRAMINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. | GPC-SS-298-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-036-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempo de coagulación, INR<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación |
| | 010.000.0406.00 | **DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 020.000.3850.00 | **FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg) de veneno de Micrurus sp. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | | |
| | 020.000.3849.00 | **FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de crótalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0476.00 | **METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. De diluyente. | | |
| | 010.000.3433.00 | **METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |

165

## ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

165

## ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **165.1** ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE | **165.2** HOSPITALIZACIÓN POR ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE | **165.3** CUIDADOS INTENSIVOS POR MORDEDURA DE SERPIENTE | | |

166

## PICADURA DE ALACRÁN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T63.2** Veneno de escorpión<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.16** Inyección de antídoto | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-SS-148-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-033-SSA2-2011 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 010.000.2142.00 | **CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.0402.00 | **CLORFENAMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.0406.00 | **DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | | |
| | 020.000.3847.00 | **FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | | |
| | 010.000.0474.00 | **HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |

166

## PICADURA DE ALACRÁN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

166

# PICADURA DE ALACRÁN

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **166.1** PICADURA DE ALACRÁN | | | | |

167

## PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T63.3** Veneno de arañas<br>**T63.4** Veneno de otros artrópodos<br><br>**CIE-9-MC**<br>**99.16** Inyección de antídoto | 010.000.0408.00 | **CLORFENAMINA JARABE** | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | GPC-SS-489-11-EyR<br><br>GPC-SS-523-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Creatinfosfoquinasa (CPK)<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma |
| | 010.000.2142.00 | **CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.0402.00 | **CLORFENAMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 020.000.3848.00 | **FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácnido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácnido) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | | |
| | 010.000.0474.00 | **HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0476.00 | **METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. De diluyente. | | |
| | 010.000.3433.00 | **METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

167

## PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

167

## PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **167.1** PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS | | | | |

168

## INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**A05.0** Intoxicación alimentaria estafilocócica<br>**A05.1** Botulismo<br>**A05.2** Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii]<br>**A05.3** Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus<br>**A05.4** Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus<br>**A05.8** Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas<br>**A05.9** Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1243.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

168

## INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **168.1** MANEJO EN URGENCIAS DE LA INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA | **168.2** MANEJO HOSPITALARIO DE LA INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA | **168.3** CUIDADOS INTENSIVOS POR INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA | | |

169

## MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>T14.1 Herida de región no especificada del cuerpo<br>W53.0 Mordedura de rata, vivienda<br>W53.1 Mordedura de rata, institución residencial<br>W53.2 Mordedura de rata, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas<br>W53.3 Mordedura de rata, áreas de deporte y atletismo<br>W53.4 Mordedura de rata, calles y carreteras<br>W53.5 Mordedura de rata, comercio y área de servicios<br>W53.6 Mordedura de rata, área industrial y de la construcción<br>W53.7 Mordedura de rata, granja<br>W53.8 Mordedura de rata, otro lugar especificado<br>W53.9 Mordedura de rata, lugar no especificado<br>W54.0 Mordedura o ataque de perro, vivienda<br>W54.1 Mordedura o ataque de perro, institución residencial<br>W54.2 Mordedura o ataque | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-011-SSA2-2011<br>NOM-017-SSA2-2012 | Muestra de encéfalo del animal agresor |
| | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | | |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 020.000.3833.02 | **INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana antirrábica 300 UI Envase con una jeringa prellenada con 2 ml (150 UI/ml). | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |

169

## MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de perro, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas<br>W54.3 Mordedura o ataque de perro, áreas de deporte y atletismo<br>W54.4 Mordedura o ataque de perro, calles y carreteras<br>W54.5 Mordedura o ataque de perro, comercio y área de servicios<br>W54.6 Mordedura o ataque de perro, área industrial y de la construcción<br>W54.7 Mordedura o ataque de perro, granja<br>W54.8 Mordedura o ataque de perro, otro lugar especificado<br>W54.9 Mordedura o ataque de perro, lugar no especificado<br>W55.0 Mordedura o ataque de otros mamíferos, vivienda<br>W55.1 Mordedura o ataque de otros mamíferos, institución residencial<br>W55.2 Mordedura o ataque de otros mamíferos, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas<br>W55.3 Mordedura o ataque de otros mamíferos, áreas de deporte y atletismo<br>W55.4 Mordedura o ataque | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 020.000.3810.00 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis). | | |
| | 020.000.3810.01 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml). | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |

169

## MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de otros mamíferos, calles y carreteras<br>W55.5 Mordedura o ataque de otros mamíferos, comercio y área de servicios<br>W55.6 Mordedura o ataque de otros mamíferos, área industrial y de la construcción<br>W55.7 Mordedura o ataque de otros mamíferos, granja<br>W55.8 Mordedura o ataque de otros mamíferos, otro lugar especificado<br>W55.9 Mordedura o ataque de otros mamíferos, lugar no especificado<br>Z20.3 Contacto con y exposición a rabia<br>Z24.2 Necesidad de inmunización contra la rabia<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>99.44 Vacunación contra rabia | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |
| | 020.000.3817.00 | **VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLOR LEP-C25) con potencia ≥ 2.5 UI cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml de diluyente. | | |
| | 020.000.3817.01 | **VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar PM/SI 38-1503-DM) con potencia ≥ 2.5 UI, cultivado en células VERO. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml de diluyente. | | |

169

## MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **169.1** MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS | **169.2** MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS | | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**T15.0** Cuerpo extraño en la córnea<br>**T15.1** Cuerpo extraño en el saco conjuntival<br>**T15.8** Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de la parte externa del ojo<br>**T15.9** Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado<br>**T16X** Cuerpo extraño en el oído<br>**T17.0** Cuerpo extraño en seno paranasal<br>**T17.1** Cuerpo extraño en el orificio nasal<br>**T17.2** Cuerpo extraño en la faringe<br>**T17.3** Cuerpo extraño en la laringe<br>**T17.4** Cuerpo extraño en la tráquea<br>**T17.5** Cuerpo extraño en bronquios<br>**T17.8** Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías respiratorias<br>**T17.9** Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada<br>**T18.0** Cuerpo extraño en la boca<br>**T18.1** Cuerpo extraño en el esófago<br>**T18.2** Cuerpo extraño en el estómago<br>**T18.3** Cuerpo extraño en el intestino delgado<br>**T18.4** Cuerpo extraño en el colon<br>**T18.5** Cuerpo extraño en el ano y en el recto | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | GPC-ISSSTE-526-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar<br>Examen general de orina<br>Endoscopía / Colonoscopía larga<br>Endoscopía sin toma de biopsia<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2822.00 | **CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.2824.00 | **NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B. Bacitracina 400 U. Envase con 3.5 g. | | |
| | 010.000.2823.00 | **NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **T18.8** Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo<br>**T18.9** Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada<br>**T19.0** Cuerpo extraño en la uretra<br>**T19.1** Cuerpo extraño en la vejiga<br>**T19.2** Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina<br>**T19.3** Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]<br>**T19.8** Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías genitourinarias<br>**T19.9** Cuerpo extraño en las vías genitourinarias, parte no especificada<br>**W44.0** Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, vivienda<br>**W44.1** Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, institución residencial<br>**W44.2** Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas<br>**W44.3** Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, áreas de deporte y atletismo<br>**W44.4** Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, calles y carreteras<br>**W45.0** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, vivienda<br>**W45.1** Cuerpo extraño que | | | | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| penetra a través de la piel, institución residencial<br>**W45.2** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas<br>**W45.3** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, áreas de deporte y atletismo<br>**W45.4** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, calles y carreteras<br>**W45.5** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, comercio y área de servicios<br>**W45.6** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, área industrial y de la construcción<br>**W45.7** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, granja<br>**W45.8** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, otro lugar especificado<br>**W45.9** Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, lugar no especificado<br>**12.00** Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, no especificada de otra manera<br>**12.01** Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, con empleo de imán<br>**12.02** Extracción de cuerpo extraño del segmento anterior del ojo sin empleo de imán<br>**18.09** Otra incisión del oído externo | | | | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **21.1X** Incisión nasal<br>**12.11** Iridotomía con transfixión<br>**12.12** Otra iridotomía<br>**12.13** Excisión de iris prolapsado<br>**12.14** Otra iridectomía<br>**33.0X** Incisión de bronquio<br>**33.1X** Incisión de pulmón<br>**64.92** Incisión de pene<br>**70.14** Otra vaginotomía<br>**71.09** Otra incisión de vulva y perineo<br>**98.01** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la boca<br>**98.02** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del esófago<br>**98.03** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del estómago e intestino delgado<br>**98.04** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del intestino grueso<br>**98.05** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del recto y ano<br>**98.11** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del oído<br>**98.12** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la nariz<br>**98.13** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la faringe<br>**98.14** Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la laringe<br>**98.15** Extracción sin incisión | | | | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de cuerpo extraño intraluminal de tráquea y bronquio<br>**98.16** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en útero<br>**98.17** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vagina<br>**98.18** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en estoma artificial<br>**98.19** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en uretra<br>**98.20** Extracción de cuerpo extraño, no especificado de otra manera<br>**98.21** Extracción sin incisión de cuerpo extraño superficial en ojo<br>**98.22** Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en cuello y cabeza<br>**98.23** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vulva<br>**98.24** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en pene o escroto<br>**98.25** Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en otro conducto salvo de escroto pene o vulva<br>**98.26** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en mano<br>**98.27** Extracción sin incisión de cuerpo extraño en miembro superior, salvo de la mano"<br>**98.28** Extracción sin incisión de cuerpo extraño de pie<br>**98.29** Extracción sin incisión de cuerpo extraño de miembro inferior, salvo del pie | | | | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |

170

## EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **170.1** EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS | | | | **170.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS |

171

## CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**S01.0** Herida del cuero cabelludo<br>**S01.1** Herida del párpado y de la región periocular<br>**S01.2** Herida de la nariz<br>**S01.3** Herida del oído<br>**S01.4** Herida de la mejilla y de la región temporomandibular<br>**S01.5** Herida del labio y de la cavidad bucal<br>**S01.7** Heridas múltiples de la cabeza<br>**S01.8** Herida de otras partes de la cabeza<br>**S01.9** Herida de la cabeza, parte no especificada<br>**S11.0** Herida que compromete la laringe y la tráquea<br>**S11.1** Herida que compromete la glándula tiroides<br>**S11.2** Herida que compromete la faringe y el esófago cervical<br>**S11.7** Heridas múltiples del cuello<br>**S11.8** Heridas de otras partes del cuello<br>**S11.9** Herida de cuello, parte no especificada<br>**S20.0** Contusión de la mama<br>**S20.1** Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama<br>**S20.2** Contusión del tórax<br>**S20.3** Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del tórax | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | NOM-004-SSA3-2012 | Sin Auxiliar |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.0262.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.0265.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 020.000.3810.00 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis). | | |
| | 020.000.3810.01 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL | | |

171

## CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **S20.4** Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del tórax<br>**S20.7** Traumatismos superficiales múltiples del tórax<br>**S20.8** Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del tórax<br>**S21.0** Herida de la mama<br>**S21.1** Herida de la pared anterior del tórax<br>**S21.2** Herida de la pared posterior del tórax<br>**S21.7** Herida múltiple de la pared torácica<br>**S21.8** Herida de otras partes del tórax<br>**S21.9** Herida del tórax, parte no especificada<br>**S31.0** Herida de la región lumbosacra y de la pelvis<br>**S31.1** Herida de la pared abdominal<br>**S31.2** Herida del pene<br>**S31.3** Herida del escroto y de los testículos<br>**S31.4** Herida de la vagina y de la vulva<br>**S31.5** Herida de otros órganos genitales externos y de los no especificados<br>**S31.7** Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis<br>**S31.8** Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen<br>**S41.0** Herida del hombro<br>**S41.1** Herida del brazo<br>**S41.7** Heridas múltiples del hombro y del brazo | | | contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml). | | |

171

## CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **S41.8** Herida de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo<br>**S51.0** Herida del codo<br>**S51.7** Heridas múltiples del antebrazo<br>**S51.8** Herida de otras partes del antebrazo<br>**S51.9** Herida del antebrazo, parte no especificada<br>**S61.0** Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)<br>**S61.1** Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)<br>**S61.7** Heridas múltiples de la muñeca y de la mano<br>**S61.8** Herida de otras partes de la muñeca y de la mano<br>**S61.9** Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada<br>**S71.0** Herida de la cadera<br>**S71.1** Herida del muslo<br>**S71.7** Heridas múltiples de la cadera y del muslo<br>**S71.8** Herida de otras partes y de las no especificadas de la cintura pélvica<br>**S81.0** Herida de la rodilla<br>**S81.7** Heridas múltiples de la pierna<br>**S81.8** Herida de otras partes de la pierna<br>**S81.9** Herida de la pierna, parte no especificada<br>**S91.0** Herida del tobillo<br>**S91.1** Herida de dedo(s) del pie sin daño(s) de la(s) uña(s)<br>**S91.2** Herida de dedo(s) del pie con daño(s) de la(s) uña(s)<br>**S91.3** Herida de otras partes del pie | | | | | |

171

## CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **S91.7** Heridas múltiples del tobillo y del pie<br>**T01.0** Heridas que afectan la cabeza con el cuello<br>**T01.1** Heridas que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis<br>**T01.2** Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)<br>**T01.3** Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)<br>**T01.6** Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)<br>**T01.8** Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo<br>**T01.9** Heridas múltiples, no especificadas<br>**T11.1** Herida de miembro superior, nivel no especificado<br>**T13.1** Herida de miembro inferior, nivel no especificado<br>**T14.1** Herida de región no especificada del cuerpo<br>**CIE-9-MC**<br><br>**86.59** Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios<br>**00.F9** Curación de herida | | | | | |

171

## CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **171.1** CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS | | | | **171.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS |

172

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>**S00.0** Traumatismo superficial del cuero cabelludo<br><br>**S00.9** Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada<br><br>**S06.0** Concusión | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | GPC-SS-016-08-EyR<br><br>GPC-SSA-002-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

172

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **172.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE | | | | **172.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE |

173

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>**S06.1** Edema cerebral traumático<br>**S06.2** Traumatismo cerebral difuso<br>**S06.3** Traumatismo cerebral focal<br>**S06.8** Otros traumatismos intracraneales<br>**S06.9** Traumatismo intracraneal, no especificado | 040.000.2614.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml. | GPC-SS-016-08-EyR<br>GPC-SSA-002-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo<br>Tomografía axial computarizada de cráneo |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2624.00 | **FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

173

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **173.1** DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO | **173.2** TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO | | | **173.3** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO |

174

## DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>S06.1 Edema cerebral traumático<br>S06.2 Traumatismo cerebral difuso<br>S06.3 Traumatismo cerebral focal<br>S06.4 Hemorragia epidural<br>S06.5 Hemorragia subdural traumática<br>S06.6 Hemorragia subaracnoidea traumatica<br>S06.8 Otros traumatismos intracraneales<br>S06.9 Traumatismo intracraneal, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br>89.15 Otras pruebas de funcionamiento neurológico, no quirúrgicas | 040.000.2614.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml. | GPC-SS-016-08-EyR<br>GPC-SSA-002-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo<br>Tomografía axial computarizada de cráneo |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

174

## DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **174.1** DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO | | | | |

175

## MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L55.0 Quemadura solar de primer grado<br>L55.8 Otras quemaduras solares<br>L55.9 Quemadura solar, no especificada<br>T20.1 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado<br>T21.1 Quemadura del tronco, de primer grado<br>T22.1 Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano<br>T23.1 Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado<br>T24.1 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie<br>T25.1 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado<br>T29.1 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de primer grado<br>T30.1 Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada<br>**CIE-9-MC**<br>00.F9 Curación de herida | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | GPC-IMSS-040-08-EyR<br>GPC-IMSS-453-11-EyR<br>GPC-ISSSTE-678-13-EyR<br>GPC-SS-090-08-EyR<br>GPC-SS-744-15-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0804.00 | **ÓXIDO DE ZINC PASTA** | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

175

## MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **175.1** MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO | | | | **175.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A QUEMADURAS DE PRIMER GRADO |

176

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>L55.1 Quemadura solar de segundo grado<br>T20.2 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado<br>T21.2 Quemadura del tronco, de segundo grado<br>T22.2 Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano<br>T23.2 Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado<br>T24.2 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie<br>T25.2 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado<br>T29.2 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de segundo grado<br>T30.2 Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada<br>**CIE-9-MC**<br>00.F9 Curación de herida<br>86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-040-08-EyR<br>GPC-ISSSTE-678-13-EyR<br>GPC-SS-090-08-EyR<br>GPC-SS-744-15-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Cultivo de líquidos biológicos<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Proteína C Reactiva<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 060.066.1318 | **ANTISÉPTICO** | Solución Antiséptica y Astringente pH 14. Cada 100 ml contiene: Permanganato de potasio 5.1250 g., Alcohol 60.7500 mL., Ácido benzoico 4.0500 g., Ácido Salicílico 2.0250 g., Aguda Purificada 100.0000 mL. Envase de 40 mL. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 040.000.2613.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral. | | |
| | 040.000.2614.00 | **CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml. | | |
| | 040.000.2612.00 | **CLONAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5079.00 | **CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de cloropiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |

176

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |

176

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4126.00 | **SULFADIAZINA DE PLATA CREMA** | Cada 100 g contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g. | | |
| | | | | | |

176

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **176.1** MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO | **176.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO | **176.4** CUIDADOS INTENSIVOS POR QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO | **176.3** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO | **176.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

**177**

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>A97.1 Dengue con signos de alarma<br><br>A97.2 Dengue severo<br><br>U06.9 Enfermedad del virus Zika | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | GPC-SSA-151-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-032-SSA2-2014 | Anticuerpos IgM contra Dengue<br><br>Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdominal superior |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

177

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **177.1** DIAGNÓSTICO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS) | **177.2** TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS) | **177.3** CUIDADOS INTENSIVOS POR DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS) | | **177.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS) |

178

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>K85.0 Pancreatitis idiopática aguda<br>K85.1 Pancreatitis biliar aguda<br>K85.2 Pancreatitis aguda inducida por alcohol<br>K85.3 Pancreatitis aguda inducida por drogas<br>K85.8 Otras pancreatitis agudas<br>K85.9 Pancreatitis aguda, no especificada | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-ISSSTE-256-13-EyR<br>GPC-SS-097-08-EyR<br>GPC-SS-664-13-EyR<br>GPC-SS-667-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-028-SSA2-2009 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Glucosa capilar<br>Pruebas de función renal<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Electrocardiograma<br>Telerradiografía de tórax |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |

178

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.4249.00 | **LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.5187.00 | **OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |

178

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **178.1** MANEJO EN URGENCIAS DE PANCREATITIS AGUDA | **178.2** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA | **178.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE PANCREATITIS AGUDA | | **178.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA |

179

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K22.6 Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas<br>K25.0 Úlcera gástrica, aguda con hemorragia<br>K25.4 Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con hemorragia<br>K26.0 Úlcera duodenal, aguda con hemorragia<br>K26.4 Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con hemorragia<br>K27.0 Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con hemorragia<br>K27.4 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia<br>K28.0 Úlcera gastroyeyunal, aguda con hemorragia<br>K28.4 Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia<br>K29.0 Gastritis aguda hemorrágica<br>K62.5 Hemorragia del ano y del recto<br>K92.0 Hematemesis<br>K92.1 Melena<br>K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada<br>K92.8 Otras enfermedades especificadas del sistema digestivo<br>K92.9 Enfermedad del sistema digestivo, no especificada | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-169-09-EyR<br><br>GPC-ISSSTE-133-08-EyR<br><br>GPC-SSA-150-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Electrocardiograma<br><br>Endoscopia / Panendoscopía<br><br>endoscopia con escleroterapia<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Rectosigmoidoscopía |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.6102.00 | **COMPLEJO DE PROTROMBINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor II de coagulación humana 400-960 UI, Factor VII de coagulación humana 200-500 UI, Factor IX de coagulación humana 400-620 UI, Factor X de coagulación humana 440-1200 UI, Proteína C 300-900 UI, Proteína S 240-760 UI, Proteínas totales 120-280 mg, Envase con un frasco ámpula con liofilizado, frasco ámpula con 20 ml de diluyente y un dispositivo de transferencia. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

179

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br><br>44.40 Sutura de úlcera péptica no especificada de otra manera<br>44.41 Sutura de úlcera gástrica<br>44.42 Sutura de úlcera duodenal<br>44.43 Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal<br>44.44 Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal<br>44.49 Otro control de hemorragia de estómago o duodeno<br>44.91 Ligadura de várices gástricas | 010.000.5186.01 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5186.02 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 010.000.5176.00 | **SUCRALFATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas. | | |
| | 010.000.2135.00 | **FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Fluconazol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml (2 mg/ml). | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5186.01 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5186.02 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |

179

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **179.1** MANEJO EN URGENCIAS DE HEMORRAGIA DIGESTIVA | **179.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA | **179.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA | | **179.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA |

180

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>I86.1 Varices escrotales<br>N43.0 Hidrocele enquistado<br>N43.1 Hidrocele infectado<br>N43.2 Otros hidroceles<br>N43.3 Hidrocele, no especificado<br>N43.4 Espermatocele<br><br>**CIE-9-MC**<br>63.1X Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático<br>63.2X Excisión de quiste de epidídimo<br>61.2X Escisión de hidrocele de túnica vaginal | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-279-10 EyR<br>GPC-IMSS-443-11 EyR<br>GPC-IMSS-674-13 EyR | Ultrasonido Doppler<br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |

180

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

180

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **180.1** MANEJO EN URGENCIAS DE VARICOCELE E HIDROCELE | **180.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VARICOCELE E HIDROCELE | | **180.2** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VARICOCELE E HIDROCELE | **180.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

181

## ESGUINCE CERVICAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S13.4 Esguinces y torceduras de la columna cervical<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>93.52 Aplicación de soporte cervical | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-SS-008-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3444.00 | **METOCARBAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

181

**ESGUINCE CERVICAL**

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **181.1** ESGUINCE CERVICAL | | | | **181.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE CERVICAL |

182

## ESGUINCE DE HOMBRO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S43.4 Esguinces y torceduras de la articulación del hombro<br><br>S43.5 Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>93.56 Aplicación de vendaje de presión<br><br>93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

182

**ESGUINCE DE HOMBRO**

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **182.1** ESGUINCE DE HOMBRO | | | | **182.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE DE HOMBRO |

183

## ESGUINCE DE CODO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S53.4 Esguinces y torceduras del codo<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>93.54 Aplicación de férula<br><br>93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-IMSS-198-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

183

## ESGUINCE DE CODO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **183.1** ESGUINCE DE CODO | | | | **183.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE DE CODO |

184

## ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S63.5 Esguince y torcedura de la muñeca<br><br>S63.6 Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano<br><br>S63.7 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>93.54 Aplicación de férula | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-IMSS-065-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

184

## ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **184.1** ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO | | | | **184.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO |

185

## ESGUINCE DE RODILLA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla<br><br>S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla<br><br>S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado<br><br>93.54 Aplicación de férula | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-IMSS-388-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

185

**ESGUINCE DE RODILLA**

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **185.1** ESGUINCE DE RODILLA | | | | **185.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE DE RODILLA |

186

## ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo<br><br>S93.5 Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie<br><br>S93.6 Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado<br><br>93.54 Aplicación de férula | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-IMSS-034-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

186

**ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE**

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **186.1** ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE | | | | **186.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE |

187

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>S43.0 Luxación de la articulación del hombro<br>S43.1 Luxación de la articulación acromioclavicular<br>S43.2 Luxación de la articulación esternoclavicular<br>S43.3 Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas<br>S53.0 Luxación de la cabeza del radio<br>S53.1 Luxación del codo, no especificada<br>S63.0 Luxación de la muñeca<br>S63.1 Luxación de dedos de la mano<br>S63.2 Luxaciones múltiples de dedos de la mano<br>S73.0 Luxación de la cadera<br>S83.0 Luxación de la rótula<br>S83.1 Luxación de la rodilla<br>S93.0 Luxación de la articulación del tobillo<br>S93.1 Luxación de dedo(s) del pie<br>S93.3 Luxación de otros sitios y los no especificados del pie<br>T03.2 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)<br>T03.3 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)<br>T03.4 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)<br>**CIE-9-MC**<br>79.70 Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado<br>79.71 Reducción cerrada de luxación | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-198-10-EyR<br>GPC-IMSS-388-10-EyR<br>GPC-IMSS-437-12-EyR<br>GPC-IMSS-531-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

187

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de hombro<br>79.72 Reducción cerrada de luxación de codo<br>79.73 Reducción cerrada de luxación de muñeca<br>79.74 Reducción cerrada de luxación de mano y dedo de mano<br>79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera<br>79.76 Reducción cerrada de luxación de rodilla<br>79.77 Reducción cerrada de luxación de tobillo<br>79.78 Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie<br>79.79 Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados<br>79.80 Reducción abierta de luxación de sitio no especificado<br>79.81 Reducción abierta de luxación de hombro<br>79.82 Reducción abierta de luxación de codo<br>79.83 Reducción abierta de luxación de muñeca<br>79.84 Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano<br>79.85 Reducción abierta de luxación de cadera<br>79.86 Reducción abierta de luxación de rodilla<br>79.87 Reducción abierta de luxación de tobillo<br>79.88 Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie<br>79.89 Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados<br>93.54 Aplicación de férula | | | | | |

187

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **187.1** MANEJO CONSERVADOR DE LUXACIONES | **187.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN | | **187.2** REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN | **187.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

188

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S42.0 Fractura de la clavícula<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>78.61 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]<br>79.19 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, otros huesos específicos<br>79.29 Reducción abierta de fractura sin fijación, otros huesos específicos<br>79.39 Reducción abierta de fractura con fijación, otros huesos específicos<br>79.49 Reducción cerrada de epífisis separada, otros huesos específicos<br>79.59 Reducción abierta de epífisis separada, otros huesos específicos<br>79.69 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, otros huesos específicos<br>93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-584-12-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

188

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **188.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA | **188.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA | | **188.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA | **188.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**
**INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

189

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S42.2 Fractura de la epífisis superior del húmero<br>S42.3 Fractura de la diáfisis del húmero<br>S42.4 Fractura de la epífisis inferior del húmero<br>**CIE-9-MC**<br><br>78.62 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, húmero<br>79.01 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, húmero<br>79.11 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, húmero<br>79.21 Reducción abierta de fractura sin fijación interna, húmero<br>79.31 Reducción abierta de fractura con fijación interna, húmero<br>79.41 Reducción cerrada de epífisis separada, húmero<br>79.51 Reducción abierta de epífisis separada, húmero<br>79.61 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, húmero<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-555-12-EyR<br><br>GPC-IMSS-576-12-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

189

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **189.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE HÚMERO | **189.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO | | **189.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO | **189.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

190

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>S52.0 Fractura de la epífisis superior del cúbito<br>S52.1 Fractura de la epífisis superior del radio<br>S52.2 Fractura de la diáfisis del cúbito<br>S52.3 Fractura de la diáfisis del radio<br>S52.6 Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio<br>S52.7 Fracturas múltiples del antebrazo<br>S52.8 Fracturas de otras partes del antebrazo<br>S52.9 Fracturas del antebrazo, parte no especificada<br>S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio<br>S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio<br>**CIE-9-MC**<br>78.63 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, radio y cúbito<br>79.02 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, radio y cúbito<br>79.12 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, radio y cúbito<br>79.22 Reducción abierta de fractura sin fijación, radio y cúbito<br>79.32 Reducción abierta de fractura con fijación, radio y cúbito<br>79.42 Reducción cerrada de epífisis separada, radio y cúbito<br>79.52 Reducción abierta de epífisis separada, radio y cúbito<br>79.62 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, radio y cúbito<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-193-08-EyR<br>GPC-IMSS-266-10-EyR<br>GPC-IMSS-437-12-EyR<br>GPC-IMSS-534-11-EyR<br>GPC-IMSS-636-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

190

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **190.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO | **190.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO | | **190.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO | **190.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

191

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio<br>S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio<br>S62.0 Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano<br>S62.1 Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo<br>S62.2 Fractura del primer metacarpiano<br>S62.3 Fractura de otros huesos metacarpianos<br>S62.4 Fracturas múltiples de huesos metacarpianos<br>S62.5 Fractura del pulgar<br>S62.6 Fractura de otro dedo de la mano<br>S62.7 Fracturas múltiples de los dedos de la mano<br>S62.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano<br><br>**CIE-9-MC**<br>78.64 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, carpianos y metacarpianos<br>79.03 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, carpianos y metacarpianos<br>79.04 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y mano<br>79.13 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, carpianos y metacarpianos<br>79.14 Reducción cerrada de | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-065-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

191

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| fractura con fijación interna, falanges y mano<br>79.23 Reducción abierta de fractura sin fijación, carpianos y metacarpianos<br>79.24 Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y mano<br>79.33 Reducción abierta de fractura con fijación, carpianos y metacarpianos<br>79.34 Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y mano<br>79.43 Reducción cerrada de epífisis separada, carpianos y metacarpianos<br>79.44 Reducción cerrada de epífisis separada, falanges y mano<br>79.53 Reducción abierta de epífisis separada, carpianos y metacarpianos<br>79.54 Reducción abierta de epífisis separada, falanges y mano<br>79.63 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, carpianos y metacarpianos<br>79.64 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, falanges y mano<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado | | | | | |

191

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **191.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE MANO | **191.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO | | **191.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO | **191.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

192

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>S32.4 Fractura del acetábulo<br>S72.0 Fractura del cuello de fémur<br>S72.1 Fractura pertrocanteriana<br>S72.2 Fractura subtrocanteriana<br>**CIE-9-MC**<br>81.40 Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto<br>81.51 Sustitución o reemplazo total de cadera<br>81.52 Sustitución parcial de cadera<br>81.53 Revisión de sustitución de cadera no especificada de otra manera | 010.000.5731.00 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-115-08-EyR<br>GPC-IMSS-236-14-EyR<br>GPC-IMSS-267-10-EyR<br>GPC-IMSS-573-12-EyR<br>GPC-IMSS-603-13-EyR<br>GPC-SS-017-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Tiempos y pruebas de coagulación<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5731.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5732.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5551.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.5551.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |

192

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

192

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **192.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE CADERA | **192.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA | **192.5** CUIDADOS INTENSIVOS POR FRACTURA DE CADERA | **192.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA | **192.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y PRÓTESIS DE CADERA

193

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S72.3 Fractura de la diáfisis del fémur<br>S72.4 Fractura de la epífisis inferior del fémur<br>S72.7 Fracturas múltiples del fémur<br>S72.8 Fracturas de otras partes del fémur<br>S72.9 Fractura del fémur, parte no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>78.65 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, fémur<br>79.05 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, fémur<br>79.15 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, fémur<br>79.25 Reducción abierta de fractura sin fijación, fémur<br>79.35 Reducción abierta de fractura con fijación, fémur<br>79.45 Reducción cerrada de epífisis separada, fémur<br>79.55 Reducción abierta de epífisis separada, fémur<br>79.65 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, fémur<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado | 010.000.5551.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas. | NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5551.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

193

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

193

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **193.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE FÉMUR | **193.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR | **193.5** CUIDADOS INTENSIVOS DE FRACTURA DE FÉMUR | **193.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR | **193.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

194

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S82.0 Fractura de la rótula<br>S82.1 Fractura de la epífisis superior de la tibia<br>S82.2 Fractura de la diáfisis de la tibia<br>S82.3 Fractura de la epífisis inferior de la tibia<br>S82.4 Fractura del peroné solamente<br>S82.8 Fractura de otras partes de la pierna<br>S82.9 Fractura de la pierna, parte no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>78.17 Aplicación de dispositivo fijador externo, tibia y peroné<br>78.57 Fijación interna de hueso sin reducción de fractura, tibia y peroné<br>78.67 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tibia y peroné<br>79.06 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tibia y peroné<br>79.16 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tibia y peroné<br>79.26 Reducción abierta de fractura sin fijación, tibia y peroné<br>79.36 Reducción abierta de fractura con fijación, tibia y peroné | 010.000.5551.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas. | GPC-IMSS-139-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-493-11-EyR<br><br>GPC-IMSS-578-12-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5551.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |

194

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 79.46 Reducción cerrada de epífisis separada, tibia y peroné<br>79.56 Reducción abierta de epífisis separada, tibia y peroné<br>79.66 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, tibia y peroné<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado<br>97.88 Extracción de dispositivo de inmovilización externo | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

194

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **194.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ | **194.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ | | **194.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ | **194.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

195

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>S82.5 Fractura del maléolo interno<br>S82.6 Fractura del maléolo externo<br>S82.8 Fractura de otras partes de la pierna<br>S92.0 Fractura del calcáneo<br>S92.1 Fractura del astrágalo<br>S92.2 Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso<br>S92.3 Fractura de hueso del metatarso<br>S92.4 Fractura de los huesos del dedo gordo del pie<br>S92.5 Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie<br>S92.7 Fracturas múltiples del pie<br>S92.9 Fractura del pie, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>78.68 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tarsianos y metatarsianos<br>79.07 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tarsianos y metatarsianos<br>79.08 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y pie<br>79.17 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tarsianos y metatarsianos<br>79.18 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-493-11-EyR<br><br>GPC-IMSS-501-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

195

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| falanges y pie<br>79.27 Reducción abierta de fractura sin fijación, tarsianos y metatarsianos<br>79.28 Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y pie<br>79.37 Reducción abierta de fractura con fijación, tarsianos y metatarsianos<br>79.38 Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y pie<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado | | | | | |

195

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **195.1** MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE | **195.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE | | **195.3** REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE | **195.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

196

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>S83.0 Luxación de la rótula<br>S83.1 Luxación de la rodilla<br>S83.2 Desgarro de meniscos, presente<br>S83.3 Desgarro del cartílago articular de la rodilla, presente<br>S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla<br>S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla<br>S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla<br>S83.7 Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla<br>M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral<br>M17.1 Otras gonartrosis primarias<br>M22.0 Luxación recidivante de la rótula<br>M22.1 Subluxación recidivante de la rótula<br>M22.2 Trastornos rotulofemorales<br>M22.3 Otros desarreglos de la rótula<br>M22.4 Condromalacia de la rótula<br>M22.8 Otros trastornos de la rótula<br>M22.9 Trastorno de la rótula, no especificado<br>M23.0 Menisco quístico<br>M23.1 Menisco discoide (congénito)<br>M23.2 Trastorno de menisco debido a desgarro o lesión antigua<br>M23.3 Otros trastornos de los meniscos | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-IMSS-388-10-EyR<br>GPC-IMSS-577-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones<br>Resonancia magnética en regiones<br>Artroscopía de rodilla |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

196

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| M23.4 Cuerpo flotante en la rodilla<br>M23.5 Inestabilidad crónica de la rodilla<br>M23.6 Otra ruptura espontánea del (de los) ligamento(s) de la rodilla<br>M23.8 Otros trastornos internos de la rodilla<br>M23.9 Trastorno interno de la rodilla, no especificado<br>**CIE-9-MC**<br>80.16 Otra artrotomía, rodilla<br>80.26 Artroscopia, rodilla<br>80.76 Sinovectomía, rodilla<br>81.42 Reparación cinco en uno de rodilla<br>81.43 Reparación de una triada de rodilla<br>81.44 Estabilización de rótula<br>81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados<br>81.46 Otra reparación de los ligamentos colaterales<br>81.47 Otra reparación de rodilla<br>00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)<br>00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial<br>00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral<br>00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano<br>00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial<br>81.54 Sustitución total de rodilla<br>81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte | | | | | |

196

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **196.1** MANEJO EN URGENCIAS DE LESIONES DE LA RODILLA | **196.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA | | **196.3** TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA | **196.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

197

## DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>I67.8 Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>89.15 Otras pruebas de funcionamiento neurológico, no quirúrgicas | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | GPC-ISSSTE-132-08 EyR<br><br>GPC-S-102-08 EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo |

197

## DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **197.1** DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA | | | | |

198

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N10X Nefritis tubulointersticial aguda | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-SSA-185-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Urocultivo<br><br>Ultrasonido de vías urinarias |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | | |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |

198

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4249.00 | **LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

198

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **198.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PIELONEFRITIS | **198.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PIELONEFRITIS | | | **198.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS |

199

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio<br><br>J21.1 Bronquiolitis aguda debida a metaneumovirus humano<br><br>J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados<br><br>J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>87.49 Otras radiografías torácicas<br><br>89.37 Determinación de capacidad vital<br><br>89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | GPC-IMSS-032-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012<br><br>NOM-031-SSA2-1999 | Biometría hemática completa<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Telerradiografía de tórax |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |

199

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **199.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE BRONQUIOLITIS | **199.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE BRONQUIOLITIS | | | |

200

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>J20.0 Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae<br>J20.1 Bronquitis aguda debida a Haemophilus influenzae<br>J20.2 Bronquitis aguda debida a estreptococos<br>J20.3 Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie<br>J20.4 Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza<br>J20.5 Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio<br>J20.6 Bronquitis aguda debida a rinovirus<br>J20.7 Bronquitis aguda debida a virus ECHO<br>J20.8 Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados<br>J20.9 Bronquitis aguda, no especificada<br>**CIE-9-MC** | 010.000.2462.00 | **AMBROXOL COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos. | GPC-SSA-189-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2002<br>NOM-017-SSA2-2002 | Biometría hemática completa<br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2463.00 | **AMBROXOL SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2129.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml. Cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | | |
| | 010.000.2230.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.2230.01 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | | |
| | 010.000.2128.00 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | | |
| | 010.000.2128.01 | **AMOXICILINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.2127.00 | **AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1938.00 | **BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | | |
| | 010.000.1923.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |

200

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 87.49 Otras radiografías torácicas<br><br>89.37 Determinación de capacidad vital<br><br>89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas | 010.000.1924.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2510.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente. | | |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1972.00 | **ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2162.01 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2188.00 | **IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml. | | |
| | 010.000.2145.00 | **LORATADINA JARABE** | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2144.00 | **LORATADINA TABLETA O GRAGEA** | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

200

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0431.00 | **SALBUTAMOL JARABE** | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0429.00 | **SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | | |
| | 010.000.1904.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

200

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **200.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE BRONQUITIS AGUDA | **200.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE BRONQUITIS AGUDA | | | **200.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA |

201

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>G00.0 Meningitis por hemófilos<br>G00.1 Meningitis neumocócica<br>G00.2 Meningitis estreptocócica<br>G00.3 Meningitis estafilocócica<br>G00.8 Otras meningitis bacterianas<br>G00.9 Meningitis bacteriana, no especificada<br>G01X Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte<br>G02.0 Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte<br>G02.1 Meningitis en micosis<br>G02.8 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas clasificadas en otra parte<br>G03.0 Meningitis apiógena | 010.000.4264.00 | **ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula. | GPC-SS-310-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Citológico y citoquímico de líquido cefalorraquídeo<br>Coaglutinación de líquido cefalorraquídeo<br>Cultivo de líquido cefalorraquídeo<br>Electrolitos séricos completos<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras<br>Potenciales evocados auditivos<br>Tomografía axial computarizada de cráneo<br>Punción lumbar |
| | 010.000.2012.00 | **AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1924.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.2624.00 | **FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | | |
| | 010.000.1954.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |

201

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| G03.1 Meningitis crónica<br>G03.2 Meningitis recurrente benigna [Mollaret]<br>G03.8 Meningitis debidas a otras causas especificadas<br>G03.9 Meningitis, no especificada<br>G04.0 Encefalitis aguda diseminada<br>G04.1 Mielopatía asociada al virus linfotrópico de células T humanas<br>G04.2 Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte<br>G04.8 Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis<br>G04.9 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no especificadas<br>G05.0 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte<br>G05.1 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades virales | 010.000.1955.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |
| | 010.000.5292.00 | **MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |

201

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| clasificadas en otra parte<br><br>G05.2 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte<br><br>G05.8 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>03.31 Punción espinal | 010.000.4251.00 | **VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ámpula. | | |

201

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **201.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS | **201.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS | **201.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS | | |

202

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>H70.0 Mastoiditis aguda<br>H70.1 Mastoiditis crónica<br>H70.2 Petrositis<br>H70.8 Otras mastoiditis y afecciones relacionadas<br>H70.9 Mastoiditis, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br>20.01 Miringotomía con inserción de tubo<br>20.09 Otra miringotomía<br>20.41 Mastoidectomía simple<br>20.42 Mastoidectomía radical<br>20.49 Otra Mastoidectomía<br>20.1X Extracción de tubo de miringotomía | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | GPC-IMSS-521-11-EyR<br>GPC-ISSSTE-638-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Cultivo de líquidos biológicos<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Tomografía axial computarizada de cráneo |
| | 010.000.1969.01 | **AZITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4259.00 | **CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.2132.00 | **CLARITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |

202

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

202

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **202.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE MASTOIDITIS | **202.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE MASTOIDITIS | **202.3** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE MASTOIDITIS | | |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

203

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>M86.0 Osteomielitis hematógena aguda<br>M86.1 Otras osteomielitis agudas<br>M86.2 Osteomielitis subaguda<br>M86.3 Osteomielitis multifocal crónica<br>M86.4 Osteomielitis crónica con drenaje del seno<br>M86.5 Otras osteomielitis hematógenas crónicas<br>M86.6 Otras osteomielitis crónicas<br>M86.8 Otras osteomielitis<br>M86.9 Osteomielitis, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>77.00 Secuestrectomía, sitio no especificado<br>77.01 Secuestrectomía, escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]<br>77.02 Secuestrectomía, húmero<br>77.03 Secuestrectomía, radio y cúbito<br>77.04 Secuestrectomía, carpianos y metacarpianos<br>77.05 Secuestrectomía, fémur<br>77.06 Secuestrectomía, rótula<br>77.07 Secuestrectomía, tibia y peroné<br>77.08 Secuestrectomía, | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-SSA-111-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Cultivo de líquidos biológicos<br><br>Hemocultivo<br><br>Mielocultivo<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía de sitio afectado |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1923.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1921.00 | **BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5284.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.01 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |

203

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| tarsianos y metatarsianos 77.09 Secuestrectomía, otro 86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura 84.10 Amputación de miembro inferior, no especificado de otra manera | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

203

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **203.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE OSTEOMIELITIS | **203.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE OSTEOMIELITIS | **203.5** CUIDADOS INTENSIVOS DE OSTEOMIELITIS | **203.4** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OSTEOMIELITIS | **203.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

204

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>J12.0 Neumonía debida a adenovirus<br>J12.1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio<br>J12.2 Neumonía debida a virus parainfluenza<br>J12.3 Neumonía debida a metaneumovirus humano<br>J12.8 Neumonía debida a otros virus<br>J12.9 Neumonía viral, no especificada<br>J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae<br>J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae<br>J15.0 Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae<br>J15.1 Neumonía debida a pseudomonas<br>J15.2 Neumonía debida a estafilococos<br>J15.3 Neumonía debida a estreptococos del grupo B<br>J15.4 Neumonía debida a otros estreptococos<br>J15.5 Neumonía debida a Escherichia coli<br>J15.6 Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas<br>J15.7 Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae<br>J15.8 Otras neumonías bacterianas<br>J15.9 Neumonía bacteriana, no especificada<br>J16.0 Neumonía debida a clamidias | 010.000.2462.00 | **AMBROXOL COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos. | GPC-IMSS-624-13-EyR<br><br>GPC-S-120-08-EyR<br><br>GPC-SSA-098-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar<br><br>Cultivo de expectoración<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Flujometría<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2463.00 | **AMBROXOL SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1938.00 | **BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | | |
| | 010.000.1923.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1924.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2510.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente. | | |
| | 010.000.1921.00 | **BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente. | | |

204

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| J16.8 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados<br>J17.0 Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte<br>J17.1 Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte<br>J17.2 Neumonía en micosis<br>J17.3 Neumonía en enfermedades parasitarias<br>J17.8 Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte<br>J18.0 Bronconeumonía, no especificada<br>J18.1 Neumonía lobar, no especificada<br>J18.2 Neumonía hipostática, no especificada<br>J18.8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado<br>J18.9 Neumonía, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>87.49 Otras radiografías torácicas<br>89.37 Determinación de capacidad vital<br>89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5284.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2132.00 | **CLARITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.4300.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |

204

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0431.00 | **SALBUTAMOL JARABE** | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0429.00 | **SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | | |
| | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |

204

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **204.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS | **204.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS | **204.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS | | **204.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS |

205

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>J12.0 Neumonía debida a adenovirus<br>J12.1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio<br>J12.2 Neumonía debida a virus parainfluenza<br>J12.3 Neumonía debida a metaneumovirus humano<br>J12.8 Neumonía debida a otros virus<br>J12.9 Neumonía viral, no especificada<br>J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae<br>J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae<br>J15.0 Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae<br>J15.1 Neumonía debida a pseudomonas<br>J15.2 Neumonía debida a estafilococos<br>J15.3 Neumonía debida a estreptococos del grupo B<br>J15.4 Neumonía debida a otros estreptococos<br>J15.5 Neumonía debida a Escherichia coli<br>J15.6 Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas<br>J15.7 Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae<br>J15.8 Otras neumonías bacterianas<br>J15.9 Neumonía bacteriana, no especificada<br>J16.0 Neumonía debida a | 010.000.2462.00 | **AMBROXOL COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos. | GPC-IMSS-234-09-EyR<br><br>GPC-IMSS-624-13-EyR<br><br>GPC-SSA-098-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar<br><br>Cultivo de expectoración<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Flujometría<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2463.00 | **AMBROXOL SOLUCIÓN** | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.2130.00 | **AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1938.00 | **BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | | |
| | 010.000.1923.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1924.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2510.00 | **BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente. | | |
| | 010.000.1921.00 | **BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente. | | |

205

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| clamidias<br>J16.8 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados<br>J17.0 Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte<br>J17.1 Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte<br>J17.2 Neumonía en micosis<br>J17.3 Neumonía en enfermedades parasitarias<br>J17.8 Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte<br>J18.0 Bronconeumonía, no especificada<br>J18.1 Neumonía lobar, no especificada<br>J18.2 Neumonía hipostática, no especificada<br>J18.8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado<br>J18.9 Neumonía, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>89.37 Determinación de capacidad vital<br>89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas<br>87.49 Otras radiografías torácicas | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5284.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.01 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2132.00 | **CLARITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |

205

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4249.00 | **LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.4300.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0431.00 | **SALBUTAMOL JARABE** | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0429.00 | **SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | | |
| | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |

205

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **205.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE NEUMONÍA EN ADULTOS | **205.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE NEUMONÍA EN ADULTOS | **205.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE NEUMONÍA EN ADULTOS | | **205.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS |

206

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>A06.4 Absceso amebiano del hígado<br><br>**CIE-9-MC**<br>50.0X Hepatotomía<br>50.91 Aspiración percutánea de hígado<br>88.02 Otras tomografías de abdomen<br>88.76 Ultrasonografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo<br>92.02 Gammagrafía y estudio isotópico funcional del hígado | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-282-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Pruebas de función hepática<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Tiempos y pruebas de coagulación<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)<br>Ultrasonido de hígado y vías biliares |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5284.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.01 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

206

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

206

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **206.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO | **206.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO | **206.4** CUIDADOS INTENSIVOS DEL ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO | | **206.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO |

207

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N70.0 Salpingitis y ooforitis aguda<br>N70.1 Salpingitis y ooforitis crónica<br>N70.9 Salpingitis y ooforitis, no especificadas<br>N71.0 Enfermedad inflamatoria aguda del útero<br>N71.1 Enfermedad inflamatoria crónica del útero<br>N71.9 Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada<br>N72X Enfermedad inflamatoria del cuello uterino<br>N73.0 Parametritis y celulitis pélvica aguda<br>N73.1 Parametritis y celulitis pélvica crónica<br>N73.2 Parametriritis y celulitis pélvica no espeficificada<br>N73.8 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas<br>N73.9 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada<br>N74.0 Infección tuberculosa del cuello del útero<br>N74.1 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por tuberculosis<br>N74.2 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por sífilis<br>N74.3 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por gonococos | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-072-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-039-SSA2-2002 | Biometría hemática completa<br><br>Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal<br><br>Examen general de orina<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5295.01 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1954.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |

207

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| N74.4 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por clamidias<br>N74.8 Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en otras enfermedades clasificadas en otra parte<br>N75.0 Quiste de la glándula de Bartholin<br>N75.1 Absceso de la glándula de Bartholin<br>N75.8 Otras enfermedades de la glándula de Bartholin<br>N75.9 Enfermedad de la glándula de Bartholin, no especificada<br>N77.0 Ulceración de la vulva en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte<br>N77.1 Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte<br>N77.8 Ulceración e inflamación vulvovaginal en otras enfermedades clasificadas en otra parte<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>88.76 Ultrasonografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo<br>89.26 Examen ginecológico | 010.000.1955.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.4300.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

207

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **207.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA | **207.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA | **207.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA | | **207.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA |

208

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>N73.3 Peritonitis pélvica aguda, femenina<br>N73.4 Peritonitis, pélvica crónica femenina<br>N73.5 Peritonitis pélvica femenina no específica<br>N73.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas<br>**CIE-9-MC**<br>K65.0 Peritonitis aguda | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-272-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Hemocultivo<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |

208

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

208

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **208.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PELVIPERITONITIS | **208.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PELVIPERITONITIS | **208.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE PELVIPERITONITIS | | **208.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS |

209

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>N20.0 Cálculo del riñón<br>N20.1 Cálculo del uréter<br>N20.2 Cálculo del riñón con cálculo del uréter<br>N20.9 Cálculo urinario, no especificado<br>**CIE-9-MC**<br>55.03 Nefrostomía percutánea sin fragmentación<br>55.04 Nefrostomía percutánea con fragmentación<br>56.2X Ureterotomía<br>56.31 Ureteroscopía<br>58.0X Uretrotomía<br>58.6X Dilatación de uretra<br>98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-635-13-EyR<br>GPC-SS-215-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Proteína C Reactiva<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Urocultivo<br>Cistoscopia<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Urografía excretora<br>Ultrasonido renal y vesical<br>Tomografía renal contrastada |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0561.00 | **CLORTALIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2301.00 | **HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

209

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

209

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **209.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LITIASIS RENAL Y URETERAL | **209.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL | | **209.4** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL | **209.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

210

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>N21.0 Cálculo en la vejiga<br>N21.1 Cálculo en la uretra<br>N21.8 Otros cálculos de las vías urinarias inferiores<br>N21.9 Cálculo de las vías urinarias inferiores, no especificado<br>**CIE-9-MC**<br>58.6X Dilatación de uretra<br>98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-635-13-EyR<br>GPC-SS-215-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Examen general de orina<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Urocultivo<br>Cistoscopia<br>Radiografía 2 proyecciones<br>Urografía excretora<br>Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)<br>Ultrasonido renal y vesical |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0561.00 | **CLORTALIDONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2301.00 | **HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

210

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1903.00 | **TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA** | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | | |

210

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **210.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES | **210.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES | | **210.4** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES | **210.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

211

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N44X Torsión del testículo<br><br>N45.0 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso<br><br>N45.9 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>63.52 Reducción de torsión de testículo o cordón espermático<br><br>62.5X Orquidopexia | 010.000.1969.01 | **AZITROMICINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | GPC-IMSS-039-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-229-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico<br><br>Ultrasonido Doppler |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1941.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |

211

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

211

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **211.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO | **211.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO | | **211.3** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO | |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

212

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>R33X Retención de orina<br>**CIE-9-MC**<br>00.H8 Instalación de sonda vesical<br>00.H9 Retiro de sonda vesical<br>57.94 Inserción de catéter urinario permanente<br>57.17 Cistostomía percutánea<br>58.6X Dilatación de uretra<br>97.63 Extracción de tubo de cistostomía | SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS | | | GPC-IMSS-559-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |

212

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **212.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA | **212.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA | | | **212.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA |

213

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N41.0 Prostatitis aguda | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | GPC-SS-683-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Cultivo de líquidos biológicos<br><br>Examen general de orina<br><br>Ultrasonido transrectal |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1941.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4299.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.4300.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.5309.00 | **TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas. | | |
| | 010.000.5309.01 | **TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.5309.02 | **TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |

213

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA

# COBERTURA

## URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **213.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PROSTATITIS AGUDA | **213.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PROSTATITIS AGUDA | | | **213.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA |

214

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores<br><br>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada<br><br>J44.8 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas<br><br>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>87.41 Tomografía axial computarizada del tórax<br><br>87.49 Otras radiografías torácicas<br><br>89.37 Determinación de capacidad vital | 010.000.2262.00 | **BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador. | GPC-IMSS-037-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Electrocardiograma<br><br>Espirometría<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.2263.00 | **BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto). | | |
| | 010.000.0477.00 | **DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg. | | |
| | 010.000.2508.00 | **DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg. | | |
| | 010.000.5980.00 | **FLUTICASONA, VILANTEROL POLVO PARA INHALACIÓN** | Cada dosis contiene: Furoato de fluticasona 100 µg. Vilanterol trifenatato equivalente a 25 µg de vilanterol. Envase con dispositivo inhalador con 30 dosis. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2307.00 | **FUROSEMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.6021.00 | **INDACATEROL/GLICOPIRRONIO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Maleato de Indacaterol equivalente a 110 µg de indacaterol. Bromuro de Glicopirronio equivalente a 50 µg de Glicopirronio. Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles), y un dispositivo para inhalación. | | |
| | 010.000.2162.00 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2162.01 | **IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol. | | |
| | 010.000.2190.01 | **IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN** | Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis). | | |
| | C840600018 | **OXÍGENO DOMICILIARIO** | NA | | |
| | 010.000.0472.00 | **PREDNISONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

214

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0431.00 | **SALBUTAMOL JARABE** | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | | |
| | 010.000.0439.00 | **SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR** | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | | |
| | 010.000.0429.00 | **SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | | |
| | 010.000.0443.00 | **SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL** | Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 µg de salmeterol. Propionato de fluticasona 50 µg. Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis. | | |
| | 010.000.0437.00 | **TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada. | | |
| | 010.000.0438.00 | **TERBUTALINA POLVO** | Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis. | | |
| | 010.000.0432.00 | **TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas. | | |
| | 010.000.0433.00 | **TERBUTALINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

214

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **214.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | **214.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | **214.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | | **214.4** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA |

215

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>E10.4 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones neurológicas<br><br>E11.4 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones neurológicas<br><br>E12.4 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones neurológicas<br><br>E13.4 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas<br><br>E14.4 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurológicas<br><br>G59.0 Mononeuropatía diabética<br><br>G63.2 Polineuropatía diabética | 040.000.3305.00 | **AMITRIPTILINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-SS-349-09-EyR<br><br>GPC-SSA-010-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-015-SSA2-2010<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 040.000.2154.00 | **CARBAMAZEPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2608.00 | **CARBAMAZEPINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2714.00 | **COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA** | Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4485.00 | **DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA** | Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada. | | |
| | 010.000.4359.00 | **GABAPENTINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.4356.01 | **PREGABALINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas. | | |
| | 010.000.5395.00 | **TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula. | | |

215

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **215.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES | | | | **215.2** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES |

216

## TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>E10.5 Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas<br><br>E11.5 Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas<br><br>E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas<br><br>E13.5 Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas<br><br>E14.5 Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>00.23 Imagen intravascular de vasos periféricos<br><br>86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura<br><br>54.11 Laparotomía exploradora<br><br>54.21 Laparoscopía | 010.000.0101.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-ISSSTE-679-13-EyR<br><br>GPC-SS-005-08-EyR<br><br>GPC-SS-349-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-015-SSA2-2010<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Cultivo de líquidos biológicos<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1940.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.1941.00 | **DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |

216

## TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 54.25 Lavado peritoneal<br><br>41.43 Esplenectomía parcial<br><br>41.5X Esplenectomía total | 010.000.4300.00 | **LEVOFLOXACINO TABLETA** | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | | |
| | 010.000.0264.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%** | Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual. | | |
| | 010.000.0262.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.4290.00 | **LINEZOLID TABLETA** | Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.5292.00 | **MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4261.00 | **OFLOXACINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas. | | |
| | 010.000.4261.01 | **OFLOXACINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas. | | |
| | 010.000.4261.02 | **OFLOXACINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

216

## TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4592.00 | **PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ámpula. | | |
| | 060.435.0041 | **PIRFENIDONA GEL** | Cada 100g de gel contiene: Pirfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 40 gramos. | | |
| | 060.435.0033 | **PIRFENIDONA GEL** | Cada 100g de gel contiene: Pirfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 120 gramos. | | |
| | 010.000.4251.00 | **VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ámpula. | | |

216

# TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

## COBERTURA

### URGENCIAS

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **216.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS | **216.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS | | **216.4** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS | **216.2** TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

**217**

## LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br><br>54.11 Laparotomía exploradora<br>54.21 Laparoscopía<br>54.25 Lavado peritoneal | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdominal completo |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |

217

## LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |

**217**

## LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

217

# LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **217.2** INDICACIÓN DE LAPAROTOMÍA EXPLORADORA EN URGENCIAS | **217.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A LAPAROTOMÍA EXPLORADORA | **217.5** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES A LA LAPAROTOMÍA EXPLORADORA | **217.1** LAPAROTOMÍA EXPLORADORA | **217.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A LAPAROTOMÍA EXPLORADORA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

218

## ESPLENECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br><br>41.43 Esplenectomía parcial<br>41.5X Esplenectomía total | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-SSA-301-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada abdominal<br><br>Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)<br><br>Ultrasonido abdominal superior |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |

218

## ESPLENECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0476.00 | **METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. De diluyente. | | |
| | 010.000.3433.00 | **METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

218

## ESPLENECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4592.00 | **PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ámpula. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

218

**ESPLENECTOMÍA**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **218.2** INDICACIÓN DE ESPLENECTOMÍA EN URGENCIAS | **218.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A ESPLENECTOMÍA | **218.5** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES POSTERIOR A ESPLENECTOMÍA | **218.1** ESPLENECTOMÍA | **218.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESPLENECTOMÍA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

219

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>K57.0 Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso<br>K57.1 Enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforación ni absceso<br>K57.2 Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso<br>K57.3 Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso<br>K57.4 Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso<br>K57.5 Enfermedad diverticular de ambos intestinos, sin perforación ni absceso<br>K57.8 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso<br>K57.9 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso<br><br>**CIE-9-MC**<br>45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado<br>45.62 Otra resección parcial de intestino delgado<br>45.63 Resección total de intestino delgado<br>45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso<br>45.72 Cecectomía abierta y otra | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-SSA-212-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Colon por enema<br><br>Endoscopía / Colonoscopía larga<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC) |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4259.00 | **CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |

219

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| cecectomía<br>45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha<br>45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda<br>45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía<br>45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso<br>45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia<br>45.7B Ciegotomía laparoscópica<br>45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopía<br>45.7D Resección de colon transverso por laparoscopía<br>45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopía<br>45.7F Sigmoidectomía por laparoscopía<br>45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopía<br>45.82 Colectomía intraabdominal total abierta<br>45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada<br>45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera<br>45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado<br>45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal<br>45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso<br>45.94 Anastomosis de intestino | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1271.00 | **PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO** | Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g. | | |
| | 010.000.1270.00 | **SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 ml. | | |
| | 010.000.1272.00 | **SENÓSIDOS A Y B TABLETA** | Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

219

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| grueso a intestino grueso<br>45.95 Anastomosis al ano<br>46.10 Colostomía, no especificada de otra manera<br>46.11 Colostomía temporal<br>46.13 Colostomía permanente<br>46.14 Apertura retardada de colostomía<br>46.21 Ileostomía temporal<br>46.22 Ileostomía continente<br>46.23 Otra ileostomía permanente<br>46.24 Apertura retardada de ileostomía<br>45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso | | | | | |

219

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **219.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR | **219.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR | **219.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR | **219.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR | **219.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

220

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>K55.0 Trastorno vascular agudo de los intestinos<br>K55.1 Trastorno vascular crónico del intestino<br>K55.2 Angiodisplasia del colon<br>K55.8 Otros trastornos vasculares del intestino<br>K55.9 Trastorno vascular del intestino, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado<br>45.62 Otra resección parcial de intestino delgado<br>45.63 Resección total de intestino delgado<br>45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso<br>45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía<br>45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha<br>45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso<br><br>45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda<br>45.76 Sigmoidectomía abierta y otra | 010.000.0624.01 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-ISSSTE-358-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempo de coagulación, INR<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC) |
| | 010.000.0624.00 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4259.00 | **CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

220

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| sigmoidectomía<br>45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso<br>45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia<br>45.7B Ciegotomía laparoscópica<br>45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopía<br>45.7D Resección de colon transverso por laparoscopía<br>45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopía<br>45.7F Sigmoidectomía por laparoscopía<br>45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopía<br>45.81 Colectomía intraabdominal total laparoscópica<br>45.82 Colectomía intraabdominal total abierta<br>45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada<br>45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera<br>45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado<br>45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal<br>45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso<br>45.94 Anastomosis de | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1951.00 | **KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

220

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| intestino grueso a intestino grueso<br>45.95 Anastomosis al ano<br>46.10 Colostomía, no especificada de otra manera<br>46.11 Colostomía temporal<br>46.13 Colostomía permanente<br>46.14 Apertura retardada de colostomía<br>46.21 Ileostomía temporal<br>46.22 Ileostomía continente<br>46.23 Otra ileostomía permanente<br>46.24 Apertura retardada de ileostomía<br>54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales<br>54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4592.00 | **PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ámpula. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0623.00 | **WARFARINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas. | | |

220

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **220.2** DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL | **220.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL | **220.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL | **220.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL | **220.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

221

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K56.0 Íleo paralítico<br>K56.1 Invaginación<br>K56.3 Íleo por cálculo biliar<br>K56.4 Otras obstrucciones del intestino<br>K56.5 Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción<br>K56.6 Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas<br>K56.7 Íleo, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado<br>45.62 Otra resección parcial de intestino delgado<br>45.63 Resección total de intestino delgado<br>45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso<br>45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía<br>45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha<br>45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso<br><br>45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda<br>45.76 Sigmoidectomía | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-ISSSTE-359-12-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Radiografía 2 proyecciones) |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.1951.00 | **KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

221

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| abierta y otra sigmoidectomía<br>45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso<br>45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia<br>45.7B Ciegotomía laparoscópica<br>45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopía<br>45.7D Resección de colon transverso por laparoscopía<br>45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopía<br>45.7F Sigmoidectomía por laparoscopía<br>45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopía<br>45.81 Colectomía intraabdominal total laparoscópica<br>45.82 Colectomía intraabdominal total abierta<br>45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada<br>45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera<br>45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado<br>45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal<br>45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

221

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso<br>45.95 Anastomosis al ano<br>46.10 Colostomía, no especificada de otra manera<br>46.11 Colostomía temporal<br>46.13 Colostomía permanente<br>46.14 Apertura retardada de colostomía<br>46.21 Ileostomía temporal<br>46.22 Ileostomía continente<br>46.23 Otra ileostomía permanente<br>46.24 Apertura retardada de ileostomía<br>54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales<br>54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales | | | | | |

221

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **221.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO | **221.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO | **221.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO | **221.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO | **221.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

222

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K25.1 Úlcera gástrica, aguda con perforación<br>K25.5 Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con perforación<br>K26.1 Úlcera duodenal, aguda con perforación<br>K26.5 Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con perforación<br>K27.1 Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación<br>K27.5 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con perforación<br>K28.1 Úlcera gastroyeyunal, aguda con perforación<br>K28.5 Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con perforación<br>K63.1 perforación del intestino (no traumática)<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>45.50 Aislamiento de segmento intestinal, no especificado de otra manera<br>45.51 Aislamiento de segmento de intestino delgado<br>45.52 Aislamiento de segmento de intestino grueso<br>45.62 Otra resección parcial de intestino delgado<br>45.63 Resección total de intestino delgado | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdominal completo |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |

222

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso<br>45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía<br>45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha<br>45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso<br>45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda<br>45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía<br>45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso<br>45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia<br>45.7B Ciegotomía laparoscópica<br>45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopía<br>45.7D Resección de colon transverso por laparoscopía<br>45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopía<br>45.7F Sigmoidectomía por laparoscopía<br>45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopía<br>45.81 Colectomía intraabdominal total laparoscópica | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1951.00 | **KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5187.00 | **OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 010.000.5176.00 | **SUCRALFATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas. | | |

**222**

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 45.82 Colectomía intraabdominal total abierta<br>45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada<br>45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera<br>45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado<br>45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal<br>45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso<br>45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso<br>45.95 Anastomosis al ano<br>46.11 Colostomía temporal<br>46.21 Ileostomía temporal<br>54.11 Laparotomía exploradora<br>54.25 Lavado peritoneal | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

222

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **222.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL | **222.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL | **222.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL | **222.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL | **222.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

223

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K56.2 Vólvulo<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>45.62 Otra resección parcial de intestino delgado<br>45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso<br>45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía<br>45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha<br>45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso<br><br>45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda<br>45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía<br>45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso<br>45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia<br>45.7B Ciegotomía laparoscópica<br>45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopía<br>45.7D Resección de colon transverso por laparoscopía<br>45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopía | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-169-09-EyR<br>GPC-ISSSTE-549-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Electrolitos séricos completos<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Endoscopía / Colonoscopía larga<br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.1951.00 | **KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |

223

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 45.7F Sigmoidectomía por laparoscopía<br>45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopía<br>45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera<br>45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado<br>45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal<br>45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso<br>45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso<br>45.95 Anastomosis al ano<br>46.80 Manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera<br>46.81 Manipulación intraabdominal de intestino delgado<br>46.82 Manipulación intraabdominal de intestino grueso<br>46.85 Dilatación del intestino | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1271.00 | **PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO** | Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 010.000.1270.00 | **SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 ml. | | |
| | 010.000.1272.00 | **SENÓSIDOS A Y B TABLETA** | Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

223

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **223.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE VÓLVULO | **223.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VÓLVULO | **223.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VÓLVULO | **223.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VÓLVULO | **223.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL VÓLVULO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

224

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K61.0 Absceso anal<br>K61.1 Absceso rectal<br>K61.2 Absceso anorrectal<br>K61.3 Absceso isquiorrectal<br>K61.4 Absceso intraesfinteriano<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>49.01 Incisión de absceso perianal | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-SSA-209-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2107.00 | **EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de efedrina 50 mg. Envase con 100 ampolletas con 2 ml. (25 mg/ml). | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

224

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

224

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **224.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE ABSCESO PERIRRECTAL | **224.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ABSCESO PERIRRECTAL | | **224.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ABSCESO PERIRRECTAL | **224.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ABSCESO PERIRRECTAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

225

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K60.0 Fisura anal aguda<br>K60.1 Fisura anal crónica<br>K60.2 Fisura anal, no especificada<br>K60.3 Fístula anal<br>K60.4 Fístula rectal<br>K60.5 Fístula anorrectal<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>48.73 Cierre de otra fístula rectal<br>48.93 Reparación de fístula perirrectal (perirrectofistulectomía)<br>49.02 Otra incisión de tejido perianal<br>49.11 Fistulotomía anal<br>49.12 Fistulectomía anal<br>49.51 Esfinterotomía anal lateral izquierda<br>49.52 Esfinterotomía anal posterior<br>49.59 Otra esfinterotomía anal<br>49.73 Cierre de fistula anal | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-ISSSTE-663-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.2135.00 | **FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Fluconazol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml (2 mg/ml). | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

225

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.2099.00 | **MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

225

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

225

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **225.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL | **225.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL | | **225.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL | **225.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

226

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K64.0 Hemorroides de primer grado<br>K64.1 Hemorroides de segundo grado<br>K64.2 Hemorroides de tercer grado<br>K64.3 Hemorroides de cuarto grado<br>K64.8 Hemorroides no especificadas<br>K64.9 Hemorroides sin otra especificación<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>49.41 Reducción de hemorroides<br>49.42 Inyección (esclerosis) de hemorroides<br>49.43 Cauterización de hemorroides<br>49.44 Destrucción de hemorroides por crioterapia<br>49.45 Ligamento de hemorroides<br>49.46 Extirpación de hemorroides<br>49.47 Evacuación de hemorroides trombosadas<br>49.49 Otros procedimientos sobre hemorroides | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | GPC-SSA-200-09-EyR<br>GPC-SSA-213-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1364.00 | **LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de hidrocortisona 5 mg. Óxido de zinc 400 mg. Subacetato de aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios. | | |
| | 010.000.1363.00 | **LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA UNGÜENTO** | Cada 100 g contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de aluminio 3.50 g. Óxido de zinc 18 g. Envase con 20 g y aplicador. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

226

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1271.00 | **PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO** | Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g. | | |
| | 010.000.1270.00 | **SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 ml. | | |
| | 010.000.1272.00 | **SENÓSIDOS A Y B TABLETA** | Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

226

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **226.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL | **226.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL (HEMORROIDECTOMÍA) | | **226.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL (HEMORROIDECTOMÍA) | **226.4** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

227

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K44.0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena<br>K44.9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>44.66 Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagicogástrica<br>53.71 Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, abordaje abdominal<br>53.72 Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal<br>53.75 Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal, no especificada de otra manera<br>53.80 Reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, no especificada de otra manera<br>53.81 Plicatura de diafragma<br>53.82 Reparación de hernia parasternal (Morgagni)<br>53.83 Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con abordaje torácico<br>53.84 Reparación abierta y otra reparación de hernia | 010.000.1224.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml y dosificador. | GPC-SS-003-08-EyR<br>GPC-SSA-208-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Endoscopía sin toma de biopsia<br><br>Serie esofagogastroduodenal (SEGD) |
| | 010.000.1223.00 | **ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE** | Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables. | | |
| | 010.000.1263.00 | **BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.5187.00 | **OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5186.00 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5186.01 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5186.02 | **PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA** | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |

227

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| diafragmática, abordaje torácico | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |

227

**DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **227.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA HIATAL | | **227.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA HIATAL | **227.2** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HERNIA HIATAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

228

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Q40.0 Estenosis hipertrófica congénita del píloro<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>44.21 Dilatación de píloro mediante incisión<br>44.22 Dilatación endoscópica de píloro<br>44.29 Otra píloroplastía | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | GPC-SS-452-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Electrolitos séricos completos<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Serie esofagogastroduodenal (SEGD)<br><br>Ultrasonido abdominal superior |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |

228

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **228.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO | **228.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO | **228.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO | **228.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO | **228.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

229

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K41.0 Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin gangrena<br>K41.1 Hernia femoral bilateral, con gangrena<br>K41.2 Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni gangrena<br>K41.3 Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena<br>K41.4 Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena<br>K41.9 Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>53.21 Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis<br>53.29 Otra herniorrafia de hernia crural unilateral<br>53.31 Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis<br>53.39 Otra herniorrafia crural bilateral | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-IMSS-330-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido Inguinal |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

229

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **229.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA CRURAL | **229.4** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA CORRECCIÓN DE HERNIA CRURAL | | **229.1** PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA CORRECCIÓN DE HERNIA CRURAL (INCLUYE MALLA) | **229.3** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE HERNIA CRURAL |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

230

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K40.0 Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena<br>K40.1 Hernia inguinal bilateral, con gangrena<br>K40.2 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena<br>K40.3 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena<br>K40.4 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena<br>K40.9 Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera<br>53.01 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa<br>53.02 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta<br>53.03 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis<br>53.04 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis<br>53.05 Reparación de hernia con injerto o prótesis no especificada de otra manera<br>53.10 Reparación bilateral de hernia inguinal, no | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-SS-015-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido Inguinal |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

230

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| especificada de otra manera<br>53.11 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa<br>53.12 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta<br>53.13 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta<br>53.14 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis<br>53.15 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis<br>53.16 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y una indirecta con injerto o prótesis<br>53.17 Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera | | | | | |

230

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **230.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA INGUINAL | **230.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL | | **230.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL (INCLUYE MALLA) | **230.4** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE HERNIA INGUINAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

231

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K42.0 Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena<br>K42.1 Hernia umbilical con gangrena<br>K42.9 Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>53.41 Reparación abierta y otra reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis<br>53.42 Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis<br>53.43 Otra reparación laparoscópica de hernia umbilical<br>53.49 Otra herniorrafia umbilical abierta | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-SS-015-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido abdominal completo |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.5943.00 | **IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 100 ml contienen: Ibuprofeno 2 g. Envase con 120 ml y medida dosificadora. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

231

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **231.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA UMBILICAL | **231.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL | | **231.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL | **231.4** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE HERNIA UMBILICAL |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MALLA

232

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K43.0 Hernia incisional con obstrucción, sin gangrena<br>K43.1 Hernia incisional con gangrena<br>K43.2 Hernia incisional sin obstrucción o gangrena<br>K43.3 Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena<br>K43.4 Hernia paraestomal con gangrena<br>K43.5 Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena<br>K43.6 Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena<br>K43.7 Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena<br>K43.9 Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>53.51 Reparación de hernia incisional (eventración)<br>53.59 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior<br>53.61 Otra reparación abierta de hernia incisional con injerto o prótesis<br>53.69 Reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | GPC-IMSS-068-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido abdominal completo |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

232

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **232.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA VENTRAL | **232.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL | **232.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE HERNIA VENTRAL | **232.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL | **232.5** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE HERNIA VENTRAL |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
INCLUYE MALLA

233

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>K80.0 Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda<br>K80.1 Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis<br>K80.2 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis<br>K80.3 Cálculo de conducto biliar con colangitis<br>K80.4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis<br>K80.5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis<br>K80.8 Otras colelitiasis<br>K81.0 Colecistitis aguda<br>K81.1 Colecistitis crónica<br>K81.8 Otras colecistitis<br>K81.9 Colecistitis, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>51.10 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE]<br>51.11 Colangiografía retrógrada endoscópica [CRE]<br>51.22 Colecistectomía abierta<br>51.23 Colecistectomía laparoscópica<br>51.41 Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo<br>51.42 Exploración del conducto biliar principal para | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-SSA-211-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Pruebas de función hepática<br><br>Colangiopancreatografía retrógada endoscópica<br><br>Colangiografía transoperatoria<br><br>Ultrasonido de hígado y vías biliares |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |

233

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| alivio de otra obstrucción<br>51.43 Inserción de tubo coledocohepático para descompresión<br>51.49 Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción<br>51.51 Exploración de colédoco<br>51.59 Incisión de otro conducto biliar | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1241.00 | **METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1242.00 | **METOCLOPRAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.1233.00 | **RANITIDINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

233

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

233

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **233.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS | **233.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS | **233.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS | **233.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS | **233.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

234

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>A63.0 Verrugas venéreas anogenitales<br>K13.2 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua<br>K13.3 Leucoplasia pilosa<br>K13.4 Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal<br>K13.5 Fibrosis de la submucosa bucal<br>K13.6 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>27.49 Otra excisión de boca<br>49.39 Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido del ano<br>64.2X Excisión local o destrucción de lesión de pene.<br>67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía<br>67.39 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino<br>70.33 Excisión o destrucción de lesión de vagina<br>71.9X Otras operaciones sobre órganos genitales femeninos | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-IMSS-237-09-EyR<br>GPC-IMSS-710-14-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.0901.00 | **PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA** | Cada ml contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml. | | |

234

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **234.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS | | **234.1** TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS | **234.3** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CONDILOMAS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

235

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>E28.2 Síndrome de ovario poliquístico<br>N83.0 Quiste folicular del ovario<br>N83.1 Quiste del cuerpo amarillo<br>N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>65.01 Ooforotomía laparoscópica<br>65.09 Otra ooforotomía<br>65.21 Marsupialización de quiste ovárico<br>65.22 Resección en cuña de ovario<br>65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico<br>65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario<br>65.25 Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario<br>65.29 Otra excisión local o destrucción local de ovario<br>65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica<br>65.39 Otra ooforectomía unilateral<br>65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio<br>65.52 Otra extirpación de ovario restante<br>65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-ISSSTE-658-13-EyR<br>GPC-ISSSTE-660-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Perfil hormonal<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1511.00 | **CIPROTERONA-ETINILESTRADIOL GRAGEA** | Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 21 grageas. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2156.00 | **ESPIRONOLACTONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5165.00 | **METFORMINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

235

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

235

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **235.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE QUISTES DE OVARIO | **235.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTES DE OVARIO | | **235.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTES DE OVARIO | **235.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE QUISTES DE OVARIO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

236

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N83.5 Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>65.01 Ooforotomía laparoscópica<br>65.09 Otra ooforotomía<br>65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica<br>65.39 Otra ooforectomía unilateral<br>65.41 Salpingooforectomía unilateral laparoscópica<br>65.49 Otra salpingooforectomía unilateral<br>65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio<br>65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio<br>65.52 Otra extirpación de ovario restante<br>65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio<br>65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante<br>65.61 Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio<br>65.62 Otra extirpación de ovario y trompa restantes<br>65.63 Extirpación laparoscópica | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | GPC-SSA-293-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

236

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio<br>65.64 Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes<br>65.95 Liberación de torsión de ovario<br>66.01 Salpingotomía<br>66.02 Salpingostomía<br>66.4X Salpingectomía unilateral total | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

236

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **236.2** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE TORSIÓN DE ANEXOS | **236.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TORSIÓN DE ANEXOS | | **236.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TORSIÓN DE ANEXOS | **236.4** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE TORSIÓN DE ANEXOS |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

**237**

## MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Z30.2 Esterilización<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>66.31 Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio<br>66.32 Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio<br>66.39 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | NOM-004-SSA3-2012 | Fracción beta de gonadotropina coriónica humana |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

237

# MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **237.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL | | **237.1** OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL | **237.3** MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL) |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

238

## MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Z30.2 Esterilización<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>63.70 Procedimiento de esterilización masculina, no especificado de otra manera<br>63.71 Ligadura de conducto deferente<br>63.72 Ligadura de cordón espermático<br>63.73 Vasectomía sin bisturí | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-SS-756-15-EyR<br>GPC-SSA-347-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-005-SSA2-1993 | Espermatobioscopía |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

238

## MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | **238.1** VASECTOMÍA | **238.2** MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA) |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

239

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O01.0 Mola hidatiforme clásica<br>O01.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial<br>O01.9 Mola hidatiforme, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>68.23 Ablación endometrial (incluye ablación endometrial histeroscópica, dilatación y legrado)<br>69.59 Otro legrado por aspiración del útero<br>69.01 Dilatación y legrado para terminación del embarazo<br>69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto<br>69.09 Otra dilatación y legrado | 010.000.2152.00 | **ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | GPC-SS-756-15-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-005-SSA2-1993 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Biometría hemática completa<br><br>Fracción beta de gonadotropina coriónica humana<br><br>Pruebas de función renal<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.5233.00 | **ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 12 tabletas. | | |
| | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.4429.00 | **DACTINOMICINA SOLUCIÓN** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1776.00 | **METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ámpula. | | |

239

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **239.2** DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA | **239.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA | | **239.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA | **239.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

239

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1759.00 | **METOTREXATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas | | |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | | | | | |

240

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O00.0 Embarazo abdominal<br>O00.1 Embarazo tubárico<br>O00.2 Embarazo ovárico<br>O00.8 Otros embarazos ectópicos<br>O00.9 Embarazo ectópico, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica<br>65.39 Otra ooforectomía unilateral<br>65.41 Salpingooforectomía unilateral laparoscópica<br>66.4X Salpingectomía unilateral total<br>65.49 Otra salpingooforectomía unilateral | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SS-228-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Fracción beta de gonadotropina coriónica humana<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico<br><br>Ultrasonido transvaginal |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1776.00 | **METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1759.00 | **METOTREXATO TABLETA** | Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |

240

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

240

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **240.2** DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO | **240.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO | **240.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO | **240.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO | **240.5** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

241

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>O02.1 Aborto retenido<br>O03.0 Aborto espontáneo incompleto, complicado con infección genital y pelviana<br>O03.1 Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O03.2 Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia<br>O03.3 Aborto espontáneo incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O03.4 Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones<br>O03.5 Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana<br>O03.6 Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O03.7 Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por embolia<br>O03.8 Aborto espontáneo, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O03.9 Aborto espontáneo, completo o no especificado, sin complicación<br>O04.0 Aborto médico incompleto, complicado con infección genital y pelviana<br>O04.1 Aborto médico incompleto, complicado por hemorragia | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-182-09-EyR<br>GPC-ISSSTE-681-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993 | Fracción beta de gonadotropina coriónica humana<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico<br><br>Ultrasonido transvaginal |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1541.00 | **CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolleta. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.1591.00 | **INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |

241

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| excesiva o tardía<br>O04.2 Aborto médico incompleto, complicado por embolia<br>O04.3 Aborto médico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O04.4 Aborto médico incompleto, sin complicaciones<br>O04.5 Aborto médico, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana<br>O04.6 Aborto médico, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O04.7 Aborto médico, completo o no especificado, complicado por embolia<br>O04.8 Aborto médico, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O04.9 Aborto médico, completo o no especificado, sin complicación<br>O05.0 Otro aborto incompleto, complicado con infección genital y pelviana<br>O05.1 Otro aborto incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O05.2 Otro aborto incompleto, complicado por embolia<br>O05.3 Otro aborto incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O05.4 Otro aborto incompleto, sin complicaciones<br>O05.5 Otro aborto, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana<br>O05.6 Otro aborto, completo o no | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

241

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O05.7 Otro aborto, completo o no especificado, complicado por embolia<br>O05.8 Otro aborto, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O05.9 Otro aborto, completo o no especificado, sin complicación<br>O06.0 Aborto no especificado incompleto, complicado con infección genital y pelviana<br>O06.1 Aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O06.2 Aborto no especificado incompleto, complicado por embolia<br>O06.3 Aborto no especificado incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O06.4 Aborto no especificado incompleto, sin complicaciones<br>O06.5 Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana<br>O06.6 Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía<br>O06.7 Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por embolia<br>O06.8 Aborto no especificado, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas<br>O06.9 Aborto no especificado, | | | | | |

241

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| completo o no especificado, sin complicación<br>**CIE-9-MC**<br>69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto<br>69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto | | | | | |

241

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **241.2** DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DEL ABORTO INCOMPLETO | **241.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABORTO INCOMPLETO | | **241.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABORTO INCOMPLETO | **241.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

242

## REPARACIÓN UTERINA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O71.0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto<br>O71.1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto<br>S37.6 Traumatismo del útero<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>69.41 Sutura de desgarro del útero<br>75.50 Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado de otra manera<br>75.51 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino<br>75.52 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-088-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

242

**REPARACIÓN UTERINA**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **242.2** DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DE RUPTURA UTERINA | **242.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE RUPTURA UTERINA | **242.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE RUPTURA UTERINA | **242.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE RUPTURA UTERINA | **242.5** SEGUIMIENTO POSTERIOR A REPARACIÓN UTERINA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

243

## ABLACIÓN ENDOMETRIAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N85.0 Hiperplasia de glándula del endometrio<br>N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>68.16 Biopsia cerrada de útero<br>68.23 Ablación endometrial (incluye ablación endometrial histeroscópica, dilatación y legrado) | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SSA-296-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Ultrasonido transvaginal |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

243

# ABLACIÓN ENDOMETRIAL

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **243.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A LA ABLACIÓN ENDOMETRIAL | | **243.1** ABLACIÓN ENDOMETRIAL | **243.3** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON ABLACIÓN ENDOMETRIAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

244

## TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N80.0 Endometriosis del útero<br>N80.1 Endometriosis del ovario<br>N80.2 Endometriosis de la trompa de Falopio<br>N80.3 Endometriosis del peritoneo pélvico<br>N80.4 Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina<br>N80.5 Endometriosis del intestino<br>N80.6 Endometriosis en cicatriz cutánea<br>N80.8 Otras endometriosis<br>N80.9 Endometriosis, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>54.21 Laparoscopía<br>66.15 Biopsia cerrada de ligamentos uterinos<br>68.16 Biopsia cerrada de útero<br>54.21 Laparoscopía | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-322-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido transvaginal<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

244

# TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **244.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS | | **244.1** TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS | **244.3** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENDOMETRIOSIS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

245

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>D25.0 Leiomioma submucoso del útero<br>D25.1 Leiomioma intramural del útero<br>D25.2 Leiomioma subseroso del útero<br>D25.9 Leiomioma del útero, sin otra especificación<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>68.29 Otra excisión o destrucción del útero (miomectomía uterina)<br>68.31 Histerectomía supra cervical laparoscópica [HSL]<br>68.39 Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada<br>68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica<br>68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada<br>68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)<br>68.59 Otra histerectomía vaginal y la no especificada<br>68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica (HRVL)<br>68.79 Otra histerectomía radical vaginal y la no especificada | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SS-207-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3045.00 | **MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

245

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

245

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **245.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA MIOMATOSIS UTERINA | | **245.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA MIOMATOSIS UTERINA | **245.3** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE MIOMATOSIS UTERINA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

246

## HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N81.0 Uretrocele femenino<br>N81.1 Cistocele<br>N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto<br>N81.3 Prolapso uterovaginal completo<br>N81.4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificación<br>N81.5 Enterocele vaginal<br>N81.6 Rectocele<br>N81.8 Otros prolapsos genitales femeninos<br>N81.9 Prolapso genital femenino, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>70.50 Reparación de cistocele y rectocele<br>70.51 Reparación de cistocele (colporrafia anterior)<br>70.52 Reparación de rectocele (colporrafia posterior)<br>70.79 Otra reparación de vagina | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-082-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido abdomino - pélvico<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

246

## HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **246.2** ADMISIÓN EN URGENCIAS PARA HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL | **246.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL | | **246.1** HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL | **246.4** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE PATOLOGÍAS QUE REQUIERAN HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

247

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N47X Prepucio redundante, fimosis y parafimosis<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>64.0X Circuncisión | 010.000.5256.00 | CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | GPC-SSA-295-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.4028.00 | CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 060.602.0303 | MALLAS PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA | Malla para la corrección de incontinencia urinaria femenina, vía vaginal, abdominal o transobturador. Incluye: Introductor, con empuñadura y guía rígida; cinta de polipropileno cubierta, con dos agujas en sus extremos o con puntas adecuadas al dispositivo introductor. Estéril y desechable. Envase. | | |
| | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL TABLETA | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

247

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA)

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **247.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A COLPOPERINEOPLASTÍA | | **247.1** COLPOPERINEOPLASTÍA | **247.3** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE PROLAPSO GENITAL FEMENINO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

248

## CIRCUNCISIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Q53.0 Ectopia testicular<br>Q53.1 Testículo no descendido, unilateral<br>Q53.2 Testículo no descendido, bilateral<br>Q53.9 Testículo no descendido, sin otra especificación<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>62.5X Orquidopexia | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | GPC-IMSS-263-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

248

# CIRCUNCISIÓN

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **248.3** MANEJO EN URGENCIAS DE COMPLICACIONES DE LA CIRCUNCISIÓN | **248.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A CIRCUNCISIÓN | | **248.1** CIRCUNCISIÓN | **248.4** SEGUIMIENTO POSTERIOR A CIRCUNCISIÓN |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

249

## ORQUIDOPEXIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br>62.5X Orquidopexia | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SSA-289-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

249

**ORQUIDOPEXIA**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **249.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A ORQUIDOPEXIA | | **249.1** ORQUIDOPEXIA | **249.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ORQUIDOPEXIA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

250

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>N40X Hiperplasia de próstata<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>60.29 Otra prostatectomía transuretral (resección transuretral de próstata)<br>60.61 Excisión local de lesión de próstata<br>60.69 Otra prostatectomía<br>60.5X Prostatectomía radical | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-SSA-157-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-034-SSA2-2013 | Antígeno prostático libre (APL)<br><br>Antígeno prostático específico (APE)<br><br>Cistoscopia<br><br>Ultrasonido de próstata suprapúbico<br><br>Ultrasonido transrectal para próstata con toma de biopsia<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4255.00 | **CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4259.00 | **CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.5319.00 | **DUTASTERIDA CÁPSULAS** | Cada cápsula contiene: Dutasterida de 0.5 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.4302.00 | **FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA** | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

250

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.5309.00 | **TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas. | | |
| | 010.000.5309.01 | **TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.5309.02 | **TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

250

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **250.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | | **250.2** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | **250.1** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

251

## EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>C44.0 Tumor maligno de la piel del labio<br>C44.1 Tumor maligno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral<br>C44.2 Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo<br>C44.3 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara<br>C44.4 Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello<br>C44.5 Tumor maligno de la piel del tronco<br>C44.6 Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro<br>C44.7 Tumor maligno de la piel miembro inferior, incluida la cadera<br>C44.8 Lesión de sitios contiguos de la piel<br>C44.9 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>86.11 Biopsia de piel y tejido subcutáneo<br>86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal<br>86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura<br>86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña<br>86.24 Quimiocirugía de piel<br>86.25 Abrasión dérmica<br>86.26 Ligadura de apéndice dérmico<br>86.27 Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña<br>86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura<br>86.3X Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo<br>86.4X Extirpación radical de lesión cutánea | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-IMSS-176-09-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

251

# EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **251.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA) | | **251.1** EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA) | **251.2** DIAGNÓSTICO DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA) |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

252

## EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>D17.0 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello<br>D17.1 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco<br>D17.2 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros<br>D17.3 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados<br>D18.0 Hemangioma, de cualquier sitio<br>D21.0 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello<br>D21.1 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro superior, incluido el hombro<br>D21.2 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro inferior, incluida la cadera<br>D21.3 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del tórax<br>D21.4 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del abdomen<br>D21.5 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos de la pelvis<br>D21.6 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del tronco, sin otra especificación<br>D21.9 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado<br>D22.0 Nevo melanocítico del labio<br>D22.1 Nevo melanocítico del párpado, incluida la comisura palpebral<br>D22.2 Nevo melanocítico de la | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-IMSS-360-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

252

## EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| oreja y del conducto auditivo externo<br>D22.3 Nevo melanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara<br>D22.4 Nevo melanocítico del cuero cabelludo y del cuello<br>D22.5 Nevo melanocítico del tronco<br>D22.6 Nevo melanocítico del miembro superior, incluido el hombro<br>D22.7 Nevo melanocítico del miembro inferior, incluida la cadera<br>D22.9 Nevo melanocítico, sitio no especificado<br>D23.0 Tumor benigno de la piel del labio<br>D23.1 Tumor benigno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral<br>D23.2 Tumor benigno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo<br>D23.3 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara<br>D23.4 Tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello<br>D23.5 Tumor benigno de la piel del tronco<br>D23.6 Tumor benigno de la piel del miembro superior, incluido el hombro<br>D23.7 Tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera<br>D23.9 Tumor benigno de la piel, sitio no especificado<br>L05.0 Quiste pilonidal con absceso<br>L05.9 Quiste pilonidal sin absceso<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal<br>86.22 Desbridamiento excisional | | | | | |

252

## EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de herida, infección o quemadura<br>86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña<br>86.24 Quimiocirugía de piel<br>86.25 Abrasión dérmica<br>86.26 Ligadura de apéndice dérmico<br>86.27 Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña<br>86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura<br>86.3X Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo<br>86.4X Extirpación radical de lesión cutánea<br>86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios<br>86.99 Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo | | | | | |

252

# EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **252.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS | | **252.1** EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS | **252.3** EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

253

## AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>J35.0 Amigdalitis crónica<br>J35.1 Hipertrofia de las amígdalas<br>J35.2 Hipertrofia de las adenoides<br>J35.3 Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las adenoides<br>J35.8 Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides<br>J35.9 Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides, no especificada<br>J36X Absceso periamigdalino<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>28.0X Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas<br>28.2X Amigdalectomía sin adenoidectomía<br>28.3X Amigdalectomía con adenoidectomía<br>28.4X Extirpación de resto amigdalino<br>28.6X Adenoidectomía sin amigdalectomía<br>28.7X Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía<br>28.91 Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión<br>28.92 Excisión de lesión de amígdala y adenoides<br>28.99 Otras operaciones sobre amígdala y adenoides | 010.000.1925.00 | **BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | GPC-ISSSTE-550-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Cultivo de líquidos biológicos |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

253

## AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

253

# AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **253.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA | | **253.1** AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA | **253.3** DIAGNÓSTICO EN CONSULTA DE AMIGDALITIS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

254

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>B97.7 Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos<br>D10.5 Tumor benigno de otras partes de la orofaringe<br>D10.6 Tumor benigno de la nasofaringe<br>D10.7 Tumor benigno de la hipofaringe<br>D10.9 Tumor benigno de la faringe, parte no especificada<br>D14.1 Tumor benigno de la laringe<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>29.33 Faringectomía (parcial)<br>29.39 Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe<br>29.99 Otras operaciones sobre faringe<br>30.09 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | GPC-IMSS-326-10-EyR<br>GPC-IMSS-361-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biopsia y estudio histopatológico<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

254

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **254.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO) | | **254.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO) | **254.3** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO) |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

255

# REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>Q35.0 Fisura del paladar duro, bilateral<br>Q35.1 Fisura del paladar duro<br>Q35.2 Fisura del paladar blando, bilateral<br>Q35.3 Fisura del paladar blando<br>Q35.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral<br>Q35.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando<br>Q35.6 Fisura del paladar, línea media<br>Q35.7 Fisura de la úvula<br>Q35.8 Fisura del paladar, bilateral sin otra especificación<br>Q35.9 Fisura del paladar, sin otra especificación<br>Q36.0 Labio leporino, bilateral<br>Q36.1 Labio leporino, línea media<br>Q36.9 Labio leporino, unilateral<br>Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral<br>Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral<br>Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral<br>Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral<br>Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral<br>Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral<br>Q37.8 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación<br>Q37.9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | GPC-IMSS-557-12-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Ortopantografía<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

255

## REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br>27.54 Reparación de labio fisurado<br>27.59 Otra reparación plástica de la boca<br>27.62 Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia) (L)<br>27.63 Revisión de reparación de paladar fisurado<br>27.69 Otra reparación plástica de paladar | | | | | |

255

# REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **255.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO | | **255.1** REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO | **255.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

256

## CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>H49.0 Parálisis del nervio motor ocular común [III par]<br>H49.1 Parálisis del nervio patético [IV par]<br>H49.2 Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]<br>H49.3 Oftalmoplejía total (externa)<br>H49.4 Oftalmoplejía externa progresiva<br>H49.8 Otros estrabismos paralíticos<br>H49.9 Estrabismo paralítico, no especificado<br>H50.0 Estrabismo concomitante convergente<br>H50.1 Estrabismo concomitante divergente<br>H50.2 Estrabismo vertical<br>H50.3 Heterotropía intermitente<br>H50.4 Otras heterotropías o las no especificadas<br>H50.5 Heteroforia<br>H50.6 Estrabismo mecánico<br>H50.8 Otros estrabismos especificados<br>H50.9 Estrabismo, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>15.11 Recesión de un músculo extraocular<br>15.12 Avance de músculo extraocular<br>15.13 Resección de un músculo extraocular<br>15.19 Otras operaciones sobre un | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-017-SSA2-2012<br>NOM-034-SSA2-2013 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2822.00 | **CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g. | | |
| | 010.000.2175.00 | **CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA** | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2841.00 | **PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2185.00 | **PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g. | | |
| | 010.000.4407.00 | **TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2189.00 | **TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |

256

## CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular<br>15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos<br>15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos<br>15.5X Transposición de músculos extraoculares<br>15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular<br>15.22 Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular<br>15.29 Otra operación sobre un músculo extraocular | | | | | |

256

# CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **256.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO | | **256.1** CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO | **256.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

257

# CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>H49.0 Parálisis del nervio motor ocular común [III par]<br>H49.1 Parálisis del nervio patético [IV par]<br>H49.2 Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]<br>H49.3 Oftalmoplejía total (externa)<br>H49.4 Oftalmoplejía externa progresiva<br>H49.8 Otros estrabismos paralíticos<br>H49.9 Estrabismo paralítico, no especificado<br>H50.0 Estrabismo concomitante convergente<br>H50.1 Estrabismo concomitante divergente<br>H50.2 Estrabismo vertical<br>H50.3 Heterotropía intermitente<br>H50.4 Otras heterotropías o las no especificadas<br>H50.5 Heteroforia<br>H50.6 Estrabismo mecánico<br>H50.8 Otros estrabismos especificados<br>H50.9 Estrabismo, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>15.11 Recesión de un músculo extraocular<br>15.12 Avance de músculo extraocular<br>15.13 Resección de un músculo extraocular<br>15.19 Otras operaciones sobre un músculo extraocular con | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | GPC-IMSS-277-10-EyR<br>GPC-ISSSTE-127-08-EyR<br>GPC-ISSSTE-128-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-034-SSA2-2013 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2822.00 | **CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g. | | |
| | 010.000.2175.00 | **CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA** | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.2841.00 | **PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2185.00 | **PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g. | | |
| | 010.000.4407.00 | **TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2189.00 | **TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |

**257**

## CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| desprendimiento temporal del globo ocular<br>15.21 Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular<br>15.29 Otra operación sobre un músculo extraocular<br>15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos<br>15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos<br>15.5X Transposición de músculos extraoculares<br>15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular | | | | | |

257

# CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **257.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO | | **257.1** CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO | **257.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

258

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>H40.0 Sospecha de glaucoma<br>H40.1 Glaucoma primario de ángulo abierto<br>H40.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado<br>H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular<br>H40.4 Glaucoma secundario a inflamación ocular<br>H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo<br>H40.6 Glaucoma secundario a drogas<br>H40.8 Otros glaucomas<br>H40.9 Glaucoma, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br>12.11 Iridotomía con transfixión<br>12.12 Otra iridotomía<br>12.13 Excisión de iris prolapsado<br>12.14 Otra iridectomía<br>12.54 Trabeculotomía desde el exterior | 010.000.2302.00 | **ACETAZOLAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-277-10-EyR<br>GPC-ISSSTE-127-08-EyR<br>GPC-ISSSTE-128-08-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-034-SSA2-2013 | Tonometría ocular |
| | 010.000.2872.00 | **ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2873.00 | **ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g. | | |
| | 010.000.4420.00 | **BRIMONIDINA – TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2822.00 | **CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g. | | |
| | 010.000.2175.00 | **CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA** | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.2851.00 | **PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%** | Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2852.00 | **PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 4%** | Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.4407.00 | **TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2858.00 | **TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2189.00 | **TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.4418.00 | **TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Travoprost 40 µg. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml. | | |

258

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **258.3** DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS DE GLAUCOMA | **258.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA | | **258.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA | **258.4** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

259

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>H11.0 Pterigión<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>11.31 Transposición de pterigión<br>11.32 Excisión de pterigión con injerto corneal<br>11.39 Otra excisión de pterigión | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | GPC-IMSS-163-09-EyR<br><br>GPC-IMSS-164-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Sin auxiliar |
| | 010.000.2804.00 | **NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2823.00 | **NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2841.00 | **PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.4407.00 | **TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | | |

259

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | **259.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN | **259.2** SEGUIMIENTO POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

260

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>G91.0 Hidrocéfalo comunicante<br>G91.1 Hidrocéfalo obstructivo<br>G91.2 Hidrocéfalo de presión normal<br>G91.3 Hidrocéfalo postraumático, sin otra especificación<br>G91.8 Otros tipos de hidrocéfalo<br>G91.9 Hidrocéfalo, no especificado<br>Q03.0 Malformaciones del acueducto de Silvio<br>Q03.1 Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka<br>Q03.8 Otros hidrocéfalos congénitos<br>Q03.9 Hidrocéfalo congénito, no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales<br>02.41 Irrigación y exploración de derivación ventricular<br>02.42 Sustitución de derivación ventricular<br>02.43 Extracción de derivación ventricular<br>54.95 Incisión de peritoneo | 010.000.2303.00 | **ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | GPC-IMSS-260-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Perfil TORCH<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo<br><br>Ultrasonido transfontanelar |
| | 010.000.2302.00 | **ACETAZOLAMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 040.000.2107.00 | **EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de efedrina 50 mg. Envase con 100 ampolletas con 2 ml. (25 mg/ml). | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |

260

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 060.932.2599 | **VÁLVULAS** | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza. | | |
| | 060.932.2797 | **VÁLVULAS** | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Pieza. | | |
| | 060.932.6681 | **VÁLVULAS** | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Adulto. | | |
| | | | | | |

260

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **260.2** MANEJO EN URGENCIAS POR HIDROCEFALIA | **260.3** HOSPITALIZACIÓN POR HIDROCEFALIA | **260.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA | **260.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA (INCLUYE VÁLVULA DE DERIVACIÓN) | **260.5** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HIDROCEFALIA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

261

# COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br><br>38.91 Cateterismo arterial<br>38.92 Cateterismo de vena umbilical<br>38.93 Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto<br>38.95 Cateterización venosa para diálisis renal<br>59.8X Cateterismo ureteral<br>97.15 Sustitución de catéter de herida<br>97.62 Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral<br>97.63 Extracción de tubo de cistostomía<br>97.64 Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario (extracción de catéter urinario permanente) | -SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS- | | | GPC-IMSS-248-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-034-SSA2-2013 | Sin auxiliar |

261

# COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **261.2** COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES EN URGENCIAS | | | **261.1** COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES EN QUIRÓFANO | |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

262

## DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br>40.41 Disección radical de cuello, unilateral<br><br>40.42 Disección radical de cuello, bilateral | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Estudio histopatológico de pieza quirúrgica |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 040.000.4026.00 | **BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml. | | |
| | 040.000.2100.00 | **BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2100.01 | **BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL** | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

262

## DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | | | | | |

262

## DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **262.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO | | **262.1** DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO | **262.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

263

## TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-9-MC**<br><br>34.01 Incisión de pared torácica.<br>34.02 Toracotomía exploratoria.<br>34.03 Reapertura a través de toracotomía reciente.<br>34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje.<br>34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal.<br>34.06 Drenaje de cavidad pleural por toracoscopía<br>34.09 Otra incisión de pleura.<br>34.0A Sello de agua.<br>97.41 Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | GPC-SS-450-11-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Cultivo de líquidos biológicos<br><br>Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

263

# TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **263.1** TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX EN URGENCIAS | | | **263.2** TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX EN QUIRÓFANO | |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

264

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Q65.0 Luxación congénita de la cadera, unilateral<br>Q65.1 Luxación congénita de la cadera, bilateral<br>Q65.2 Luxación congénita de la cadera, no especificada<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>77.25 Osteotomía en cuña, fémur<br>79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera<br>79.85 Reducción abierta de luxación de cadera | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | GPC-IMSS-243-09-EyR<br><br>GPC-SSA-451-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |

264

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **264.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA | | **264.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA | **264.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

265

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Q66.0 Talipes equinovarus<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>83.11 Tenotomía de Aquiles<br>93.51 Aplicación de vendaje enyesado | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | GPC-S-091-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0105.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.00 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | | |
| | 010.000.0514.01 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | | |
| | 010.000.0514.02 | **PARACETAMOL SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

265

# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **265.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS | | **265.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS | **265.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

266

## SAFENECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>I87.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>38.59 Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | GPC-SSA-288-10-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-034-SSA2-2013 | Flebografía bilateral<br><br>Ultrasonido doppler periférico (venoso) |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0622.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.4222.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4223.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml. | | |
| | 010.000.2155.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml. | | |

266

## SAFENECTOMÍA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2155.01 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml. | | |
| | 010.000.4221.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

266

**SAFENECTOMÍA**

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **266.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A SAFENECTOMÍA | | **266.1** SAFENECTOMÍA | **266.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A SAFENECTOMÍA |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

267

# ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral<br>M17.1 Otras gonartrosis primarias<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)<br>00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial<br>00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral<br>00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano<br>00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial<br>81.54 Sustitución total de rodilla<br>81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte | 010.000.5731.00 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas. | GPC-IMSS-175-09-EyR<br><br>GPC-IMSS-716-14-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones<br><br>Resonancia magnética en regiones |
| | 010.000.5731.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5732.01 | **APIXABÁN TABLETA** | Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas. | | |
| | 010.000.5551.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.5551.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.00 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas. | | |
| | 010.000.5552.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |

267

## ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.5544.00 | **RIVAROXABAN COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 10 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

267

# ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **267.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA | | **267.1** ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA (INCLUYE PRÓTESIS DE RODILLA) | **267.3** SEGUIMIENTO POSTERIOR A ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA |

INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

268

# AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>E10.5 Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas<br>E11.5 Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas<br>E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas<br>E13.5 Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas<br>E14.5 Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>84.10 Amputación de miembro inferior, no especificado de otra manera<br>84.11 Amputación de dedo de pie<br>84.12 Amputación a través de pie<br>84.13 Desarticulación de tobillo<br>84.14 Amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y peroné<br>84.15 Otra amputación debajo de la rodilla<br>84.16 Desarticulación de rodilla<br>84.17 Amputación por encima | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-079-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-435-12-EyR<br><br>GPC-SSA-053-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Angiografía de Extremidades<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido Doppler periférico (arterial)<br><br>Ultrasonido doppler periférico (venoso) |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | | |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0622.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |

268

## AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| de la rodilla<br>84.18 Desarticulación de cadera | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.4290.00 | **LINEZOLID TABLETA** | Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.5292.00 | **MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1310.00 | **METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.4222.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4223.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml. | | |
| | 010.000.2155.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml. | | |

268

## AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2155.01 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml. | | |
| | 010.000.4221.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 010.000.4592.00 | **PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ámpula. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.4251.00 | **VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ámpula. | | |

268

# AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **268.2** DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DEL PIE DIABÉTICO | **268.3** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR A LA AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO | **268.4** CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | **268.1** AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO | **268.5** SEGUIMIENTO POSTERIOR A AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

269

## TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>M66.0 Ruptura de quiste sinovial poplíteo<br>M66.1 Ruptura de la sinovia<br>M67.4 Ganglión<br>M71.2 Quiste sinovial del hueco poplíteo (de Baker)<br>M71.3 Otros quistes de la bolsa serosa<br>M71.4 Depósito de calcio en la bolsa serosa<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>80.71 Sinovectomía, hombro<br>80.72 Sinovectomía, codo<br>80.73 Sinovectomía, muñeca<br>80.74 Sinovectomía, mano y dedos de la mano<br>80.75 Sinovectomía, cadera<br>80.76 Sinovectomía, rodilla<br>80.77 Sinovectomía, tobillo<br>80.78 Sinovectomía, pie y dedos del pie<br>83.39 Excisión de lesión de otro tejido blando<br>80.70 Sinovectomía, sitio no especificado<br>80.79 Sinovectomía, otros sitios especificados | 010.000.3417.00 | **DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | GPC-DIF-257-09-EyR<br><br>GPC-ISSSTE-679-13-EyR<br><br>GPC-SS-005-08-EyR<br><br>GPC-SS-349-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Radiografía 2 proyecciones |
| | 010.000.5501.00 | **DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1927.00 | **DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.2504.00 | **KETOPROFENO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.3419.00 | **NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL** | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.3407.00 | **NAPROXENO TABLETA** | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |

269

## TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

269

# TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

## COBERTURA

### CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **269.2** HOSPITALIZACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN | | **269.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN | **269.3** TRATAMIENTO CONSERVADOR DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

270

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>H25.0 Catarata senil incipiente<br>H25.1 Catarata senil nuclear<br>H25.2 Catarata senil, tipo morgagnian<br>H25.8 Otras cataratas seniles<br>H25.9 Catarata senil, no especificada<br>H26.0 Catarata infantil, juvenil y presenil<br>H26.1 Catarata traumática<br>H26.2 Catarata complicada<br>H26.3 Catarata inducida por drogas<br>H26.4 Catarata residual<br>H26.8 Otras formas especificadas de catarata<br>H26.9 Catarata, no especificada<br>H28.0 Catarata diabética<br>H28.1 Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas clasificadas en otra parte<br>H28.2 Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte<br>H28.8 Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte<br><br>**CIE-9-MC**<br>13.2X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal<br>13.3X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)<br>13.41 Facoemulsificación y aspiración de catarata | 010.000.2172.00 | **ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | NOM-004-SSA3-2012 | Cálculo de lente intraocular<br><br>Ecografía ocular modo A y B<br><br>Microscopia especular del endotelio corneal<br><br>Queratometría<br><br>Tonometría ocular<br><br>Valoración de segmento anterior y posterior |
| | 010.000.2872.00 | **ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2822.00 | **CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO** | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g. | | |
| | 010.000.2175.00 | **CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA** | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |
| | 010.000.2899.00 | **CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada g o ml contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2814.00 | **HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 05%** | Cada ml contiene: Hipromelosa 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.2893.00 | **HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%** | Cada ml contiene: Hipromelosa 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | | |
| | 010.000.4407.00 | **TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | | |
| | 010.000.2189.00 | **TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | | |

270

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| 13.42 Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior<br>13.43 Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata<br>13.71 Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa<br>13.64 Disección de membrana secundaria [después de catarata]<br>13.65 Excisión de membrana secundaria [después de catarata]<br>13.66 Fragmentación mecánica de membrana secundaria [después de catarata]<br>13.69 Otra extracción de catarata<br>13.11 Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior<br>13.19 Otra extracción intracapsular de cristalino<br>13.2X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal<br>13.51 Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior<br>13.59 Otra extracción extracapsular de cristalino | | | | | |

270

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

# COBERTURA

## CIRUGÍA GENERAL

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | **270.1** TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS (INCLUYE LENTE INTRAOCULAR) | **270.2** SEGUIMIENTO POR TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS |

**INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA**

271

# DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Z32.0 Embarazo (aún) no confirmado<br>Z32.1 Embarazo confirmado<br>Z34.0 Supervisión de primer embarazo normal<br>Z34.8 Supervisión de otros embarazos normales<br>Z34.9 Supervisión de embarazo normal no especificado<br>Z35.0 Supervisión de embarazo con historia de esterilidad<br>Z35.1 Supervisión de embarazo con historia de aborto<br>Z35.2 Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva<br>Z35.3 Supervisión de embarazo con historia de insuficiente atención prenatal<br>Z35.4 Supervisión de embarazo con gran multiparidad<br>Z35.5 Supervisión de primigesta añosa<br>Z35.6 Supervisión de primigesta muy joven<br>Z35.7 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales<br>Z35.8 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo<br>Z35.9 Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin | 010.000.1711.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas. | GPC-IMSS-192-08-EyR<br><br>GPC-ISSSTE-125-08-EyR<br><br>GPC-ISSSTE-126-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Coombs indirecto<br><br>ELISA para VIH<br><br>Examen general de orina<br><br>Fracción beta de gonadotropina coriónica humana<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Perfil TORCH<br><br>Prueba rápida de embarazo en orina<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>VDRL<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.4376.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA** | Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.0 a 5.0 mg. Nicotinamida (niacinamida) 10.0 a 100.0 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.0 a 5.0 µg. Acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3.0 a 20.0 mg. Retinol (vitamina A) 2000.0 a 10000.0 UI. Colecalciferol (vitamina D3) 200.0 a 1000.0 UI. Acido pantoténico 2.0 a 7.0 mg. Sulfato ferroso 15.0 a 60.0 mg. Sulfato de cobre 1.0 a 4.0 mg. Yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4.0 mg. Glicerofosfato, sulfato o hiposulfito de magnesio 1.0 a 8.00 mg. Fosfato de magnesio 5.0 a 133.0 mg. Cloruro, fosfato o sulfato de zinc 3.0 a 25.0 mg. Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas. | | |
| | 020.000.3810.00 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis). | | |
| | 020.000.3808.00 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml. | | |
| | 020.000.3808.01 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml. | | |
| | 020.000.3808.02 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 ml. | | |

271

## DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| otra especificación | 020.000.3808.03 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 5 frascos ámpula con una dosis de 0.5 ml | | |
| | 020.000.3810.01 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml). | | |
| | 010.000.1711.00 | **ÁCIDO FÓLICO TABLETA** | Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas. | | |
| | 010.000.4376.00 | **MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA** | Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.0 a 5.0 mg. Nicotinamida (niacinamida) 10.0 a 100.0 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.0 a 5.0 µg. Acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3.0 a 20.0 mg. Retinol (vitamina A) 2000.0 a 10000.0 UI. Colecalciferol (vitamina D3) 200.0 a 1000.0 UI. Acido pantoténico 2.0 a 7.0 mg. Sulfato ferroso 15.0 a 60.0 mg. Sulfato de cobre 1.0 a 4.0 mg. Yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4.0 mg. Glicerofosfato, sulfato o hiposulfito de magnesio 1.0 a 8.00 mg. Fosfato de magnesio 5.0 a 133.0 mg. Cloruro, fosfato o sulfato de zinc 3.0 a 25.0 mg. Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas. | | |
| | 020.000.3810.00 | **TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis). | | |
| | 020.000.3808.00 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg | | |

271

# DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | | **ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml. | | |
| | 020.000.3808.01 | **VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE** | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml. | | |

271

## DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

# COBERTURA

## OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **271.1** DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL |

272

# ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>O80.0 Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice<br>O80.1 Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica<br>O80.8 Parto único espontáneo, otras presentaciones<br>O80.9 Parto único espontáneo, sin otra especificación<br>O83.0 Extracción de nalgas<br>O83.1 Otros partos únicos asistidos, de nalgas<br>O83.2 Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica<br>O83.3 Parto de feto viable en embarazo abdominal<br>O83.4 Operación destructiva para facilitar el parto<br>O83.8 Otros partos únicos asistidos especificados<br>O83.9 Parto único asistido, sin otra especificación<br>O84.0 Parto múltiple, todos espontáneos<br>Z39.0 Atención y examen inmediatamente después del parto<br>Z39.1 Atención y examen de madre en periodo de lactancia<br>Z39.2 Seguimiento postparto, de rutina<br>**CIE-9-MC**<br>73.51 Rotación manual de la cabeza de feto<br>73.59 Otro parto asistido manualmente<br>73.6X Episiotomía | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | GPC-IMSS-028-08-EyR<br>GPC-IMSS-580-12-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br>Coombs directo<br>Coombs indirecto<br>Examen general de orina<br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br>Pruebas cruzadas<br>Química sanguínea de 5 elementos<br>Tiempos y pruebas de coagulación<br>Registro tococardiográfico |
| | 010.000.1591.00 | **INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta. | | |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |

272

# ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **272.2** MANEJO EN URGENCIAS DEL TRABAJO DE PARTO | **272.3** HOSPITALIZACIÓN DURANTE EL PUERPERIO FISIOLÓGICO | | | **272.1** ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO |

273

# ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O82.0 Parto por cesárea electiva<br>O82.1 Parto por cesárea de emergencia<br>O82.2 Parto por cesárea con histerectomía<br>O82.8 Otros partos únicos por cesárea<br>O82.9 Parto por cesárea, sin otra especificación<br>O84.2 Parto múltiple, todos por cesárea<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>74.0X Cesárea clásica<br>74.1X Cesárea clásica baja | 010.000.1206.00 | **BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA** | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | GPC-IMSS-052-08-EyR<br><br>GPC-SS-753-15-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1541.00 | **CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolleta. | | |
| | 010.000.5256.00 | **CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1971.00 | **ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA** | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | | |
| | 010.000.4036.00 | **ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | | |
| | 010.000.1591.00 | **INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta. | | |
| | 010.000.3422.00 | **KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |

273

## ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.0106.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL** | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2106.00 | **TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.2096.00 | **TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | | |

273

## ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

# COBERTURA

## OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **273.2** MANEJO EN URGENCIAS DEL TRABAJO DE PARTO | **273.4** HOSPITALIZACIÓN DURANTE EL PUERPERIO QUIRÚRGICO | | **273.3** CESÁREA | **273.1** ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO |

274

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>O20.0 Amenaza de aborto | 010.000.3412.00 | **INDOMETACINA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios. | GPC-IMSS-048-08-EyR<br>GPC-IMSS-605-13-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br>Examen general de orina<br>Fracción beta de gonadotropina coriónica humana<br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Tiempos y pruebas de coagulación<br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.3412.01 | **INDOMETACINA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios. | | |
| | 010.000.4217.00 | **PROGESTERONA PERLAS** | Cada perla contiene: Progesterona de 200 mg. Envase con 14 perlas. | | |

274

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **274.2** MANEJO EN URGENCIAS DE AMENAZA DE ABORTO | **274.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LA AMENAZA DE ABORTO | | | **274.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO |

275

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.3412.00 | **INDOMETACINA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios. | | |
| | 010.000.3412.01 | **INDOMETACINA SUPOSITORIO** | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios. | | |
| | 010.000.1551.00 | **ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.1552.00 | **ORCIPRENALINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0432.00 | **TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ml contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas. | | |

275

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **275.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE AMENAZA DE PARTO | **275.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PARTO PRETÉRMINO | | | **275.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO |

276

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O85X Sepsis puerperal | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-063-08-EyR<br><br>GPC-SSA-118-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |

276

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

276

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **276.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ENDOMETRITIS PUERPERAL | **276.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL | **276.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE ENDOMETRITIS PUERPERAL | | **276.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL |

277

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O86.4 Pirexia de origen desconocido consecutiva al parto<br>O86.8 Otras infecciones puerperales especificadas<br>O85X Sepsis puerperal<br>R57.2 Choque séptico<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>68.31 Histerectomía supra cervical laparoscópica [HSL]<br>68.39 Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada<br>68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica<br>68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada<br>69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto<br>69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-IMSS-272-10-EyR<br><br>GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Ácido láctico sérico<br><br>Biometría hemática completa<br><br>Calcitonina<br><br>Depuración de creatinina<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Hemocultivo<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Urocultivo<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC) |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.5295.00 | **CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.4254.00 | **CEFTAZIDIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ámpula y 3 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |

277

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | Ultrasonido abdomino – pélvico abdominal contrastada (TAC)<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico<br>Urocultivo |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 010.000.1954.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1955.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.0474.00 | **HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.5265.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.5287.00 | **IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | | |
| | 010.000.5292.00 | **MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula. | | |

277

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.5720.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.5721.00 | **PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | | |
| | 010.000.4592.00 | **PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ámpula. | | |
| | 010.000.1234.00 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1234.01 | **RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 mL. | | |
| | 010.000.5255.00 | **TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | | |
| | 010.000.4251.00 | **VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ámpula. | | |

277

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **277.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL | **277.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL | **277.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL | | **277.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL |

278

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio<br><br>O10.1 Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio<br><br>O10.9 Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio<br><br>O13X Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]<br><br>O99.4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-IMSS-058-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Electrocardiograma<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.2307.00 | **FUROSEMIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2301.00 | **HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA** | Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0566.00 | **METILDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0530.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0539.00 | **PROPRANOLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas. | | |

278

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **278.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO |

279

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O14.0 Preeclampsia leve a moderada<br><br>O13X Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-IMSS-058-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-586-12-EyR<br><br>GPC-SS-020-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Depuración de creatinina<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Microalbuminuria<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Proteinuria<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0566.00 | **METILDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |

279

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **279.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA | **279.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA | | | **279.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA |

280

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O14.1 Preeclampsia severa | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-IMSS-586-12-EyR<br><br>GPC-SS-020-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Depuración de creatinina en orina de 24hrs<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Proteinuria de 24 horas<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | |
| | 010.000.0566.00 | **METILDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.0569.00 | **NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | | |

280

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **280.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PREECLAMPSIA SEVERA | **280.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PREECLAMPSIA SEVERA | **280.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE PREECLAMPSIA SEVERA | | **280.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA |

281

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O15.0 Eclampsia en el embarazo<br><br>O15.1 Eclampsia durante el trabajo de parto<br><br>O15.2 Eclampsia en el puerperio<br><br>O15.9 Eclampsia, en período no especificado | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | GPC-IMSS-058-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-IMSS-586-12-EyR<br><br>GPC-SS-020-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Depuración de creatinina en orina de 24hrs<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función renal<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.3215.00 | **DIAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2624.00 | **FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | | |
| | 040.000.2602.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2601.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |

281

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | |
| | 010.000.2306.00 | **MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%** | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | | |
| | 010.000.0566.00 | **METILDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.0569.00 | **NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | | |

281

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **281.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ECLAMPSIA | **281.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ECLAMPSIA | **281.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE ECLAMPSIA | | **281.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA |

282

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O14.2 Síndrome HELLP | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | GPC-IMSS-058-08-EyR<br><br>GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-IMSS-586-12-EyR<br><br>GPC-SS-020-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Depuración de creatinina en orina de 24hrs<br><br>Examen general de orina<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función renal<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Proteinuria de 24 horas<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.2618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.3432.00 | **DEXAMETASONA TABLETA** | Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.3215.00 | **DIAZEPAM TABLETA** | Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2624.00 | **FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | | |
| | 040.000.2602.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas. | | |
| | 040.000.2601.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |

282

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | |
| | 010.000.0566.00 | **METILDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0572.00 | **METOPROLOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |
| | 010.000.0569.00 | **NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | | |

282

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **282.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME DE HELLP | **282.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME DE HELLP | **282.3** CUIDADOS INTENSIVOS DEL SÍNDROME DE HELLP | | **282.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP |

**283**

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O72.0 Hemorragia del tercer período del parto<br><br>O72.1 Otras hemorragias postparto inmediatas<br><br>O72.2 Hemorragia postparto secundaria o tardía<br><br>O72.3 Defecto de la coagulación postparto<br><br>O75.1 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto<br><br>R57.1 Choque hipovolémico | 010.000.3618.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | GPC-IMSS-162-09-EyR<br><br>GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-SS-103-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Depuración de creatinina en orina de 24hrs<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Proteinuria de 24 horas<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Reticulocitos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |

283

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.3629.00 | **MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | | Ultrasonido hepático |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |

283

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **283.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO) | **283.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO) | **283.3** CUIDADOS INTENSIVOS DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO) | | **283.4** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO) |

284

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O43.2 Placenta anormalmente adherida<br><br>O44.1 Placenta previa con hemorragia<br><br>O45.0 Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación<br><br>O45.8 Otros desprendimientos prematuros de la placenta<br><br>O45.9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación<br><br>O69.4 Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | GPC-IMSS-162-09-EyR<br><br>GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-ISSSTE-124-08-EyR<br><br>GPC-SS-103-08-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Depuración de creatinina<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 040.000.1544.00 | **ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.1551.00 | **ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml. | | |
| | 010.000.1552.00 | **ORCIPRENALINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.1542.00 | **OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | | |

284

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **284.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA | **284.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA | **284.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA | | **284.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA |

285

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica<br><br>O90.0 Dehiscencia de sutura de cesárea<br><br>O90.1 Dehiscencia de sutura obstétrica perineal<br><br>O90.2 Hematoma de herida quirúrgica obstétrica | 010.000.1956.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | GPC-ISSSTE-527-11-EyR<br><br>GPC-SS-346-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Cultivo de líquidos biológicos<br><br>Cultivo de secreción de herida<br><br>Examen general de orina<br><br>Ultrasonido abdomino - pélvico |
| | 010.000.1956.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.00 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1957.01 | **AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | | |
| | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.1939.00 | **CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1935.00 | **CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.1926.00 | **DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO** | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | | |
| | 010.000.1928.00 | **DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.0264.00 | **LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%** | Cada 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual. | | |

285

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.0265.00 | **LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%** | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.1308.00 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.1308.01 | **METRONIDAZOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

285

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **285.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA | **285.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA | | | **285.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA |

286

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas | 010.000.1931.00 | **AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | GPC-IMSS-606-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Examen general de orina<br><br>Hemocultivo<br><br>Proteína C Reactiva<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Velocidad de sedimentación globular<br><br>Registro tococardiográfico<br><br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.1929.00 | **AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA** | Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | | |
| | 010.000.1207.00 | **BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | | |
| | 010.000.2146.00 | **BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | | |
| | 010.000.1937.00 | **CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | | |
| | 010.000.2133.00 | **CLINDAMICINA CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | | |
| | 010.000.1973.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1976.00 | **CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | | |
| | 010.000.4028.00 | **CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.1954.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.1955.00 | **GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | | |
| | 010.000.0108.00 | **METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO** | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | | |
| | 010.000.0109.00 | **METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | | |

286

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 010.000.1309.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | | |
| | 010.000.1311.00 | **METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | | |
| | 010.000.0104.00 | **PARACETAMOL TABLETA** | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

286

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **286.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE CORIOAMNIOÍTIS | **286.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE CORIOAMNIOÍTIS | **286.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE CORIOAMNIOÍTIS | | **286.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS |

287

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O88.0 Embolia gaseosa, obstétrica<br><br>O88.1 Embolia de líquido amniótico<br><br>O88.2 Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica<br><br>O88.3 Embolia séptica y piémica, obstétrica<br><br>O88.8 Otras embolias obstétricas | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-SS-551-12-EyR<br><br>GPC-SS-656-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Dímero D<br><br>Examen general de orina<br><br>Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Pruebas de función renal<br><br>Pruebas de función hepática<br><br>Proteinuria de 24 horas<br><br>Pruebas cruzadas<br><br>Química sanguínea de 3 elementos<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Electrocardiograma<br><br>Radiografía 2 proyecciones<br><br>Tomografía axial computarizada abdominal<br><br>Tomografía axial computarizada de cráneo<br><br>Tomografía axial computarizada de tórax |
| | 010.000.2141.00 | **BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | | |
| | 010.000.3619.00 | **BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%** | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | | |
| | 010.000.0524.00 | **CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | | |
| | 010.000.5551.01 | **DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA** | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | | |
| | 010.000.4241.00 | **DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | | |
| | 040.000.0202.00 | **DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.0615.00 | **DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | | |
| | 010.000.0614.00 | **DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | | |
| | 010.000.2154.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | | |
| | 010.000.4224.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4242.00 | **ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | | |
| | 040.000.2602.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas. | | |

287

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| | 040.000.2601.00 | **FENOBARBITAL TABLETA** | Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.2308.00 | **FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | | |
| | 010.000.3620.00 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.3620.01 | **GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE** | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0622.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | | |
| | 010.000.2116.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.4201.00 | **HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | | |
| | 010.000.0570.00 | **HIDRALAZINA TABLETA** | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0566.00 | **METILDOPA TABLETA** | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | | |
| | 010.000.0597.00 | **NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA** | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | | |
| | 010.000.0599.00 | **NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA** | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | | |

287

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **287.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE EMBOLIA OBSTÉTRICA | **287.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA | **287.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE EMBOLIA OBSTÉTRICA | | **287.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA |

288

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O24.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 010.000.1051.00 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | GPC-IMSS-320-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993<br>NOM-015-SSA2-2010<br>NOM-017-SSA2-2012 | Biometría hemática completa<br>Curva de tolerancia a la glucosa<br>Depuración de creatinina en orina de 24hrs<br>Examen general de orina<br>Glucosa capilar<br>Hemoglobina glucosilada<br>Perfil de lípidos<br>Química sanguínea de 3 elementos<br>Registro tococardiográfico<br>Ultrasonido obstétrico |
| | 010.000.1051.01 | **INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR** | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10ml. | | |
| | 010.000.1050.00 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | | |
| | 010.000.1050.01 | **INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH** | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | | |

288

## DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

# COBERTURA

## OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **288.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL |

289

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo (trombosis venosa profunda, anteparto)<br><br>O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio (tromboflebitis pelviana, trombosis venosa profunda postparto) | 010.000.0624.01 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas. | GPC-IMSS-436-11-EyR<br><br>GPC-SS-544-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Dímero D<br><br>Examen general de orina<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Química sanguínea de 5 elementos<br><br>Tiempo de coagulación, INR<br><br>Tiempos y pruebas de coagulación<br><br>Ultrasonido Doppler periférico (arterial)<br><br>Ultrasonido doppler periférico (venoso) |
| | 010.000.0624.00 | **ACENOCUMAROL TABLETA** | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas. | | |
| | 010.000.0103.00 | **ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE** | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | | |
| | 010.000.0621.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | | |
| | 010.000.0622.00 | **HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | | |
| | 010.000.4222.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml. | | |
| | 010.000.4223.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml. | | |
| | 010.000.2155.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml. | | |
| | 010.000.2155.01 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml. | | |
| | 010.000.4221.00 | **NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE** | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml. | | |

289

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **289.2** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO | **289.3** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO | **289.4** CUIDADOS INTENSIVOS DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO | | **289.1** DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO |

290

# ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>Z00.1 Control de salud de rutina del niño<br><br>Z37.9 Producto del parto no especificado<br><br>**CIE-9-MC**<br><br>00I.0 Tamiz metabólico (neonatal)<br><br>00I.1 Tamiz auditivo (neonatal)<br><br>89.7X Reconocimiento médico general | 010.000.2821.00 | **CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA** | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | GPC-ISSSTE-699-13-EyR<br><br>GPC-SS-055-08-EyR<br><br>GPC-SSA-226-09-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993<br><br>NOM-034-SSA2-2013 | Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Tamiz neonatal básico<br><br>Tamiz auditivo neonatal |
| | 010.000.1732.00 | **FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml. | | |
| | 010.000.1732.01 | **FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE** | Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml. | | |
| | 030.000.6506.01 | **FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN, FORTIFICADOR DE LECHE MATERNA O HUMANA** | Envase de 100 a 200 viales de 5 mL c/u | | |
| | 030.000.0011.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g. | | |
| | 030.000.0012.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO** | Envase con 375 a 400 g y medida de 4.4 a 4.5 g. | | |

290

## ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

# COBERTURA

## OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **290.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS | **290.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS | | | |

291

# DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br>P58.0 Ictericia neonatal debida a contusión<br>P58.1 Ictericia neonatal debida a hemorragia<br>P58.2 Ictericia neonatal debida a infección<br>P58.3 Ictericia neonatal debida a policitemia<br>P58.4 Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido<br>P58.5 Ictericia neonatal debida a deglución de sangre materna<br>P58.8 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas especificadas<br>P58.9 Ictericia neonatal debida a hemólisis excesiva, sin otra especificación<br>P59.0 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término<br>P59.1 Síndrome de la bilis espesa<br>P59.2 Ictericia neonatal debida a otra lesión hepática especificada o no<br>P59.3 Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna<br>P59.8 Ictericia neonatal por otras causas especificadas<br>P59.9 Ictericia neonatal, no especificada | **SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS** | | | GPC-IMSS-262-10-EyR<br>NOM-004-SSA3-2012<br>NOM-007-SSA2-1993 | Bilirrubinas totales (directa e indirecta)<br>Bilirrubina directa<br>Bilirrubina indirecta<br>Biometría hemática completa<br>Coombs directo<br>Examen general de orina<br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br>Reticulocitos |

291

## DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL

# COBERTURA

## OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **291.2** MANEJO EN URGENCIAS DE ICTERICIA NEONATAL | **291.3** HOSPITALIZACIÓN POR ICTERICIA NEONATAL | | | **291.1** DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL |

292

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>P07.3 Otros recién nacidos pretérmino | 030.000.0013.00 | **FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g. | GPC-IMSS-418-11-EyR<br><br>GPC-IMSS-645-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Grupo sanguíneo y factor Rh<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 030.000.0003.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 5.37 g. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

292

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **292.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES | **292.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES | | | |

293

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>P07.3 Otros recién nacidos pretérmino<br><br>P80.0 Síndrome del enfriamiento<br><br>P80.8 Otras hipotermias del recién nacido<br><br>P80.9 Hipotermia del recién nacido, no especificada | 030.000.0013.00 | **FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g. | GPC-IMSS-645-13-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012<br><br>NOM-007-SSA2-1993 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Hemocultivo<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 030.000.0003.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 5.37 g. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

293

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **293.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA | **293.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA | | | |

294

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER

| Clasificación | Medicamentos e insumos | | | Normatividad | Auxiliares de Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clave | Nombre | Descripción | | |
| **CIE-10**<br><br>P07.1 Otro peso bajo al nacer<br><br>P07.3 Otros recién nacidos pretérmino | 030.000.0013.00 | **FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g. | GPC-IMSS-418-11-EyR<br><br>NOM-004-SSA3-2012 | Biometría hemática completa<br><br>Electrolitos séricos completos<br><br>Examen general de orina<br><br>Química sanguínea de 3 elementos |
| | 030.000.0003.00 | **SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO** | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 5.37 g. | | |
| | 010.000.1098.00 | **VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN** | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | | |

294

# DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER

## COBERTURA

### OBSTETRICIA

| URGENCIAS | HOSPITALIZACIÓN | TERAPIA INTENSIVA | CIRUGÍA GENERAL | CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **294.1** TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER | **294.2** TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER | | | |

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

## CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS

Conforme a lo establecido en la fracción VI, del artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, la lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), cuentan con clave del Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud. Así mismo se basa en el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ninguna otra instancia está facultada para editar, modificar o acoplar a intereses personales, ajenos a este documento; deberá ser en apego al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| **ANALGESIA** | | | | |
| 1 | 010.000.0101.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA | Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas. | N02BA01 |
| 2 | 010.000.0103.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes. | N02BA01 |
| 3 | 040.000.2097.00 | BUPRENORFINA PARCHE | Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches. | N02AE01 |
| 4 | 040.000.2098.00 | BUPRENORFINA PARCHE | Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches. | N02AE01 |
| 5 | 040.000.4026.00 | BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml. | N02AE01 |
| 6 | 040.000.2100.00 | BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas. | N02AE01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 040.000.2100.01 | BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas. | N02AE01 |
| 8 | 010.000.4028.00 | CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | A03DB04 |
| 9 | 040.000.5915.00 | CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 50 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N02AX06 |
| 10 | 040.000.5916.00 | CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 100 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N02AX06 |
| 11 | 010.000.0247.00 | DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg. Envase con 1 frasco ámpula. | N05CM18 |
| 12 | 010.000.4036.00 | ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 ml. | M02AA06 |
| 13 | 010.000.3422.00 | KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml. | M01AB15 |
| 14 | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos. | N02BB02 |
| 15 | 010.000.0109.00 | METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml. | N02BB02 |
| 16 | 040.000.2099.00 | MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml. | N02AA01 |
| 17 | 040.000.4029.00 | MORFINA TABLETA | Cada tableta contiene: Sulfato de morfina pentahidratado equivalente a 30 mg de sulfato de morfina. Envase con 20 tabletas. | N02AA01 |
| 18 | 040.000.4032.00 | OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxicodona 20 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N02AA05 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 040.000.4033.00 | OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxicodona 10 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N02AA05 |
| 20 | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 50 ml. | N02BE01 |
| 21 | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ámpula con 100 ml. | N02BE01 |
| 22 | 010.000.0106.00 | PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | N02BE01 |
| 23 | 010.000.0105.00 | PARACETAMOL SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios. | N02BE01 |
| 24 | 010.000.0514.00 | PARACETAMOL SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios. | N02BE01 |
| 25 | 010.000.0514.01 | PARACETAMOL SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios | N02BE01 |
| 26 | 010.000.0514.02 | PARACETAMOL SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios. | N02BE01 |
| 27 | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL TABLETA | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas. | N02BE01 |
| 28 | 040.000.2106.00 | TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | N02AX02 |
| 29 | 040.000.2096.00 | TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas. | N02AJ13 |
| **ANESTESIA** | | | | |
| 30 | 010.000.0204.00 | ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | A03BA01 |
| 31 | 010.000.0271.00 | BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml. | N01BB01 |
| 32 | 010.000.4055.00 | BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhídra o glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml. | N01BB01 |
| 33 | 010.000.4061.00 | CISATRACURIO, BESILATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml. | M03AC11 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 010.000.0234.00 | DESFLURANO LÍQUIDO | Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml. | N01AB07 |
| 35 | 040.000.0202.00 | DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml. | N05BA01 |
| 36 | 040.000.0243.00 | ETOMIDATO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml. | N01AX07 |
| 37 | 040.000.0242.00 | FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | N01AH01 |
| 38 | 040.000.4054.00 | FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml). | V03AB25 |
| 39 | 040.000.0226.00 | KETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina. Envase con un frasco ámpula de 10 ml. | N01AX03 |
| 40 | 010.000.0264.00 | LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10% | Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml con atomizador manual. | N01BB02 |
| 41 | 010.000.0261.00 | LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1% | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ámpula de 50 ml. | N01BB02 |
| 42 | 010.000.0262.00 | LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | N01BB02 |
| 43 | 010.000.0263.00 | LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml. | N01BB02 |
| 44 | 010.000.0265.00 | LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml. | N01BB52 |
| 45 | 010.000.0267.00 | LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg Epinefrina (1:100000) 0.018 mg Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml. | N01BB52 |
| 46 | 040.000.2108.00 | MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam. O Midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | N05CD08 |
| 47 | 040.000.4060.00 | MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg de midazolam. o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml. | N05CD08 |
| 48 | 040.000.4057.00 | MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg de midazolam. O Midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml. | N05CD08 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 010.000.0291.00 | NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml. | N07AA01 |
| 50 | 010.000.0246.00 | PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml. | N01AX10 |
| 51 | 010.000.4059.00 | ROCURONIO, BROMURO DE SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml. | M03AC09 |
| 52 | 010.000.0269.00 | ROPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml. | N01BB09 |
| 53 | 010.000.0233.00 | SEVOFLURANO LIQUIDO O SOLUCIÓN | Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml. Envase con 250 ml de líquido o solución. | N01AB08 |
| 54 | 010.000.0252.00 | SUXAMETONIO, CLORURO DE SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml. | M03AB01 |
| 55 | 040.000.0221.00 | TIOPENTAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml. | N01AF03 |
| 56 | 010.000.0254.00 | VECURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml). | M03AC03 |
| **CARDIOLOGÍA** | | | | |
| 57 | 010.000.5099.00 | ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml. | C01EB10 |
| 58 | 010.000.4107.00 | AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml. | C01BD01 |
| 59 | 010.000.4110.00 | AMIODARONA TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas. | C01BD01 |
| 60 | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA | Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas. | C08CA01 |
| 61 | 010.000.2530.00 | CANDESARTÁN CILEXETILO HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas. | C09CA06 |
| 62 | 010.000.0574.00 | CAPTOPRIL TABLETA | Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas. | C09AA01 |
| 63 | 010.000.2101.00 | CLONIDINA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos. | C02AC01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 010.000.4246.00 | CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfa forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas. | B01AC04 |
| 65 | 010.000.4246.01 | CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas. | B01AC04 |
| 66 | 010.000.0561.00 | CLORTALIDONA TABLETA | Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | C03BA04 |
| 67 | 010.000.0503.00 | DIGOXINA ELÍXIR | Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa. | C01AA05 |
| 68 | 010.000.0504.00 | DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | C01AA05 |
| 69 | 010.000.0502.00 | DIGOXINA TABLETA | Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas. | C01AA05 |
| 70 | 010.000.0615.00 | DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml. | C01CA07 |
| 71 | 010.000.0614.00 | DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | C01CA04 |
| 72 | 010.000.2501.00 | ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg o lisinopril 10 mg o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas. | C09AA02<br>C09AA03<br>C09AA05 |
| 73 | 010.000.0611.00 | EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000). Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | C01CA24 |
| 74 | 010.000.5104.00 | ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 mg/ml). | C07AB09 |
| 75 | 010.000.2116.00 | HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | C02DB02 |
| 76 | 010.000.4201.00 | HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml. | C02DB02 |
| 77 | 010.000.0570.00 | HIDRALAZINA TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas. | C02DB02 |
| 78 | 010.000.4095.00 | IRBESARTÁN TABLETA | Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas. | C09CA04 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 010.000.4096.00 | IRBESARTÁN TABLETA | Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas. | C09CA04 |
| 80 | 010.000.0593.00 | ISOSORBIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | C01DA08 |
| 81 | 010.000.0592.00 | ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales. | C01DA08 |
| 82 | 010.000.0522.00 | LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml. | C01BB01 |
| 83 | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO | Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos. | C09CA01 |
| 84 | 010.000.0566.00 | METILDOPA TABLETA | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas. | C02AB01 |
| 85 | 010.000.0572.00 | METOPROLOL TABLETA | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | C07AB02 |
| 86 | 010.000.0597.00 | NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas. | C08CA05 |
| 87 | 010.000.0599.00 | NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos. | C08CA05 |
| 88 | 010.000.0569.00 | NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente. | C02DD01 |
| 89 | 010.000.0530.00 | PROPRANOLOL TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas. | C07AA05 |
| 90 | 010.000.0539.00 | PROPRANOLOL TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas. | C07AA05 |
| 91 | 010.000.2542.00 | TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas o cápsulas. | C09CA07 |
| 92 | 010.000.2540.00 | TELMISARTÁN TABLETA | Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas. | C09CA07 |
| 93 | 010.000.0591.00 | TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE | Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables. | C09DA07 |
| 94 | 010.000.4111.00 | TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE | Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches. | C01DA02 |
| 95 | 010.000.4114.00 | TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ámpula de 10 ml. | C01DA02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 010.000.0596.00 | VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas. | C08DA01 |
| 97 | 010.000.0598.00 | VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ml). | C08DA01 |
| 98 | 010.000.0623.00 | WARFARINA TABLETA | Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas. | B01AA03 |
| **DERMATOLOGÍA** | | | | |
| 99 | 010.000.0904.00 | ÁCIDO RETINOICO CREMA | Cada 100 g contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g. | D10AD02 |
| 100 | 010.000.0831.00 | ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA | Cada ml contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml. | D05AA |
| 101 | 010.000.0871.00 | ALIBOUR POLVO | Cada g contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g. | D02AB |
| 102 | 010.000.0801.00 | BAÑO COLOIDE POLVO | Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g. | D02AX |
| 103 | 010.000.0801.01 | BAÑO COLOIDE POLVO | Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g. | D02AX |
| 104 | 010.000.0861.00 | BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA | Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml. | P03AX01 |
| 105 | 010.000.0822.00 | BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO | Cada 100 ml o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 ml. | D10AE01 |
| 106 | 010.000.0822.01 | BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO | Cada 100 ml o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 ml. | D10AE01 |
| 107 | 010.000.0822.02 | BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO | Cada 100 ml o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 ml. | D10AE01 |
| 108 | 010.000.2119.00 | BETAMETASONA UNGÜENTO | Cada 100 g contienen: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona. Envase con 30 g. | D07AC01 |
| 109 | 010.000.4136.00 | CLINDAMICINA GEL | Cada 100 g contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina. Envase con 30 g. | D10AF01 |
| 110 | 010.000.0813.00 | HIDROCORTISONA CREMA | Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g. | D07XA02 |
| 111 | 010.000.2024.00 | ISOCONAZOL CREMA | Cada 100 g contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g. | D01AC02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 010.000.0891.00 | MICONAZOL CREMA | Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g. | D01AC02 |
| 113 | 010.000.0804.00 | ÓXIDO DE ZINC PASTA | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g. | D02AB |
| 114 | 010.000.0865.00 | PERMETRINA SOLUCIÓN | Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml. | P03AC04 |
| 115 | 010.000.0901.00 | PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA | Cada ml contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml. | D06BB04 |
| 116 | 010.000.4126.00 | SULFADIAZINA DE PLATA CREMA | Cada 100 g contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g. | D06BA01 |
| **ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO** | | | | |
| 117 | 010.000.5106.00 | ATORVASTATINA TABLETA | Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina. Envase con 10 tabletas. | C10AA05 |
| 118 | 010.000.0655.00 | BEZAFIBRATO TABLETA | Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas. | C10AB02 |
| 119 | 010.000.1096.00 | BROMOCRIPTINA TABLETA | Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas. | G02CB01 |
| 120 | 010.000.1006.00 | CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE | Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos. | A12AX |
| 121 | 010.000.1095.00 | CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA | Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. Envase con 50 cápsulas. | A11CC04 |
| 122 | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO / VITAMINA D3 TABLETA | Cada tableta contiene: Carbonato de calcio 1666.670 mg equivalente a 600 mg de calcio Colecalciferol 6.2 mg equivalente a 400 UI de Vitamina D3. Envase con 30 tabletas | A12AX |
| 123 | 010.000.3432.00 | DEXAMETASONA TABLETA | Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas. | H02AB02 |
| 124 | 010.000.4024.05 | EZETIMIBA TABLETA | Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas. | C10AX09 |
| 125 | 010.000.1042.00 | GLIBENCLAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas. | A10BB01 |
| 126 | 010.000.6117.00 | INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTACRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml). | A10AD05 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 010.000.4156.00 | INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Insulina aspártica (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | A10AB04 |
| 128 | 010.000.4165.00 | INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml). | A10AE05 |
| 129 | 010.000.4165.01 | INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Insulina detemir (ADN recombinante) 100 U equivalente a 14.20 mg. Envase con 5 plumas prellenadas con 3 ml (100 U/ml). | A10AE05 |
| 130 | 010.000.4158.00 | INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | A10AE04 |
| 131 | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo desechable. | A10AE04 |
| 132 | 010.000.1051.00 | INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | A10AB06 |
| 133 | 010.000.1051.01 | INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | A10AB06 |
| 134 | 010.000.4157.00 | INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA | Cada ml contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | A10AC01 |
| 135 | 010.000.1050.00 | INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | A10AC01 |
| 136 | 010.000.1050.01 | INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | A10AC01 |
| 137 | 010.000.4162.00 | INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. | A10AB04 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 010.000.4148.00 | INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml. | A10AB04 |
| 139 | 010.000.1007.00 | LEVOTIROXINA TABLETA | Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas. | H03AA01 |
| 140 | 010.000.5621.00 | LINAGLIPTINA TABLETAS | Cada tableta contiene: Linagliptina de 5 mg. Envase con 30 tabletas. | A10BH05 |
| 141 | 010.000.5165.00 | METFORMINA TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas. | A10BA02 |
| 142 | 010.000.0476.00 | METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente. | H02AB04 |
| 143 | 010.000.3433.00 | METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml. | H02AB04 |
| 144 | 010.000.0657.00 | PRAVASTATINA TABLETA | Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas. | C10AA03 |
| 145 | 010.000.0472.00 | PREDNISONA TABLETA | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas. | H02AB07 |
| 146 | 010.000.0473.00 | PREDNISONA TABLETA | Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas. | H02AB07 |
| 147 | 010.000.4124.00 | SIMVASTATINA TABLETA | Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas. | C10AA01 |
| 148 | 010.000.4124.01 | SIMVASTATINA TABLETA | Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas. | C10AA01 |
| 149 | 010.000.4152.00 | SITAGLIPTINA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Fosfato de Sitagliptina monohidratada equivalente a 100 mg de Sitagliptina. Envase con 14 comprimidos. | A10BH01 |
| 150 | 010.000.4152.01 | SITAGLIPTINA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Fosfato de Sitagliptina monohidratada equivalente a 100 mg de Sitagliptina. Envase con 28 comprimidos. | A10BH01 |
| 151 | 010.000.1022.00 | TIAMAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | H03BB02 |
| 152 | 010.000.5620.00 | VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. Envase con 28 comprimidos. | A10BH02 |
| **ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS** | | | | |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 010.000.2126.00 | ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas. | J05AB01 |
| 154 | 010.000.4263.00 | ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas. | J05AB01 |
| 155 | 010.000.4264.00 | ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula. | J05AB01 |
| 156 | 010.000.1345.00 | ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml. | P02CA03 |
| 157 | 010.000.1344.00 | ALBENDAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas. | P02CA03 |
| 158 | 010.000.2012.00 | AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ámpula. | J02AA01 |
| 159 | 010.000.1956.00 | AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | J01GB06 |
| 160 | 010.000.1956.01 | AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | J01GB06 |
| 161 | 010.000.1957.00 | AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. | J01GB06 |
| 162 | 010.000.1957.01 | AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml. | J01GB06 |
| 163 | 010.000.2130.00 | AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente. | J01CR02 |
| 164 | 010.000.2129.00 | AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico. | J01CR02 |
| 165 | 010.000.2230.00 | AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas. | J01CR02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 010.000.2230.01 | AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas. | J01CR02 |
| 167 | 010.000.2128.00 | AMOXICILINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas. | J01CA04 |
| 168 | 010.000.2128.01 | AMOXICILINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas. | J01CA04 |
| 169 | 010.000.2127.00 | AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml). | J01CA04 |
| 170 | 010.000.1931.00 | AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | J01CA01 |
| 171 | 010.000.1930.00 | AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | J01CA01 |
| 172 | 010.000.1929.00 | AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA | Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | J01CA01 |
| 173 | 010.000.1969.01 | AZITROMICINA TABLETA | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas. | J01FA10 |
| 174 | 010.000.1938.00 | BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. | J01CE30 |
| 175 | 010.000.1923.00 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | J01CE30 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 010.000.1924.00 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente. | J01CE30 |
| 177 | 010.000.2510.00 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente. | J01CE09 |
| 178 | 010.000.1921.00 | BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente. | J01CE01 |
| 179 | 010.000.1933.00 | BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula. | J01CE01 |
| 180 | 010.000.1925.00 | BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | J01CE08 |
| 181 | 010.000.1939.00 | CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas. | J01DB01 |
| 182 | 010.000.5256.00 | CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | J01DB03 |
| 183 | 010.000.5284.00 | CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente. | J01DE01 |
| 184 | 010.000.5295.00 | CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente. | J01DE01 |
| 185 | 010.000.5295.01 | CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente. | J01DE01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 010.000.1935.00 | CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente. | J01DD01 |
| 187 | 010.000.4254.00 | CEFTAZIDIMA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ámpula y 3 ml de diluyente. | J01DD02 |
| 188 | 010.000.1937.00 | CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente. | J01DA13 |
| 189 | 010.000.4255.00 | CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas. | J01MA02 |
| 190 | 010.000.4259.00 | CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 ml. | J01MA03 |
| 191 | 010.000.4258.00 | CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 ml. | J01MA04 |
| 192 | 010.000.2132.00 | CLARITROMICINA TABLETA | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas. | J01FA09 |
| 193 | 010.000.2133.00 | CLINDAMICINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas. | J01FF01 |
| 194 | 010.000.1973.00 | CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml. | J01FF01 |
| 195 | 010.000.1976.00 | CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 ml. | J01FF01 |
| 196 | 010.000.1991.00 | CLORANFENICOL CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas. | J01BA01 |
| 197 | 010.000.2030.00 | CLOROQUINA TABLETA | Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Envase con 1000 tabletas. | P01BA01 |
| 198 | 010.000.0906.00 | DAPSONA TABLETA | Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas | J04BA02 |
| 199 | 010.000.1926.00 | DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos. | J01CF01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 010.000.1928.00 | DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente. | J01CF01 |
| 201 | 010.000.1927.00 | DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador. | J01CF01 |
| 202 | 010.000.1940.00 | DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas. | J01CF01 |
| 203 | 010.000.1941.00 | DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | J01CF01 |
| 204 | 010.000.1971.00 | ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | J01FA01 |
| 205 | 010.000.1972.00 | ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador. | J01FA01 |
| 206 | 010.000.4301.00 | ERTAPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Envase con un frasco ámpula con liofilizado. | J01DH03 |
| 207 | 010.000.2403.00 | ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml. | J01GA01 |
| 208 | 010.000.2405.00 | ETAMBUTOL TABLETA. | Cada tableta contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas. | J04AK02 |
| 209 | 010.000.1954.00 | GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml. | J01GB03 |
| 210 | 010.000.1955.00 | GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml. | J01GB03 |
| 211 | 010.000.5265.00 | IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | J01DH51 |
| 212 | 010.000.5287.00 | IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ámpula. | J01DH51 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 010.000.2404.00 | ISONIAZIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas. | J04AC01 |
| 214 | 010.000.2417.00 | ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETA RECUBIERTA | Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas. | J04AM02 |
| 215 | 010.000.2418.00 | ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA | Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas. | J04AM06 |
| 216 | 010.000.2018.00 | ITRACONAZOL CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | J02AC02 |
| 217 | 010.000.1951.00 | KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula. | J01GB04 |
| 218 | 010.000.2016.00 | KETOCONAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas. | J02AB02 |
| 219 | 010.000.4249.00 | LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 ml. | J01MA12 |
| 220 | 010.000.4299.00 | LEVOFLOXACINO TABLETA | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | J01MA12 |
| 221 | 010.000.4300.00 | LEVOFLOXACINO TABLETA | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas. | J01MA12 |
| 222 | 010.000.4290.00 | LINEZOLID TABLETA | Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas. | J01XX08 |
| 223 | 010.000.2136.00 | MEBENDAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas. | P02CA01 |
| 224 | 010.000.5292.00 | MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula. | J01DH02 |
| 225 | 010.000.1309.00 | METRONIDAZOL SOLUCIÓN | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml. | J01XD01 |
| 226 | 010.000.1311.00 | METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml. | J01XD01 |
| 227 | 010.000.1310.00 | METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador. | P01AB01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 010.000.1308.00 | METRONIDAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas. | G01AF01 |
| 229 | 010.000.1308.01 | METRONIDAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas. | G01AF01 |
| 230 | 010.000.4139.01 | MINOCICLINA GRAGEA | Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina. Envase con 48 grageas. | J01AA08 |
| 231 | 010.000.4260.00 | NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. Envase para 24 ml. | A07AA02 |
| 232 | 010.000.2524.00 | NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml. | P01AX11 |
| 233 | 010.000.2519.00 | NITAZOXANIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas. | P01AX11 |
| 234 | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas. | J01XE01 |
| 235 | 010.000.5302.00 | NITROFURANTOÍNA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 100 ml contienen: Nitrofurantoína 500 mg. Envase con 120 ml (25 mg/5 ml). | J01XE01 |
| 236 | 010.000.4261.00 | OFLOXACINA TABLETA | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas. | J01MA01 |
| 237 | 010.000.4261.01 | OFLOXACINA TABLETA | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas. | J01MA01 |
| 238 | 010.000.4261.02 | OFLOXACINA TABLETA | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas. | J01MA01 |
| 239 | 010.000.4582.00 | OSELTAMIVIR CAPSULA | Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75.0 mg. Envase con 10 cápsulas. | J05AH02 |
| 240 | 010.000.4592.00 | PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, Tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ámpula. | J01CR05 |
| 241 | 010.000.2138.00 | PIRANTEL TABLETA | Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas. | P02CC01 |
| 242 | 010.000.2413.00 | PIRAZINAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas. | J04AK01 |
| 243 | 010.000.2040.00 | PRAZICUANTEL TABLETA | Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas. | P02BA01 |
| 244 | 010.000.2031.00 | PRIMAQUINA TABLETA | Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas. | P01BA03 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 010.000.2032.00 | PRIMAQUINA TABLETA | Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas. | P01BA03 |
| 246 | 010.000.2409.00 | RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA. | Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas. | J04AM02 |
| 247 | 010.000.2410.00 | RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | J04AB02 |
| 248 | 010.000.1981.00 | TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA | Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas. | J01AA07 |
| 249 | 010.000.1904.00 | TRIMETOPRIMA- SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | J01EE01 |
| 250 | 010.000.5255.00 | TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml. | J01EE01 |
| 251 | 010.000.1903.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas. | J01EE01 |
| 252 | 010.000.4372.00 | VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 10 comprimidos recubiertos. | J05AB11 |
| 253 | 010.000.4372.01 | VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 42 comprimidos recubiertos. | J05AB11 |
| 254 | 010.000.4251.00 | VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ámpula. | J01XA01 |
| **ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS** | | | | |
| 255 | 010.000.2141.00 | BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml. | H02AB01 |
| 256 | 010.000.0408.00 | CLORFENAMINA JARABE | Cada ml contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml. | R01BA53 |
| 257 | 010.000.2142.00 | CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml. | R06AB04 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 010.000.0402.00 | CLORFENAMINA TABLETA | Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas. | R06AB04 |
| 259 | 010.000.5079.00 | CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de cloropiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml. | R06AC03 |
| 260 | 010.000.0464.00 | CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL | Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg. | R03BC01 |
| 261 | 010.000.0405.00 | DIFENHIDRAMINA JARABE | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. | R06AA02 |
| 262 | 010.000.0406.00 | DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml. | R06AA02 |
| 263 | 010.000.5646.00 | FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL NASAL | Cada disparo proporciona: Furoato de fluticasona 27.5 µg. Envase con 120 disparos. | R01AD08 |
| 264 | 010.000.0474.00 | HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente. | H02AB09 |
| 265 | 010.000.2144.00 | LORATADINA TABLETA O GRAGEA | Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas. | R06AX13 |
| 266 | 010.000.2145.00 | LORATADINA JARABE | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador. | R06AX13 |
| **ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS** | | | | |
| 267 | 060.435.0041 | PIRFENIDONA GEL | Cada 100g de gel contiene: Pirfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 40 gramos. | L04AX05 |
| 268 | 060.435.0033 | PIRFENIDONA GEL | Cada 100g de gel contiene: Pirfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 120 gramos. | L04AX05 |
| **GASTROENTEROLOGÍA** | | | | |
| 269 | 010.000.1224.00 | ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL | Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml y dosificador. | A02AD01 |
| 270 | 010.000.1223.00 | ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE | Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables. | A02AD01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 010.000.1263.00 | BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL | Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml. | A07BB |
| 272 | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas. | A03BB01 |
| 273 | 010.000.1207.00 | BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml. | A03BB01 |
| 274 | 010.000.2146.00 | BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | A03DB04 |
| 275 | 010.000.2247.00 | CINITAPRIDA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos. | A03FA08 |
| 276 | 010.000.2248.00 | CINITAPRIDA GRANULADO | Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 30 sobres. | A03FA08 |
| 277 | 010.000.2249.00 | CINITAPRIDA SOLUCIÓN | Cada 100 ml contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg de ORAL. cinitaprida. Envase con 120 ml (1 mg/5 ml) y cucharita dosificadora. | A03FA08 |
| 278 | 010.000.1364.00 | LIDOCAÍNA – HIDROCORTISONA SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios. | C05AA01 |
| 279 | 010.000.1363.00 | LIDOCAÍNA – HIDROCORTISONA UNGÜENTO | Cada 100 g contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de aluminio 3.50 g. Óxido de zinc 18 g. Envase con 20 g y aplicador. | C05AA01 |
| 280 | 010.000.0260.02 | LIDOCAÍNA GEL | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml. | D04AB01 |
| 281 | 010.000.4184.00 | LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA | Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas. | A07DA03 |
| 282 | 010.000.1243.00 | METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN | Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml. | A03FA01 |
| 283 | 010.000.1241.00 | METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml. | A03FA01 |
| 284 | 010.000.1242.00 | METOCLOPRAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas. | A03FA01 |
| 285 | 010.000.5187.00 | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de | A02BC01 A02BC02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente. | |
| 286 | 010.000.5186.00 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas. | A02BC01<br>A02BC02<br>A02BC04 |
| 287 | 010.000.5186.01 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas. | A02BC01<br>A02BC02<br>A02BC04 |
| 288 | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | A02BC01<br>A02BC02<br>A02BC04 |
| 289 | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO | Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g. | A06AC01 |
| 290 | 010.000.1233.00 | RANITIDINA GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas. | A02BA02 |
| 291 | 010.000.2151.00 | RANITIDINA JARABE | Cada 10 ml contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml. | A02BA02 |
| 292 | 010.000.1234.00 | RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | A02BA02 |
| 293 | 010.000.1234.01 | RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml. | A02BA02 |
| 294 | 010.000.1270.00 | SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL | Cada 100 ml contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 ml. | A06AB06 |
| 295 | 010.000.1272.00 | SENÓSIDOS A Y B TABLETA | Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas. | A06AB06 |
| 296 | 010.000.5176.00 | SUCRALFATO TABLETA | Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas. | A02BX02 |
| 297 | 010.000.4504.00 | SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA | Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica. | A07EC02 |
| **GINECO-OBSTETRICIA** | | | | |
| 298 | 010.000.4161.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO | Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos. | M05BA04 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 010.000.4164.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO | Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos. | M05BA04 |
| 300 | 010.000.4167.00 | ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas. | M05BA07 |
| 301 | 010.000.1541.00 | CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolleta. | H01BB03 |
| 302 | 010.000.1511.00 | CIPROTERONA-ETINILESTRADIOL GRAGEA | Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 21 grageas. | G03HB01 |
| 303 | 010.000.1093.00 | DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO | Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos. | G03XA |
| 304 | 010.000.6001.00 | DIENOGEST TABLETA | Cada tableta contiene: Dienogest 2 mg. Envase con 28 tabletas. | G03DB08 |
| 305 | 040.000.1544.00 | ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml. | G02AB03 |
| 306 | 010.000.1506.00 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL | Cada 100 g contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg. Envase con 43 g y aplicador. | G03CA57 |
| 307 | 010.000.1489.00 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas. | G03CA57 |
| 308 | 010.000.1508.00 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA | Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas. | G03CA57 |
| 309 | 010.000.3412.00 | INDOMETACINA SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios. | M01AB01 |
| 310 | 010.000.3412.01 | INDOMETACINA SUPOSITORIO | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios. | M01AB01 |
| 311 | 010.000.1591.00 | INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta. | J06BB01 |
| 312 | 010.000.3045.00 | MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml. | G03AC06 |
| 313 | 010.000.3044.00 | MEDROXIPROGESTERONA TABLETA | Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas. | G03AC06 |
| 314 | 010.000.1561.00 | METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas. | J01XD |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 010.000.1566.00 | NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL | Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas. | G01AA01 |
| 316 | 010.000.1562.00 | NITROFURAL ÓVULO | Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. Envase con 6 óvulos. | G01AX |
| 317 | 010.000.1551.00 | ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml. | R03CB03 |
| 318 | 010.000.1552.00 | ORCIPRENALINA TABLETA | Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas. | R03CB03 |
| 319 | 010.000.1542.00 | OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml. | H01BB02 |
| 320 | 010.000.4217.00 | PROGESTERONA PERLAS | Cada perla contiene: Progesterona de 200 mg. Envase con 14 perlas. | G03DA04 |
| 321 | 010.000.4163.00 | RALOXIFENO TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas. | G03XC01 |
| **HEMATOLOGÍA** | | | | |
| 322 | 010.000.0624.01 | ACENOCUMAROL TABLETA | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas. | B01AA07 |
| 323 | 010.000.0624.00 | ACENOCUMAROL TABLETA | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas. | B01AA07 |
| 324 | 010.000.5731.00 | APIXABÁN TABLETA | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas. | B01AF02 |
| 325 | 010.000.5731.01 | APIXABÁN TABLETA | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas. | B01AF02 |
| 326 | 010.000.5732.01 | APIXABÁN TABLETA | Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas. | B01AF02 |
| 327 | 010.000.5935.00 | DABIGATRÁN CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 150 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | B01AE07 |
| 328 | 010.000.5551.00 | DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas. | B01AE07 |
| 329 | 010.000.5551.01 | DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas. | B01AE07 |
| 330 | 010.000.5552.00 | DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas. | B01AE07 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 010.000.5552.01 | DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas. | B01AE07 |
| 332 | 010.000.4241.00 | DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. | H02AB02 |
| 333 | 010.000.2154.00 | ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml. | B01AB05 |
| 334 | 010.000.4224.00 | ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml. | B01AB05 |
| 335 | 010.000.4242.00 | ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml. | B01AB05 |
| 336 | 010.000.1732.00 | FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml. | B02BA01 |
| 337 | 010.000.1732.01 | FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml. | B02BA01 |
| 338 | 010.000.1702.00 | FUMARATO FERROSO SUSPENSIÓN ORAL | Cada ml contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental. Envase con 120 ml. | B03AA02 |
| 339 | 010.000.1701.00 | FUMARATO FERROSO TABLETA | Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental. Envase con 50 tabletas. | B03AA02 |
| 340 | 010.000.0621.00 | HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml). | B01AB01 |
| 341 | 010.000.0622.00 | HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml). | B01AB01 |
| 342 | 010.000.1708.00 | HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml o frasco ámpula y diluyente. | B03BA03 |
| 343 | 010.000.4222.00 | NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml. | B01AB06 |
| 344 | 010.000.4223.00 | NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml. | B01AB06 |
| 345 | 010.000.2155.00 | NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 ml. | B01AB06 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 346 | 010.000.2155.01 | NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 ml. | B01AB06 |
| 347 | 010.000.4221.00 | NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 ml. | B01AB06 |
| 348 | 010.000.5544.00 | RIVAROXABAN COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 10 mg. Envase con 10 comprimidos. | B01AF01 |
| 349 | 010.000.5735.01 | RIVAROXABAN COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 15 mg. Envase con 28 comprimidos. | B01AF01 |
| 350 | 010.000.5736.01 | RIVAROXABAN COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 20 mg. Envase con 28 comprimidos. | B01AF01 |
| 351 | 010.000.1704.00 | SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL | Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml. | B03AA07 |
| 352 | 010.000.1703.00 | SULFATO FERROSO TABLETA | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas. | B03AA07 |
| **INTOXICACIONES** | | | | |
| 353 | 010.000.2242.00 | CARBÓN ACTIVADO POLVO | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos). | V03AB |
| 354 | 040.000.0302.00 | NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml. | V03AB15 |
| **NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA** | | | | |
| 355 | 010.000.2303.00 | ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 5 ml. | S01EC03 |
| 356 | 010.000.2302.00 | ACETAZOLAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas. | S01EC03 |
| 357 | 010.000.5319.00 | DUTASTERIDA CÁPSULAS | Cada cápsula contiene: Dutasterida de 0.5 mg. Envase con 30 cápsulas. | G04CA52 |
| 358 | 010.000.2156.00 | ESPIRONOLACTONA TABLETA | Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas. | C03DA01 |
| 359 | 010.000.2304.00 | ESPIRONOLACTONA TABLETA | Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas. | C03DA01 |
| 360 | 010.000.2304.01 | ESPIRONOLACTONA TABLETA | Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas. | C03DA01 |
| 361 | 010.000.2307.00 | FUROSEMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas. | C03CA01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 010.000.2308.00 | FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml. | C03CA01 |
| 363 | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas. | C03AA03 |
| 364 | 010.000.2306.00 | MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20% | Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml. | B05BC01 |
| 365 | 010.000.5309.00 | TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas. | G04CA02 |
| 366 | 010.000.5309.01 | TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas. | G04CA02 |
| 367 | 010.000.5309.02 | TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas. | G04CA02 |
| **NEUMOLOGÍA** | | | | |
| 368 | 010.000.2462.00 | AMBROXOL COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos. | R05CB06 |
| 369 | 010.000.2463.00 | AMBROXOL SOLUCIÓN | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador. | R05CB06 |
| 370 | 010.000.0426.00 | AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml. | R03DA05 |
| 371 | 010.000.0477.00 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL | Cada inhalación contiene: Dipropionato de Beclometasona 50 µg. Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis. | R03BA01 |
| 372 | 010.000.2508.00 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL | Cada inhalación contiene: Dipropionato de Beclometasona 250 µg. Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis. | R03BA01 |
| 373 | 010.000.2262.00 | BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador. | R03BB04 |
| 374 | 010.000.2263.00 | BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto). | R03BB04 |
| 375 | 010.000.4334.00 | BUDESONIDA POLVO | Cada dosis contiene: Budesonida (micronizada) 100 µg. Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador. | R03BA02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 010.000.5980.00 | FLUTICASONA, VILANTEROL POLVO PARA INHALACIÓN | Cada dosis contiene: Furoato de fluticasona 100 µg. Vilanterol trifenatato equivalente a 25 µg de vilanterol. Envase con dispositivo inhalador con 30 dosis. | R03AK10 |
| 377 | 010.000.6021.00 | INDACATEROL/GLICOPIRRONIO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Maleato de Indacaterol equivalente a 110 µg de indacaterol. Bromuro de Glicopirronio equivalente a 50 µg de Glicopirronio. Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles), y un dispositivo para inhalación. | R03AL04 |
| 378 | 010.000.2187.00 | IPRATROPIO SOLUCIÓN | Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ámpula con 20 ml. | R03BB01 |
| 379 | 010.000.2162.00 | IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol. | R03BB01 |
| 380 | 010.000.2162.01 | IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol. | R03BB01 |
| 381 | 010.000.2188.00 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN | Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml. | R03AL02 |
| 382 | 010.000.2190.01 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN | Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis). | R03AL02 |
| 383 | 010.000.4329.00 | MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | R03DC03 |
| 384 | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos. | R03DC03 |
| 385 | 010.000.4335.02 | MONTELUKAST GRANULADO | Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres. | R03DC03 |
| 386 | 010.000.0431.00 | SALBUTAMOL JARABE | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 ml. | R03AC02 |
| 387 | 010.000.0439.00 | SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml. | R03AC02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 388 | 010.000.0429.00 | SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg. | R03AC02 |
| 389 | 010.000.0443.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL | Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 µg de salmeterol. Propionato de fluticasona 50 µg. Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis. | R03AK06 |
| 390 | 010.000.0437.00 | TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada. | R03DA04 |
| 391 | 010.000.5075.00 | TEOFILINA ELÍXIR | Cada 100 ml contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml y dosificador. | R03DA04 |
| 392 | 010.000.0438.00 | TERBUTALINA POLVO | Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis. | R03CC03 |
| 393 | 010.000.0432.00 | TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas. | R03CC03 |
| 394 | 010.000.0433.00 | TERBUTALINA TABLETA | Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas. | R03CC03 |
| **NEUROLOGÍA** | | | | |
| 395 | 010.000.2620.00 | ÁCIDO VALPRÓICO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Ácido valpróico 250 mg. Envase con 60 cápsulas. | N03AG01 |
| 396 | 010.000.3307.00 | ATOMOXETINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas. | N06BA09 |
| 397 | 010.000.3308.00 | ATOMOXETINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas. | N06BA09 |
| 398 | 010.000.3309.00 | ATOMOXETINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas. | N06BA09 |
| 399 | 040.000.2653.00 | BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml. | N04AA02 |
| 400 | 040.000.2652.00 | BIPERIDENO TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas. | N04AA02 |
| 401 | 040.000.2609.00 | CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. | N03AF01 |
| 402 | 040.000.2164.00 | CARBAMAZEPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas. | N03AF01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 040.000.2608.00 | CARBAMAZEPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas. | N03AF01 |
| 404 | 040.000.2613.00 | CLONAZEPAM SOLUCIÓN | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral. | N03AE01 |
| 405 | 040.000.2614.00 | CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml. | N03AE01 |
| 406 | 040.000.2612.00 | CLONAZEPAM TABLETA | Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas. | N03AE01 |
| 407 | 040.000.3215.00 | DIAZEPAM TABLETA | Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas. | N05BA01 |
| 408 | 010.000.2624.00 | FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml). | N03AB02 |
| 409 | 010.000.2611.00 | FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml. | N03AB02 |
| 410 | 010.000.2610.00 | FENITOÍNA TABLETA | Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas. | N03AB02 |
| 411 | 010.000.0525.00 | FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA | Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas. | N03AB02 |
| 412 | 040.000.2619.00 | FENOBARBITAL ELÍXIR | Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml y vasito dosificador de 5 ml. | N03AA02 |
| 413 | 040.000.2602.00 | FENOBARBITAL TABLETA | Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas. | N03AA02 |
| 414 | 040.000.2601.00 | FENOBARBITAL TABLETA | Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas. | N03AA02 |
| 415 | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas. | N03AX12 |
| 416 | 010.000.5664.00 | LACOSAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ámpula con 20 ml. (10 mg/ml). | N03AX18 |
| 417 | 010.000.5660.00 | LACOSAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas. | N03AX18 |
| 418 | 010.000.5661.00 | LACOSAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas. | N03AX18 |
| 419 | 010.000.5662.00 | LACOSAMIDA TABLETA | Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas. | N03AX18 |
| 420 | 040.000.2654.00 | LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA | Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas. | N04BA02 |
| 421 | 040.000.2657.00 | LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 50 tabletas. | N04BA02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 422 | 040.000.2657.01 | LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 100 tabletas. | N04BA02 |
| 423 | 040.000.5351.00 | METILFENIDATO COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos. | N06BA04 |
| 424 | 040.000.4470.00 | METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada. | N06BA04 |
| 425 | 040.000.4470.01 | METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N06BA04 |
| 426 | 040.000.4471.01 | METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N06BA04 |
| 427 | 040.000.4472.00 | METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada. | N06BA04 |
| 428 | 040.000.4472.01 | METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N06BA04 |
| 429 | 040.000.3247.00 | PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml. | N05AB03 |
| 430 | 010.000.4356.01 | PREGABALINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas. | N03AX16 |
| 431 | 010.000.2641.01 | ROTIGOTINA PARCHE | Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/20 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 4 mg/24 h. | N04BC |
| 432 | 010.000.2642.00 | ROTIGOTINA PARCHE | Cada parche contiene: Rotigotina 13.5 mg/30 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 6 mg/24 h. | N04BC |
| 433 | 010.000.2643.00 | ROTIGOTINA PARCHE | Cada parche contiene: Rotigotina 18 mg/40 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 8 mg/24 h. | N04BC |
| 434 | 010.000.5363.00 | TOPIRAMATO TABLETA | Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas. | N03AX11 |
| 435 | 010.000.5365.00 | TOPIRAMATO TABLETA | Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas. | N03AX11 |
| 436 | 040.000.2651.00 | TRIHEXIFENIDILO TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas. | N04AA01 |
| 437 | 010.000.2623.00 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN | Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml. | N03AG01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 438 | 010.000.2622.00 | VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valpróico. Envase con 40 tabletas. | N03AG01 |
| 439 | 010.000.5359.00 | VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas. | N03AG01 |
| 440 | 010.000.2630.00 | VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valpróico. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N03AG01 |
| **NUTRIOLOGÍA** | | | | |
| 441 | 010.000.2707.00 | ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA | Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas. | A11GA01 |
| 442 | 010.000.1700.00 | ÁCIDO FÓLICO TABLETA | Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas. | B03BB01 |
| 443 | 010.000.1706.00 | ÁCIDO FÓLICO TABLETA | Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas. | B03BB01 |
| 444 | 010.000.1706.01 | ÁCIDO FÓLICO TABLETA | Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas. | B03BB01 |
| 445 | 010.000.1711.00 | ÁCIDO FÓLICO TABLETA | Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas. | B03BB01 |
| 446 | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA | Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas. | A11EX |
| 447 | 010.000.2739.00 | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO | Envase con 400-454 g con o sin sabor. | A12AA |
| 448 | 030.000.0013.00 | FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g. | V06WG98 |
| 449 | 010.000.5383.00 | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE | Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador. | A11BA |
| 450 | 010.000.4376.00 | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA | Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.0 a 5.0 mg. Nicotinamida (niacinamida) 10.0 a 100.0 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.0 a | A11BA |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5.0 µg. Acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3.0 a 20.0 mg. Retinol (vitamina A) 2000.0 a 10000.0 UI. Colecalciferol (vitamina D3) 200.0 a 1000.0 UI. Acido pantoténico 2.0 a 7.0 mg. Sulfato ferroso 15.0 a 60.0 mg. Sulfato de cobre 1.0 a 4.0 mg. Yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4.0 mg. Glicerofosfato, sulfato o hiposulfito de magnesio 1.0 a 8.00 mg. Fosfato de magnesio 5.0 a 133.0 mg. Cloruro, fosfato o sulfato de zinc 3.0 a 25.0 mg. Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas. | |
| 451 | 010.000.5232.00 | PIRIDOXINA TABLETA | Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas. | A11HA02 |
| 452 | 030.000.0003.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 5.37 g. | V06DF |
| 453 | 030.000.0011.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g | V06DF |
| 454 | 030.000.0012.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 4.5 g | V06DF |
| 455 | 010.000.5395.00 | TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula. | A11DA01 |
| 456 | 010.000.2191.00 | VITAMINA A CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas. | A11CA01 |
| 457 | 020.000.3835.00 | VITAMINA A SOLUCIÓN | Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis. | A11CA01 |
| 458 | 020.000.3835.01 | VITAMINA A SOLUCIÓN | Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 50 dosis. | A11CA01 |
| 459 | 010.000.1098.00 | VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN | Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml. | A11CB |
| **OFTALMOLOGÍA** | | | | |
| 460 | 010.000.2830.00 | ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO | Cada 100 g contienen: Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g. | J05AB01 |
| 461 | 010.000.2172.00 | ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01AX20 |
| 462 | 010.000.2872.00 | ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01FA01 |
| 463 | 010.000.2873.00 | ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO | Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g. | S01FA01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 464 | 010.000.4420.00 | BRIMONIDINA – TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | S01ED51 |
| 465 | 010.000.2821.00 | CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01AA01 |
| 466 | 010.000.2822.00 | CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g. | S01AA01 |
| 467 | 010.000.2175.00 | CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 5 ml. | S01AA01 |
| 468 | 010.000.2899.00 | CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada g o ml contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 ml. | S01XA03 |
| 469 | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 05% | Cada ml contiene: Hipromelosa 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01XA20 |
| 470 | 010.000.2893.00 | HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% | Cada ml contiene: Hipromelosa 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01XA20 |
| 471 | 010.000.2804.00 | NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01GA01 |
| 472 | 010.000.2824.00 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO | Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B. Bacitracina 400 U. Envase con 3.5 g. | S01AA30 |
| 473 | 010.000.2823.00 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01AA30 |
| 474 | 010.000.2851.00 | PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% | Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01EB01 |
| 475 | 010.000.2852.00 | PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 4% | Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01EB01 |
| 476 | 010.000.2841.00 | PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 ml. | S01BA04 |
| 477 | 010.000.2185.00 | PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO | Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g. | S01BA04 |
| 478 | 010.000.2186.00 | PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml. | S01CA02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 010.000.2829.00 | SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 ml. | S01AB04 |
| 480 | 010.000.4407.00 | TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml. | S01HA03 |
| 481 | 010.000.2858.00 | TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml. | S01ED01 |
| 482 | 010.000.2189.00 | TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml. | S01AA12 |
| 483 | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Cada ml contiene: Travoprost 40 µg. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml. | S01EE04 |
| **ONCOLOGÍA** | | | | |
| 484 | 010.000.2152.00 | ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. | V03AF03 |
| 485 | 010.000.5233.00 | ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA | Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 12 tabletas. | V03AF03 |
| 486 | 010.000.5468.00 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con 5 ml contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico. Envase con un frasco ámpula. | M05BA08 |
| 487 | 010.000.4429.00 | DACTINOMICINA SOLUCIÓN | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ámpula. | L01DA01 |
| 488 | 010.000.4302.00 | FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas. | G04CB01 |
| 489 | 010.000.1759.00 | METOTREXATO TABLETA | Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas | L04AX03 |
| 490 | 010.000.1760.00 | METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato. Envase con un frasco ámpula. | L04AX03 |
| 491 | 010.000.1776.00 | METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ámpula. | L04AX03 |
| **OTORRINOLARINGOLOGÍA** | | | | |
| 492 | 010.000.4141.00 | MOMETASONA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN | Cada 100 ml contiene: Furoato de mometasona monohidratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidra. Envase nebulizador con 18 ml y | R01AD09 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una). | |
| 493 | 010.000.5451.00 | CINARIZINA TABLETA | Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas. | N07CA02 |
| 494 | 010.000.3112.00 | DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Envase con 2 ampolletas de 2 ml. | A04AD |
| 495 | 010.000.3111.00 | DIFENIDOL TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Envase con 30 tabletas. | A04AD |
| 496 | 010.000.2196.00 | DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 ml. | R06AA |
| **PLANIFICACIÓN FAMILIAR** | | | | |
| 497 | 010.000.3505.00 | DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas. | G03AA09 |
| 498 | 010.000.3508.00 | DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales). | G03AA09 |
| 499 | 010.000.3510.00 | ETONOGESTREL IMPLANTE | El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador. | G03AC08 |
| 500 | 010.000.2208.00 | LEVONORGESTREL POLVO | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo. | G03AC03 |
| 501 | 010.000.2210.00 | LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA | Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas. | G03AC03 |
| 502 | 010.000.4526.00 | LEVONORGESTREL GRAGEA | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas. | G03AC03 |
| 503 | 010.000.6075.00 | LEVONORGESTREL IMPLANTE | Cada implante contiene: Levonorgestrel 75.0 mg. Envase con 2 implantes. | G03AC03 |
| 504 | 010.000.3504.00 | LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas. | G03AC03 |
| 505 | 010.000.3507.00 | LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales). | G03AC03 |
| 506 | 010.000.3509.00 | MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg. Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml. | G03FA12 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 010.000.3511.00 | NORELGESTROMINA ETINILESTRADIOL PARCHE | Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches. | G03AA13 |
| 508 | 010.000.3503.00 | NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA | Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml. | G03FB06 |
| 509 | 010.000.3515.00 | NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | G03FB06 |
| 510 | 010.000.3506.00 | NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA | Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales). | G03FB06 |
| **PSIQUIATRÍA** | | | | |
| 511 | 040.000.2499.00 | ALPRAZOLAM TABLETA | Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas. | N05BA12 |
| 512 | 040.000.2500.00 | ALPRAZOLAM TABLETA | Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas. | N05BA12 |
| 513 | 040.000.3305.00 | AMITRIPTILINA TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas. | N06AA09 |
| 514 | 010.000.4490.00 | ARIPIPRAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas. | N05AX12 |
| 515 | 010.000.4491.00 | ARIPIPRAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas. | N05AX12 |
| 516 | 010.000.4492.00 | ARIPIPRAZOL TABLETA | Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas. | N05AX12 |
| 517 | 010.000.5487.00 | CITALOPRAM TABLETA | Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 14 tabletas. | N06AB04 |
| 518 | 010.000.5487.01 | CITALOPRAM TABLETA | Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 28 tabletas. | N06AB04 |
| 519 | 040.000.3259.00 | CLOZAPINA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos. | N05A H02 |
| 520 | 040.000.3259.01 | CLOZAPINA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos. | N05A H02 |
| 521 | 010.000.4485.00 | DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA | Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada. | N06AX21 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 522 | 010.000.4483.00 | FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | N06AB03 |
| 523 | 010.000.4483.01 | FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas. | N06AB03 |
| 524 | 040.000.4481.00 | HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 1 ampolleta con 1 ml. | N05AD01 |
| 525 | 040.000.4481.01 | HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 5 ampolletas con 1 ml. | N05AD01 |
| 526 | 040.000.3253.00 | HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg/ ml). | N05AD01 |
| 527 | 040.000.3251.00 | HALOPERIDOL TABLETA | Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas. | N05AD01 |
| 528 | 040.000.3302.00 | IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas. | N06AA02 |
| 529 | 040.000.5476.00 | LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml. | N05AA02 |
| 530 | 040.000.3204.00 | LEVOMEPROMAZINA TABLETA | Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 20 tabletas. | N05AA02 |
| 531 | 040.000.3255.00 | LITIO TABLETA | Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas. | N05AN01 |
| 532 | 040.000.5478.00 | LORAZEPAM TABLETA | Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas. | N05BA06 |
| 533 | 010.000.5485.00 | OLANZAPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas. | N05AH03 |
| 534 | 010.000.5485.01 | OLANZAPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas. | N05AH03 |
| 535 | 010.000.5486.00 | OLANZAPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas. | N05AH03 |
| 536 | 010.000.5486.01 | OLANZAPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas. | N05AH03 |
| 537 | 010.000.5481.00 | PAROXETINA TABLETA | Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. Envase con 10 tabletas. | N06AB05 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 010.000.5489.00 | QUETIAPINA TABLETA | Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg de quetiapina. Envase con 60 tabletas. | N05AH04 |
| 539 | 010.000.5494.00 | QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada. | N05AH04 |
| 540 | 040.000.3262.00 | RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL | Cada ml contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml y gotero dosificador. | N05AX08 |
| 541 | 040.000.3268.00 | RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada frasco ámpula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ámpula y jeringa prellenada con 2 ml de diluyente. | N05AX08 |
| 542 | 040.000.3258.00 | RISPERIDONA TABLETA | Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas. | N05AX08 |
| 543 | 040.000.4484.00 | SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas. | N05AX08 |
| 544 | 040.000.3241.00 | TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 20 grageas o tabletas. | N05AB06 |
| 545 | 040.000.3241.01 | TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 30 grageas o tabletas. | N05AB06 |
| 546 | 010.000.4488.00 | VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada. | N06AX16 |
| 547 | 010.000.5483.00 | ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta. | N05A505 |
| 548 | 010.000.5484.00 | ZUCLOPENTIXOL TABLETA | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas. | N05A505 |
| 549 | 010.000.5484.01 | ZUCLOPENTIXOL TABLETA | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas. | N05A505 |
| **REUMATOLOGÍA Y TRAUMATOLOGÍA** | | | | |
| 550 | 010.000.2503.00 | ALOPURINOL TABLETA | Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas. | M04AA01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 010.000.2503.01 | ALOPURINOL TABLETA | Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas. | M04AA01 |
| 552 | 010.000.3451.00 | ALOPURINOL TABLETA | Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas. | M04AA01 |
| 553 | 010.000.3461.00 | AZATIOPRINA TABLETA | Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas. | L04AX01 |
| 554 | 010.000.5505.00 | CELECOXIB CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas. | M01AH01 |
| 555 | 010.000.3409.00 | COLCHICINA TABLETA | Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas. | M04AC01 |
| 556 | 010.000.3417.00 | DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas. | M01AB05 |
| 557 | 010.000.5501.00 | DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml. | M01AB05 |
| 558 | 010.000.3413.00 | INDOMETACINA CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas. | M01AB01 |
| 559 | 010.000.4202.00 | INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml. | C01EB03 |
| 560 | 010.000.2504.00 | KETOPROFENO CÁPSULA | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas. | M01AE03 |
| 561 | 010.000.4514.00 | LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos. | L04AA13 |
| 562 | 010.000.4515.00 | LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO | Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos. | L04AA13 |
| 563 | 010.000.3444.00 | METOCARBAMOL TABLETA | Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas. | M03BA03 |
| 564 | 010.000.3419.00 | NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml. | M01AE02 |
| 565 | 010.000.3407.00 | NAPROXENO TABLETA | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas. | M01AE02 |
| **SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA** | | | | |
| 566 | 010.000.3663.00 | ALMIDÓN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. | Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil) almidón o pentalmidón o hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g. Envase con 250 ml. | B05AA07 |
| 567 | 010.000.3618.00 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75% | Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq. | B05XA02 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 010.000.3619.00 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75% | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq. | B05XA02 |
| 569 | 010.000.0524.00 | CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | B05XA01 |
| 570 | 010.000.3609.00 | CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq. | B05XA03 |
| 571 | 010.000.3626.00 | CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml. | B05XA03 |
| 572 | 010.000.3608.00 | CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq. | B05XA03 |
| 573 | 010.000.4551.00 | DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6% | Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml. | B05AA05 |
| 574 | 010.000.0641.00 | DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% | Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml. | B05AA05 |
| 575 | 010.000.3622.00 | ELECTROLITOS ORALES POLVO (Fórmula de Osmolaridad Baja) | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 2.6 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g. | B05BB01 |
| 576 | 010.000.3623.00 | ELECTROLITOS ORALES POLVO PARA SOLUCIÓN | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g. | B05BB01 |
| 577 | 010.000.3617.00 | FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq). (Fosfato 20 mEq). Envase con 50 ampolletas con 10 ml. | B05XA06 |
| 578 | 010.000.3620.00 | GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml. | A12AA03 |
| 579 | 010.000.3620.01 | GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE | Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml. | A12AA03 |
| 580 | 010.000.3632.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa. Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial. | B05BA03 |
| 581 | 010.000.3631.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa. Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial. | B05BA03 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| 582 | 010.000.3607.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 % | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g. | B05BA03 |
| 583 | 010.000.3606.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE Al 50% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. O Glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa. Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g. | B05BA03 |
| 584 | 010.000.3604.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g. | B05BA03 |
| 585 | 010.000.3605.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g. | B05BA03 |
| 586 | 010.000.3625.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g. | B05BA03 |
| 587 | 010.000.3624.00 | GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g. | B05BA03 |
| 588 | 010.000.3629.00 | MAGNESIO SULFATO DE, SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml). | B05XA05 |
| 589 | 010.000.3661.00 | POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada 100 ml contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml con o sin equipo para su administración. | B05AA06 |
| 590 | 010.000.3664.00 | POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml. | B05AA06 |
| 591 | 010.000.3616.00 | SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g. Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130. Potasio 4. Calcio 2.72-3. Cloruro 109. Lactato 28. | B05BB01 |
| **VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS** | | | | |
| 592 | 020.000.3833.02 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana antirrábica 300 UI. Envase con una jeringa prellenada con 2 ml (150 UI/ml). | J06BB05 |
| 593 | 020.000.3847.00 | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 $DL_{50}$ (1.8 mg) | J06AA03 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | de veneno de alacrán del género *Centruroides*. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | |
| 594 | 020.000.3848.00 | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácnido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 $DL_{50}$ (180 glándulas de veneno arácnido) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | J06AA03 |
| 595 | 020.000.3850.00 | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 $DL_{50}$ (5 mg) de veneno de *Micrurus sp*. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | J06AA03 |
| 596 | 020.000.3849.00 | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 $DL_{50}$ de veneno de *Crótalos basiliscos* y no menos de 780 $DL_{50}$ de veneno de *Bothrops asper*. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml. | J06AA03 |
| 597 | 020.000.3810.00 | TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis). | J07AM51 |
| 598 | 020.000.3810.01 | TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de | J07AM51 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml). | |
| 599 | 020.000.2522.00 | VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica). *= Unidades de antígeno D. Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 1 dosis en frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa. | J07AJ51 |
| 600 | 020.000.2522.01 | VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg (conjugado a la proteína tetánica). *= Unidades de antígeno D. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa. | J07AJ51 |
| 601 | 020.000.3822.00 | VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo preinvernal e invernal de los años correspondientes del | J07BB |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | hemisferio norte. Envase con frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis. | |
| 602 | 020.000.3822.01 | VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo preinvernal e invernal de los años correspondientes del hemisferio norte. Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis). | J07BB |
| 603 | 020.000.3822.02 | VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo preinvernal e invernal de los años correspondientes del hemisferio norte. Envase con 10 frascos ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis). | J07BB |
| 604 | 020.000.0146.00 | VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con frasco ámpula de 0.5 ml. | J07AL01 |
| 605 | 020.000.0146.01 | VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 9F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con frasco ámpula de 2.5 ml. | J07AL01 |
| 606 | 020.000.0146.02 | VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml. | J07AL01 |
| 607 | 020.000.3805.00 | VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene*: *Bordetella pertussis* no más de 16 UO. Toxoide diftérico no más de 30 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Cada dosis de 0.5 ml contiene**: *Bordetella pertussis* no menos de 4 UI. Toxoides: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 30 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoides: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones. Método de | J07AJ51 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula de 5 ml (10 dosis). *Formulación de proceso. **Potencia de producto terminado. | |
| 608 | 020.000.3813.00 | VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene*: *Bordetella pertussis* No más de 16 UO. Toxoide diftérico No más de 30 Lf. Toxoide tetánico No más de 25 Lf. o Cada dosis de 0.5 ml contiene**: *Bordetella pertussis* No menos de 4 UI. Toxoides Método de Reto Método de Seroneutralización Toxoide diftérico Mínimo 30 UI Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero Toxoide tetánico Mínimo 40 UI en cobayos Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero o Mínimo 60 UI en ratones Envase con frasco ámpula de 10 ml (20 dosis). *Formulación de proceso. **Potencia de producto terminado. | J07AJ51 |
| 609 | 020.000.3802.00 | VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS | Cada dosis de 0.1 ml (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo 1 no menos de 1 000 000 $DICC_{50}$. Tipo 3 no menos de 600 000 $DICC_{50}$. Envase gotero de plástico depresible con 2 ml (20 dosis). | J07BF04 |
| 610 | 020.000.3802.01 | VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS | Cada dosis de 0.1 ml (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo 1 no menos de 1 000 000 $DICC_{50}$. Tipo 3 no menos de 600 000 $DICC_{50}$. Tubo de plástico depresible con 25 dosis, cada una de 0.1 ml. | J07BF04 |
| 611 | 020.000.3817.00 | VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLURY LEP-C25) con potencia ≥ 2.5 UI cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml de diluyente. | J07BG01 |
| 612 | 020.000.3817.01 | VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar PM/SI 38-1503-DM) con potencia ≥ 2.5 UI, cultivado en células VERO. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml de diluyente. | J07BG01 |
| 613 | 020.000.3801.00 | VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.1 ml de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 1077 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC, o Montreal 200 000-3 200 000 UFC, o Moscow 100 000-3 300 000 UFC. Envase con | J07AN01 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml. * Semilla Mérieux. | |
| 614 | 020.000.3801.01 | VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.1 ml de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC, o Montreal 200 000-3 200 UFC, o Moscow 100 000-3 300 000 UFC. Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. * Semilla Mérieux. | J07AN01 |
| 615 | 020.000.0148.00 | VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg, proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml (1 dosis) y aguja. | J07AL01 |
| 616 | 020.000.0148.01 | VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 ml (1 dosis) y agujas. | J07AL01 |
| 617 | 020.000.4173.00 | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml. | J07BM01 |
| 618 | 020.000.4173.01 | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml. | J07BM01 |
| 619 | 020.000.4173.02 | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 100 frascos ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml. | J07BM01 |
| 620 | 020.000.0150.00 | VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL | Cada dosis de 1.5 ml contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50. Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml. | J07BH01 |
| 621 | 020.000.3808.00 | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin | J07AJ52 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml. | |
| 622 | 020.000.3808.01 | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml. | J07AJ52 |
| 623 | 020.000.3808.02 | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 ml. | J07AJ52 |
| 624 | 020.000.3808.03 | VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 o 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5Lf) Toxoide pertussis 2.5 u 8 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 u 8 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 o 3 µg Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 µg. Envase con 5 frascos ámpula con una dosis de 0.5 ml | J07AJ52 |
| 625 | 020.000.3800.00 | VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente. | J07BD52 |
| 626 | 020.000.3804.00 | VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 $\log_{10}$ a 4.5 $\log_{10}$ $DICC_{50}$ o 1000 a 32000 $DICC_{50}$ o $10^3$ a 3.2 x $10^4$ $DICC_{50}$ virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células | J07BD52 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 $log_{10}$ $DICC_{50}$ o ≥ 1000 $DICC_{50}$ o ≥ $10^3$ $DICC_{50}$. Envase con liofilizado para una dosis y diluyente. | |
| 627 | 020.000.0151.00 | VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN | Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI, serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI, serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI, serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI, serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con un tubo de plástico con 2 ml. | J07BH02 |
| 628 | 020.000.0152.00 | VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN | Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI. Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI. Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI. Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI. Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con 10 tubos de plástico con 2 ml cada uno. | J07BH02 |
| 629 | 020.000.2511.00 | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 1 ml contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada con 1 ml. | J07BC01 |
| 630 | 020.000.2526.00 | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 1 ml. contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. (10 dosis). | J07BC01 |
| 631 | 020.000.2527.00 | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ámpula con 0.5 ml. | J07BC01 |
| 632 | 020.000.3820.00 | VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Virus atenuados de rubeola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o >1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50(> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 | J07BD54 |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ATC |
|---|---|---|---|---|
| | | | o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn). Envase con frasco ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente. | |
| 633 | 020.000.3821.00 | VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE | Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de rubeola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn). Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente. | J07BD54 |

# INSUMOS

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NEUMOLOGÍA** | | | |
| 634 | C840600018 | OXIGENO | NA |
| **CARDIOLOGÍA** | | | |
| 635 | 060.932.2599 | VÁLVULAS | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Adulto. Pieza. |
| 636 | 060.932.2797 | VÁLVULAS | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Pieza. |
| 637 | 060.932.6681 | VÁLVULAS | Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza. |
| 638 | 060.604.0087 | MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM | Cardiaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería: 2.8 V. |
| 639 | 060.604.0145 | MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM | Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. |
| 640 | 060.604.0160 | MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA | Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodos en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. |
| 641 | 060.604.0418 | MARCAPASO CARDÍACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA | Marcapaso Cardiaco; tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de sensado bipolar, de |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en "J". |
| 642 | 060.604.0426 | MARCAPASO CARDÍACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA | Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en "J" para la aurícula. |
| 643 | 060.604.0434 | MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE | Marcapaso cardiaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables: 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación: VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Histéresis unicameral. |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 644 | 060.604.0442 | MARCAPASO BIPOLAR DOBLE | Marcapaso cardiaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. |
| 645 | 060.604.0459 | MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA | Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de batería: 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: autoactualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 646 | 060.604.0467 | MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V) | Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad: más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. |
| 647 | 060.604.0475 | MARCAPASO CARDÍACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO | Marcapaso cardiaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación. |
| 648 | 060.604.0483 | MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA | Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 gr y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de “Pell Off”. |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 649 | 060.604.0491 | MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA | Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". |
| 650 | 531.609.0041 | MARCAPASO CARDÍACO EXTERNO | Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. |
| **ESPECIALIDADES MÉDICAS** | | | |
| 651 | 060.782.0016 | DIMETICONA LOCIÓN | Botella con aplicador de 100 ml, peine de dientes finos de acero inoxidable. Cada 100 ml contiene: Dimeticona 99.4 + 0.4% Aceite de tocoferol 0.2 + 0.05% Aceite de chabacano 0.2 + 0.05% Aceite de almendra 0.2 + 0.05% |
| **ODONTOLOGÍA** | | | |
| 652 | 060.040.8041 | AGUJAS DENTALES | Tipo Carpule. Desechables. Longitud. 20-25 mm, Calibre. 30 G, Tamaño. Corta. Envase con 100 piezas. |
| 653 | 060.040.8058 | AGUJAS DENTALES | Tipo Carpule. Desechables. Longitud. 25-42 mm, Calibre. 27 G, Tamaño. Larga. Envase con 100 piezas. |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 654 | 060.064.0064 | ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL | En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g por tableta). |
| 655 | 060.182.0160 | CEMENTOS | Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido polibásico 10-15%. Juego. |
| 656 | 060.623.0852 | ESPACIADORES | De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml 10 ml y longitud de 19 cm 1 cm Pieza. |
| 657 | 060.910.0011 | EYECTORES | Para saliva, de plástico, desechable. Envase con 100 piezas. |
| 658 | 060.066.0500 | FLUORURO DE SODIO | Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml. |
| 659 | 060.753.0029 | PUNTAS ABSORBENTES | Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200. |
| 660 | 060.753.0052 | PUNTAS ABSORBENTES | Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200. |
| 661 | 060.753.0011 | PUNTAS DE GUTAPERCHA | Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200. |
| 662 | 060.753.0102 | PUNTAS DE GUTAPERCHA | Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200. |
| 663 | 060.815.0058 | SELLADORES | De fisuras y fosetas. Envase con 3 ml de bond base. Envase con 3 ml de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml cada uno con bond catalizador. Jeringa con 2 ml de gel grabador. 2 porta pinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche. |
| 664 | 060.841.0882 | SUTURAS | Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 1. Características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas. |
| **PLANIFICACIÓN FAMILIAR** | | | |
| 665 | 060.308.0177 | CONDÓN MASCULINO | De hule látex. Envase con 100 piezas. |
| 666 | 060.308.0227 | CONDÓN FEMENINO | De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual. |

| No. | CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 667 | 060.308.0029 | DISPOSITIVOS | Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza. |
| 668 | 060.308.0151 | DISPOSITIVOS | Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza. |
| 669 | 060.308.0169 | DISPOSITIVOS | Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza. |
| 670 | 060.308.0193 | DISPOSITIVOS | Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza. |

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

# INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2019

| No. | Grupo 2018 | Categoría 2018 | Clave CIE-10 / CIE-O-3 | | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recién nacidos | Cuidados intensivos neonatales | P070, P073 | | Prematurez |
| 2 | | | P220 | | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido |
| 3 | | | P36 | | Sepsis bacteriana del recién nacido |
| 4 | Malformaciones congénitas y/o adquiridas (menores de 18 años) | Aparato digestivo | Q420, | Q421, | Atresia anal |
| | | | Q422, | Q423 | |
| 5 | | | Q390, | Q391, | Atresia esofágica |
| | | | Q392, | Q393 | |
| 6 | | | Q411, | Q412, | Atresia intestinal |
| | | | Q418, | Q419 | |
| 7 | | | Q792 | | Onfalocele |
| 8 | | | Q793 | | Gastrosquisis |
| 9 | | | Q410 | | Atresia-estenosis duodenal |
| 10 | | Columna vertebral | Q05, | Q06, | Espina bífida |
| | | | Q760 | | |
| 11 | | Aparato urinario | Q642, | Q643 | Estenosis uretral |
| 12 | | | Q643, | Q647, | Estenosis del meato uretral |
| | | | Q648, Q649 | | |
| 13 | | | Q621 | | Estenosis ureteral |
| 14 | | | Q641 | | Extrofia vesical |
| 15 | | | Q603, | Q604, | Hipoplasia/displasia renal |
| | | | Q605, | Q614, | |
| 16 | | | Q54, | Q640 | Hipospadias-epispadias |
| 17 | | | Q626 | | Uréter retrocavo |

| No. | Grupo 2018 | Categoría 2018 | Clave CIE-10 / CIE-O-3 | | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | Q622, | Q623 | Ureterocele |
| 19 | | | Q626 | | Uréter ectópico (Meatos ectópicos) |
| 20 | | Cardiovasculares | Q20, | Q21, | Malformaciones congénitas cardiacas |
| | | | Q22, | Q23, | |
| | | | Q24, | Q25, | |
| | | | Q26, | Q27, | |
| | | | Q28 | | |
| 21 | Enfermedades metabólicas en menores de 10 años | Hemofilia | D66X | | Deficiencia hereditaria del factor VIII |
| | | | D67X | | Deficiencia hereditaria del factor IX |
| | | | D680 | | Enfermedad de von Willebrand |
| 22 | | Enfermedades lisosomales | E752 | | Enfermedad de Fabry / Enfermedad de Gaucher |
| | | | E740 | | Enfermedad de Pompe |
| | | | E760 | | Mucopolisacaridosis tipo I |
| | | | E761 | | Mucopolisacaridosis tipo II |
| | | | E762 | | Mucopolisacaridosis tipo IV |
| | | | E762 | | Mucopolisacaridosis tipo VI |
| 23 | Cáncer en menores de 18 años | Tumores del sistema nervioso central | C719 | | Astrocitoma |
| 24 | | | C710 | M9391/3 | Ependimoma |
| | | | C711 | M9391/3 | |
| | | | C712 | M9392/3 | |
| | | | C713 | M9393/1 | |
| | | | C714 | M9393/3 | |
| | | | C715 | M9394/1 | |
| | | | C717 | M9383/1 | |
| | | | C718 | | |
| 25 | | | C716 | | Meduloblastoma |

| No. | Grupo 2018 | Categoría 2018 | Clave CIE-10 / CIE-O-3 | | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | | C479 | | Neuroblastoma |
| 27 | | | C71 | M906 a M909 | Otros tumores del SNC* |
| 28 | | Tumores renales | C64X | M8960/3 | Tumor de Wilms |
| 29 | | | C64X | M8312/3 | Otros tumores renales* |
| | | | | M8960/1 | |
| | | | | M8963/3 | |
| | | | | M8964/3 | |
| 30 | | Leucemias | C910 | | Leucemia linfoblástica aguda |
| 31 | | | C920 | | Leucemia mieloblástica aguda |
| 32 | | | C921 | M9863/3 | Leucemias crónicas |
| 33 | | | D460, | D461, | Síndromes mielodisplásicos |
| | | | D462, | D464, | |
| | | | D467, | D469 | |
| 34 | | Tumores hepáticos | C220 | | Hepatocarcinoma |
| 35 | | | C222 | | Hepatoblastoma |
| 36 | | Tumores óseos | C40, | C41 | Osteosarcoma |
| 37 | | | C40 | M9260/3 | Sarcoma de Ewing |
| | | | C41 | | |
| 38 | | Linfomas | C833, | C837 | Linfoma no Hodgkin |
| 39 | | | C81, | C812 | Enfermedad o linfoma de Hodgkin |
| | | | C813, | C81,7 | |
| 40 | | Tumores del ojo | C692 | | Retinoblastoma |
| 41 | | Sarcomas | C490, | C499 | Sarcoma de partes blandas |
| 42 | | Tumores germinales | C62 | M906 a M909 | Tumores gonadales |
| | | | C56X | | |
| 43 | | | | M906 a M909 | Tumores extragonadales |

| No. | Grupo 2018 | Categoría 2018 | Clave CIE-10 / CIE-O-3 | | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | Carcinomas | C109 | M8010/3 | Diversos carcinomas* |
| | | | C119 | M8010/3 | |
| | | | C159 | M8010/3 | |
| | | | C169 | M8010/3 | |
| | | | C189 | M8010/3 | |
| | | | C259 | M8010/3 | |
| | | | | M8000/3 | |
| | | | C329 | M8010/3 | |
| | | | C349 | M8010/3 | |
| | | | | M8972/3 | |
| | | | C439 | M8720/3 | |
| | | | C459 | M9050/3 | |
| | | | C73X | M8010/3 | |
| | | | C740 | M8370/3 | |
| | | | C741 | M8700/3 | |
| | | | C750 | M8010/3 | |
| | | | M8240/3 | | |
| 45 | | Histiocitosis | C960, | C965, | Histiocitosis |
| | | | C966, | D761 | |
| 46 | Cáncer en mayores de 18 años | Tumor maligno de ovario | C56X | | Tumor maligno de ovario epitelial |
| 47 | | | C56X | M906 a M909 | Tumor maligno de ovario germinal |
| 48 | | Cáncer de próstata | C61X | | Tumor maligno de próstata |
| 49 | | Cáncer testicular | C62 | M906 a M909 | Cáncer testicular seminoma y no seminoma |
| 50 | | | C53, | C540, | Cáncer cervicouterino |

| No. | Grupo 2018 | Categoría 2018 | Clave CIE-10 / CIE-O-3 | | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cáncer cervicouterino | C542, | C543, | |
| | | | C548, | C549, | |
| | | | C55X | D06, | |
| 51 | | Cáncer de Endometrio | C541 | | Cáncer de Endometrio |
| 52 | | Cáncer de mama | C50 | | Cáncer de mama |
| 53 | | Tumor maligno de colon y recto | C18 | | Tumor maligno de colon |
| | | | C19X | | Tumor maligno de la unión recto-sigmoidea |
| | | | C20X | | Tumor maligno de recto |
| 54 | | Linfoma no Hodgkin | C820, | C821, | Linfoma no Hodgkin folicular |
| | | | C822, | C827, | |
| | | | C829 | | |
| | | | C830, | C831, | Linfoma no Hodgkin difuso |
| | | | C833, | C835, | |
| | | | C837, | C838, | |
| | | | C839 | | |
| 55 | | Cáncer de esófago | C150, | C151, | Cáncer de esófago |
| | | | C153, | C154, | |
| | | | C155, | C159 | |
| 56 | Enfermedades cardiovasculares en menores de 65 años | Infarto agudo al miocardio | I21 | | Infarto agudo al miocardio |
| 57 | Infectocontagiosas | Hepatitis tipo C (en menores de 65 años) | B182 | | Hepatitis viral tipo C crónica |
| 58 | | Tratamiento antirretroviral de VIH/SIDA | B24X | | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación |
| 59 | | Trasplantes | Z947 | | Trasplante de córnea |

| No. | Grupo 2018 | Categoría 2018 | Clave CIE-10 / CIE-O-3 | Intervención |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Trasplantes en paciente pediátrico y adulto | | Z948 | Trasplante de médula ósea mayores de 18 años |
| 61 | | | Z941 | Trasplante de corazón en mayores de 18 años |
| 62 | | | Z944 | Trasplante hepático en mayores de 18 años |
| 63 | | | Z942 | Trasplante pulmonar en mayores de 18 años |
| 64 | | | Z948 | Trasplante de médula ósea menores de 18 años |
| 65 | | | Z940 | Trasplante renal menores de 18 años |
| 66 | Genéticas | Alteraciones cromosómicas | Q96 | Síndrome de Turner |

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

# INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. | Tuberculosis del Sistema Nervioso. | A17 |
| 2 | | Tuberculosis Miliar. | A19 |
| 3 | | Listeriosis. | A32 |
| 4 | | Tétanos neonatal. | A33 |
| 5 | | Septicemia no especificada (incluye choque séptico). | A41.9 |
| 6 | | Sífilis congénita. | A50 |
| 7 | | Encefalitis viral, no especificada. | A86 |
| 8 | | Enfermedad debida a virus citomegálico. | B25 |
| 9 | | Toxoplasmosis. | B58 |
| 10 | Tumores. | Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula). | D11 |
| 11 | | Tumor benigno del mediastino. | D15.2 |
| 12 | | Tumor benigno de la piel del labio. | D23.0 |
| 13 | | Tumor benigno del ojo y sus anexos. | D31 |
| 14 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. | Púrpura trombocitopénica idiopática. | D69.3 |
| 15 | | Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos. | D80 |
| 16 | | Inmunodeficiencias combinadas. | D81 |
| 17 | | Síndrome de Wiskott-Aldrich. | D82.0 |
| 18 | | Otras inmunodeficiencias. | D84 |
| 19 | Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas. | Intolerancia a la lactosa. | E73 |
| 20 | | Fibrosis quística. | E84 |
| 21 | | Depleción del volumen. | E86 |
| 22 | | Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales. | E25.0 |

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 23 | | Fenilcetonuria. | E70.0 |
| 24 | | Galactosemia. | E74.2 |
| 25 | Enfermedades del sistema nervioso. | Otros trastornos del nervio facial. | G51.8 |
| 26 | | Síndrome de Guillain-Barré. | G61.0 |
| 27 | | Parálisis cerebral infantil (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años). | G80 |
| 28 | | Hemiplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años). | G81 |
| 29 | | Paraplejía y cuadriplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años). | G82 |
| 30 | | Procedimientos de Rehabilitación | 00.B, 00.C (CIE-9-MC) |
| 31 | | Medicina Física y Rehabilitación y procedimientos relacionados | 93.08, 93.1, 93.22, 93.31, 93.32, 93.33, 93.34 ,93.99 (CIE-9-MC) |
| 32 | Enfermedades del ojo. | Retinopatía de la prematuridad. | H35.1 |
| 33 | Enfermedades del oído. | Hipoacusia neurosensorial bilateral (Prótesis auditiva externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal). | H90.3 |
| 34 | | Habilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años). | V57.3 (CIE-9-MC) |
| 35 | | Implantación prótesis cóclea. | 20.96 a 20.98 (CIE-9-MC) |
| 36 | | Habilitación auditiva verbal en niños candidatos a prótesis auditiva externa o a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años). | V57.3 (CIE-9-MC) |
| 37 | Enfermedades del sistema circulatorio | Miocarditis aguda. | I40 |
| 38 | | Fibroelastosis endocárdica. | I42.4 |
| 39 | | Hipertensión pulmonar primaria. | I27.0 |
| 40 | Enfermedades del sistema respiratorio. | Neumonía por Influenza por virus identificado. | J10.0 |
| 41 | | Neumonía por Influenza por virus no identificado. | J11.0 |
| 42 | | Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte. | J15 |

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 43 | | Bronconeumonía, no especificada. | J18.0 |
| 44 | | Neumonitis debida a sólidos y líquidos. | J69 |
| 45 | | Piotórax. | J86 |
| 46 | | Derrame pleural no clasificado en otra parte. | J90 |
| 47 | | Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte. | J91.X |
| 48 | | Neumotórax. | J93 |
| 49 | | Otros trastornos respiratorios (incluye Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte, Colapso pulmonar, Enfisema intersticial, Enfisema compensatorio, Otros trastornos del pulmón, Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte, Trastornos del diafragma, Otros trastornos respiratorios especificados) | J98.0 al J98.8 |
| 50 | Enfermedades del sistema digestivo. | Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes. | K00 |
| 51 | | Estomatitis y lesiones afines. | K12 |
| 52 | | Otras enfermedades del esófago (Incluye Acalasia del cardias, Úlcera del esófago, Obstrucción del esófago, Perforación del esófago, Disquinesia del esófago, Divertículo del esófago, adquirido, Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, Otras enfermedades especificadas del esófago, Enfermedad del esófago, no especificada). | K22.0 al K22.9 |
| 53 | | Constipación. | K59.0 |
| 54 | | Malabsorción intestinal. | K90 |
| 55 | | Otros trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte. | K91.8 |
| 56 | Enfermedades de la piel. | Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter). | L00 |
| 57 | | Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco. | L02 |
| 58 | | Quiste epidérmico. | L72.0 |
| 59 | Enfermedades del sistema osteomuscular | Artritis piógena. | M00 |
| 60 | | Artritis juvenil. | M08 |
| 61 | | Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas. | M30 |
| 62 | | Fascitis necrotizante. | M72.6 |
| 63 | | Síndrome nefrítico agudo. | N00 |

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 64 | Enfermedades del sistema genitourinario. | Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima. | N04 |
| 65 | | Uropatía obstructiva y por reflujo. | N13 |
| 66 | | Insuficiencia renal aguda. | N17 |
| 67 | | Insuficiencia renal terminal. | N18 |
| 68 | | Divertículo de la vejiga. | N32.3 |
| 69 | | Infección de vías urinarias, sitio no especificado. | N39.0 |
| 70 | | Hidrocele y espermatocele. | N43 |
| 71 | | Orquitis y epididimitis. | N45 |
| 72 | | Fístula vesicovaginal. | N82.0 |
| 73 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre. | P00.0 |
| 74 | | Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas. | P01.1 |
| 75 | | Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas. | P02 |
| 76 | | Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna. | P04.4 |
| 77 | | Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal. | P05 |
| 78 | | Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer. | P08 |
| 79 | | Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento. | P10 |
| 80 | | Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central. | P11 |
| 81 | | Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo (incluye cefalohematoma). | P12 |
| 82 | | Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento. | P13 |
| 83 | | Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento. | P14 |
| 84 | | Otros traumatismos del nacimiento. | P15 |
| 85 | | Hipoxia intrauterina. | P20 |
| 86 | | Asfixia al nacimiento. | P21 |
| 87 | | Taquipnea transitoria del recién nacido. | P22.1 |
| 88 | | Neumonía congénita. | P23 |
| 89 | | Síndromes de aspiración neonatal. | P24 |
| 90 | | Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal. | P25 |

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 91 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal. | P26 |
| 92 | | Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal. | P27.1 |
| 93 | | Otras apneas del recién nacido. | P28.4 |
| 94 | | Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve. | P38 |
| 95 | | Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido. | P52 |
| 96 | | Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido. | P53 |
| 97 | | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. | P55 |
| 98 | | Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica. | P56 |
| 99 | | Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas. | P58 |
| 100 | | Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas. | P59 |
| 101 | | Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido. | P60 |
| 102 | | Policitemia neonatal. | P61.1 |
| 103 | | Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido. | P70 |
| 104 | | Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio. | P71 |
| 105 | | Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido. | P74.2 |
| 106 | | Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido. | P74.3 |
| 107 | | Íleo meconial. | P75 |
| 108 | | Síndrome del tapón de meconio. | P76.0 |
| 109 | | Otras peritonitis neonatales. | P78.1 |
| 110 | | Enterocolitis necrotizante. | P77 |
| 111 | | Convulsiones del recién nacido. | P90 |
| 112 | | Depresión cerebral neonatal. | P91.4 |
| 113 | | Encefalopatía hipóxica isquémica. | P91.6 |
| 114 | | Anencefalia. | Q00.0 |
| 115 | | Encefalocele. | Q01 |
| 116 | | Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal. | Q10.5 |
| 117 | | Catarata congénita. | Q12.0 |
| 118 | | Otras malformaciones congénitas del oído (Microtia, macrotia, oreja supernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la posición de la oreja, oreja prominente). | Q17 |

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 119 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. | Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial. | Q18.0 |
| 120 | | Malformaciones congénitas de la nariz. | Q30 |
| 121 | | Malformación congénita de la laringe (Incluye laringomalacia congénita). | Q31 |
| 122 | | Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios. | Q32 |
| 123 | | Malformaciones congénitas del pulmón. | Q33 |
| 124 | | Otras malformaciones congénitas del intestino (Incluye divertículo de Meckel, Enfermedad de Hirschsprung y mal rotación intestinal). | Q43 |
| 125 | | Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco). | Q44 |
| 126 | | Páncreas anular. | Q45.1 |
| 127 | | Anquiloglosia. | Q38.1 |
| 128 | | Síndrome de Potter. | Q60.6 |
| 129 | | Duplicación del uréter. | Q62.5 |
| 130 | | Riñón supernumerario. | Q63.0 |
| 131 | | Riñón ectópico. | Q63.2 |
| 132 | | Malformación del uraco. | Q64.4 |
| 133 | | Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra. | Q64.5 |
| 134 | | Polidactilia. | Q69 |
| 135 | | Sindactilia. | Q70 |
| 136 | | Craneosinostosis. | Q75.0 |
| 137 | | Hernia diafragmática congénita. | Q79.0 |
| 138 | | Ictiosis congénita. | Q80 |
| 139 | | Epidermólisis bullosa. | Q81 |
| 140 | | Nevo no neoplásico, congénito. | Q82.5 |
| 141 | | Anormalidades cromosómicas (Diagnóstico). | Q90 - Q99 |
| 142 | Síntomas y signos generales. | Choque hipovolémico. | R57.1 |
| 143 | | Fractura de la bóveda del cráneo. | S02.0 |

| No. | Grupo | Enfermedad | Claves CIE-10 |
|---|---|---|---|
| 144 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas. | Traumatismo intracraneal con coma prolongado. | S06.7 |
| 145 | | Avulsión del cuero cabelludo. | S08.0 |
| 146 | | Herida del tórax. | S21 |
| 147 | | Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s). | S67.0 |
| 148 | Quemaduras y corrosiones. | Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo. | T20.3, T21.3, T22.3, T23.3, T24.3, T25.3, T29.3, T30.3 |
| 149 | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica. | Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo. | Y51 |
| 150 | | Efectos adversos de vacunas bacterianas. | Y58 |
| 151 | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud. | Atención de orificios artificiales (que incluye Atención de traqueostomía, gastrostomía, ileostomía, colostomía, otros orificios artificiales de las vías digestivas, cistostomía, otros orificios artificiales de las vías urinarias y vagina artificial). | Z43 |